

Redlyna film-coated Tablets

Linagliptin (5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan REDLYNA
2. Bagaimana REDLYNA berfungsi
3. Sebelum mengambil REDLYNA
4. Cara menggunakan REDLYNA
5. Semasa menggunakan REDLYNA
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan REDLYNA
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan REDLYNA

Redlyna digunakan untuk merawat diabetes jenis 2 pada orang dewasa, jika penyakit itu tidak dapat dikawal secukupnya dengan diet dan senaman sahaja.

Adalah penting untuk terus mengikuti nasihat yang diberikan oleh doktor atau jururawat anda tentang diet dan senaman.

Bagaimana REDLYNA berfungsi

Redlyna mengandungi bahan aktif *linagliptin* yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil "*oral anti-diabetics*". *Oral anti-diabetics* digunakan untuk merawat tahap gula dalam darah yang tinggi. Ia berfungsi dengan membantu badan mengurangkan tahap gula dalam darah anda.

Sebelum mengambil REDLYNA

-Bila tidak boleh mengambil

- jika anda alah kepada *linagliptin* atau mana-mana bahan lain ubat ini

-Sebelum mula mengambil

Bincang dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat anda sebelum mengambil Redlyna jika anda:

- menghidap diabetes jenis 1 (badan anda tidak menghasilkan sebarang insulin) atau *diabetic ketoacidosis* (komplikasi diabetes dengan tahap gula dalam darah tinggi, penurunan berat badan yang cepat, loya atau muntah). Redlyna tidak boleh digunakan untuk merawat keadaan ini.

- pernah mengalami reaksi alahan terhadap sebarang ubat lain yang anda ambil untuk mengawal tahap gula dalam darah anda.

- pernah atau pernah menghidap penyakit pankreas.

Jika anda mempunyai simptom *acute pancreatitis*, seperti sakit perut yang berterusan dan teruk, anda harus berjumpa doktor anda.

Jika anda mengalami kulit melepuh, ini mungkin tanda untuk keadaan yang dipanggil *bullous pemphigoid*. Doktor anda mungkin meminta anda menghentikan Redlyna.

Kanak-kanak dan remaja
REDLYNA tidak disyorkan untuk digunakan pada kanak-kanak atau remaja di bawah 18 tahun.

Kehamilan, penyusuan bayi dan kesuburan

Jika anda hamil atau menyusui bayi, fikir anda mungkin hamil atau merancang untuk melahirkan bayi, minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

Tidak diketahui sama ada Redlyna berbahaya kepada anak dalam kandungan. Oleh itu, adalah lebih baik untuk mengelak menggunakan Redlyna jika anda hamil. Tidak diketahui sama ada Redlyna masuk ke dalam susu ibu manusia. Keputusan mesti dibuat oleh doktor anda sama ada untuk menghentikan penyusuan susu ibu atau untuk menghentikan/menolak terapi Redlyna.

Memandu dan menggunakan mesin
Tiada data tersedia ada mengenai kesan Redlyna terhadap keupayaan memandu dan menggunakan mesin.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, baru-baru ini mengambil atau mungkin mengambil sebarang ubat lain.

Khususnya, anda harus memberitahu doktor anda jika anda menggunakan ubat yang mengandungi mana-mana bahan aktif berikut:

- *Carbamazepine*, *fenobarbital* atau *phenytoin*. Ini boleh digunakan untuk mengawal sawan atau sakit kronik.
- *Rifampicin*. Ini adalah antibiotik yang digunakan untuk merawat jangkitan seperti tuberkulosis.

Cara menggunakan REDLYNA

-Berapa banyak yang perlu diambil

Sentiasa ambil ubat ini betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Dos yang disyorkan Redlyna ialah satu tablet 5 mg sekali sehari.

-Bila perlu digunakan

Cuba ambil tablet pada masa yang sama setiap hari.

Anda boleh mengambil Redlyna dengan atau tanpa makanan.

-Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti mengambil Redlyna tanpa terlebih dahulu berbincang dengan doktor anda. Tahap gula dalam darah anda mungkin meningkat apabila anda berhenti mengambil Redlyna.

-Jika terlupa menggunakan

- Jika anda terlupa mengambil satu dos Redlyna, ambil ia sebaik sahaja anda mengingatnya. Walau bagaimanapun, jika sudah hampir masanya untuk dos seterusnya, langkau dos yang terlepas.
- Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Jangan sekali-kali mengambil dua dos pada hari yang sama

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih banyak Redlyna daripada yang sepatutnya, bincang dengan doktor dengan segera.

Semasa menggunakan REDLYNA

-Perkara yang perlu dilakukan

Ikutilah arahan doktor dengan teliti.

Redlyna film-coated Tablets

Linagliptin (5mg)

Perkara yang tidak boleh dilakukan

-Jangan berikan REDLYNA kepada orang lain, walaupun mereka menghidap penyakit yang sama seperti anda.

-Jangan gunakan REDLYNA untuk merawat apa-apa masalah perubatan lain kecuali diarahkan oleh doktor.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Seseorang gejala memerlukan rawatan perubatan segera. Anda harus berhenti mengambil Redlyna dan berjumpa doktor anda dengan segera jika anda mengalami perkara berikut simptom gula darah rendah: menggeletar, berpeluh, keresahan, penglihatan kabur, bibir kesemutan, pucat, perubahan mood atau kekeliruan (Hipoglisemia).

Seseorang pesakit telah mengalami reaksi alahan (hipersensitiviti; kekerapan yang tidak biasa, boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang) semasa mengambil Redlyna secara bersendirian untuk rawatan diabetes, yang mungkin serius. Seseorang pesakit mengalami ruam (kekerapan tidak biasa), gatal-gatal (urtikaria; kekerapan jarang berlaku, boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 1000 orang), dan bengkak muka, bibir, lidah dan tekak yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas atau menelan (angioedema; kekerapan jarang berlaku). Jika anda mengalami mana-mana tanda penyakit yang dinyatakan di atas, hentikan pengambilan Redlyna dan hubungi doktor anda dengan segera. Doktor anda mungkin memberikan ubat untuk merawat tindak balas alahan anda dan ubat lain untuk diabetes anda.

Seseorang pesakit telah mengalami keradangan pankreas (pankreatitis; kekerapan tidak biasa, boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang) semasa mengambil Redlyna

sahaja untuk rawatan diabetes.

BERHENTI mengambil Redlyna dan hubungi doktor dengan segera jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan yang serius berikut:

- Kesakitan yang teruk dan berterusan di bahagian perut yang mungkin sampai ke belakang anda, serta loya dan muntah, kerana ia boleh menjadi tanda pankreas yang meradang (pankreatitis).

Seseorang pesakit mempunyai kesan sampingan berikut semasa mengambil Redlyna sahaja untuk rawatan diabetes:

- Biasa: tahap *lipase* dalam darah meningkat.
- Tidak Biasa: hidung atau tekak meradang (*nasopharyngitis*), batuk, tahap *amylase* dalam darah meningkat.
- Jarang: kulit melepuh (*bulous pemfigoid*).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumer Reporting* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan REDLYNA

Penyimpanan

-Jauhkan ubat ini daripada pandangan dan capaian kanak-kanak.
-Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada karton dan *blister* selepas EXP.
Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.
-Simpan di bawah 30°C

Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat melalui air buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara membuang ubat yang anda tidak gunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet bulat, dwicembung dengan tepi serong yang bersalut filem dan berwarna merah muda dengan ukiran “Y” (logo) pada satu permukaan dan “5” pada permukaan lain. Saiz Pek: Dua *blister* yang mengandungi 15 tablet setiap satu dibungkus ke dalam karton luar dengan sisipan pek.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif: Setiap tablet mengandungi 5mg *Linagliptin*

Bahan-bahan tidak aktif: *Mannitol USP (Pearlitol SD 200)*, *Copovidone NF (Kollidon VA 64)*, *Corn Starch NF (B700)*, *Magnesium Stearate NF (From Vegetable source)*, *Opadry Brown 03F565091*

Nombor MAL:

xxxx

Pengilang

DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED, FTO-SEZ, Process Unit-01, Survey No: 57 to 59, 60, 62 & 72, Sector No: 9 - 14 & 17 - 20, Devunipalavalasa (Village), Ranasthalam (Mandal) Srikakulam (District), Andhra Pradesh – 532409 INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk

Dr. Reddy's Laboratories Malaysia Sdn. Bhd.
Unit 10-06, Level 10, Menara MBMR, No. 1, Jalan Syed Putra, 58000 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

22/03/2024

Nombor siri

NPRA (R2) 23/222