

DIFFLAM HEXTRA™ SORE THROAT LOZENGES 2.4MG

Hexylresorcinol (2.4mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg
2. Bagaimana Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg
4. Cara menggunakan Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg
5. Semasa menggunakan Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg

Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg digunakan sebagai antiseptik dan anestetik untuk melegakan sakit tekak dan kesakitan yang berkaitan.

Bagaimana Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg berfungsi

Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg mengandungi Hexylresorcinol dan ia berfungsi sebagai anestetik untuk melegakan kesakitan dan ketidakselesaan.

Sebelum menggunakan Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan ubat ini jika anda alah kepada mana-mana bahan terkandung dalam ubat ini.

Jangan ambil ubat ini jika anda mempunyai keadaan keturunan yang dipanggil *intoleransi fruktosa, glucose-galactose malabsorption syndrome* atau *sucrose isomaltose deficiency*.

Jika anda kurang pasti, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

-Sebelum mula menggunakan

Sila baca semua arahan sebelum menggunakan ubat ini. Maklumat terperinci adalah pada risalah product ini. Jika anda kurang pasti, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum guna.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Interaksi ubat ini dengan ubat-ubatan lain tidak diketahui dengan sepenuhnya. Walaubagaimanapun, jika anda sedang mengambil apa-apa ubat yang lain sama ada dibeli di kaunter, tanpa surat doktor di farmasi atau dari kedai makanan kesihatan, sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi terlebih dahulu.

Cara menggunakan Difflam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg

-Berapa banyak harus diambil

Ikuti arahan dengan teliti seperti yang ada pada risalah produk ini. Jika anda kurang pasti, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Dewasa dan kanak-kanak berumur 6 tahun dan ke atas:

1 lozen dihisap dengan perlahan-lahan di dalam mulut setiap 3 jam seperti yang diperlukan sehingga maksimum 12 biji lozen sehari.

Kanak-kanak kurang daripada 6 tahun: Tidak digalakkan.

-Bila perlu digunakan

Gunakan seperti diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini seperti diarahkan. Jika gejala anda tidak bertambah baik atau menjadi lebih teruk selepas 3 hari, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika terlupa mengambil ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan ketidakselesaan perut..

Semasa menggunakan Diffiam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat ini seperti diarahkan.

Maklumkan kepada semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Diffiam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg.

-Perkara tidak boleh dilakukan

Jangan ambil apa-apa ubat baru tanpa mendapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Diffiam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai gejala yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera:

Ubat ini tidak akan menjejaskan keupayaan anda memandu atau menggunakan jentera.

Kehamilan dan penyusuan:

Kesan penggunaan ubat ini oleh wanita menandung atau menyusu tidak diketahui dengan sepenuhnya. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini sekiranya anda mengandung atau sedang menyusu.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Diffiam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.moh.gov.my [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Diffiam HEXTRA Sore Throat Lozenges 2.4mg

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat memantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Berwarna ungu, bulat, rata dan dwicembung.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Hexylresorcinol

-Bahan tidak aktif

- Levomenthol
- Liquid Glucose
- Sucrose
- Sucralose
- Anhydrous Citric Acid
- Purple Grape Flavour,
- FD & C Red No.40

- FD & C Blue No. 1
- Purified Water

-Nombor MAL

MAL20076056X

Pengilang

Unique Pharmaceutical Laboratories
(A Div of J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.)
Survey No. 101/2 & 102/1,
Daman Industrial Estate,
Airport Road, Kadaiya, Daman,
396 210, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

iNova Pharmaceuticals (Singapore) Pte
Ltd (Incorporated in Singapore)
Malaysia Branch
5F-2, 5th Floor,
Tower 2, @ PFCC,
Jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri,
47100 Puchong,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

05/ 03/ 2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/019