

TAMBOCOR TABLET 100MG

Flecainide acetate 100mg

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Tambocor Tablet 100mg
2. Bagaimana Tambocor Tablet 100mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan Tambocor Tablet 100mg
4. Cara menggunakan Tambocor Tablet 100mg
5. Semasa menggunakan Tambocor Tablet 100mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Tambocor Tablet 100mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Tambocor Tablet 100mg

Tambocor Tablet 100mg digunakan untuk merawat keadaan jantung yang dikenali sebagai aritmia. Aritmia ialah denyutan jantung yang tidak teratur atau tidak normal.

Bagaimana Tambocor Tablet 100mg berfungsi

Tambocor Tablet 100mg mengandungi bahan aktif Flecainide acetate 100mg. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil anti-aritmia.

Tambocor Tablet 100mg berfungsi dengan melambatkan impuls yang menyebabkan jantung berdegup secara tidak teratur atau tidak normal.

Tanya ahli farmasi atau doktor anda jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai ubat ini.

Sebelum menggunakan Tambocor Tablet 100mg

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Tambocor Tablet 100mg jika anda mempunyai mana-mana yang berikut:

- Anda alah kepada *flecainide acetate* atau bahan-bahan lain terkandung dalam tablet Tambocor Tablet 100mg
- Anda mempunyai kegagalan jantung
- Anda pernah mengalami serangan jantung
- Anda mempunyai atrial fibrilasi yang lama (pengecutan otot jantung yang cepat)
- Anda mempunyai masalah dengan injap dalam jantung anda
- Anda mempunyai penyakit sinus node (suatu keadaan di mana jantung anda berdegup dengan kadar tidak normal)
- Anda mempunyai penyakit “sekat jantung” (denyutan jantung tidak lengkap)

Jangan mengambil Tambocor Tablet 100mg:

- selepas tarikh luput pada pek;
- jika bungkusan menunjukkan tanda-tanda terbuka.
- kecuali dinasihatkan oleh doktor anda

Sebelum mula menggunakan Tambocor Tablet 100mg

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika

- anda mempunyai alahan kepada ubat-ubatan lain.
- anda mempunyai sebarang masalah jantung;
- anda mempunyai sebarang masalah hati atau buah pinggang;

Beritahu doktor anda jika anda sedang atau bercadang untuk hamil atau menyusukan bayi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Ini terutamanya untuk ubat-ubatan yang mengandungi bahan-bahan aktif seperti berikut:

- *Sodium channel blockers*
- *Digoxin*
- *Beta blockers*
- *Phenytoin*
- *Phenobarbital*
- *Carbamazepine*
- *Amiodarone*

Anda mungkin memerlukan dos yang berbeza, atau anda mungkin perlu mengambil ubat yang lain. Doktor atau ahli farmasi mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat-ubatan untuk perhatian atau dielakkan sementara mengambil Tambocor Tablet 100mg.

Cara menggunakan Tambocor Tablet 100mg

Ikut semua arahan yang diberikan oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti.

Arahan ini mungkin berbeza dengan maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Jika anda tidak memahami arahan pada kotak, minta ahli farmasi atau doktor anda untuk membantu.

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

Supraventricular arrhythmias (denyutan jantung tidak teratur yang bermula di bahagian atas jantung anda)

Dos yang biasa ialah setengah tablet dua kali sehari. Doktor anda mungkin meningkatkan dos sehingga 300mg (3 tablet sehari)

Ventricular arrhythmias (denyutan jantung tidak teratur yang bermula di bahagian bawah jantung anda)

Dos yang biasa ialah satu tablet dua kali sehari. Doktor anda mungkin meningkatkan dos sehingga 400mg (4 tablet sehari).

Kanak-kanak:

Tidak disyorkan untuk kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah.

TAMBOCOR TABLET 100MG

Flecainide acetate 100mg

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Untuk warga tua dan pesakit dengan masalah buah pinggang:

Doktor anda mungkin preskribkan dos yang lebih rendah untuk anda. Semasa anda mengambil ubat ini, doktor anda mungkin menjalankan ujian darah dengan lebih kerap. Ini adalah untuk memastikan bahawa ubat anda berfungsi dengan betul dan bahawa dos yang anda ambil adalah tepat untuk anda.

Bila perlu digunakan

Ambil Tambocor Tablet 100mg pada masa yang sama setiap hari.

Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti rawatan ini tanpa berbincang terlebih dahulu dengan doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil dos Tambocor Tablet 100mg, ambil ubat ini dengan segera.

Jika telah hampir waktu dos yang seterusnya, jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal. Ambil dos seperti biasa

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa sahaja yang terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Tambocor Tablet 100mg

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Tambocor Tablet 100mg.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil ketika mengambil ubat ini

Perkara tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Tambocor Tablet 100mg untuk merawat apa-apa aduan lain melainkan jika ahli farmasi atau doktor memberitahu anda.

Jangan memberi ubat kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati ketika memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana ubat ini memberi kesan kepada anda.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan bagi Tambocor Tablet 100mg termasuk

- perubahan denyutan jantung, ia mula berdenyut dengan kuat, atau menjadi lebih cepat atau lebih lambat
- Masalah kulit disebabkan oleh pendedahan kepada cahaya matahari
- Loya dan muntah
- Peningkatan dalam enzim hati atau penyakit kuning
- Pening
- Kebas tangan atau kaki
- berjalan atau pergerakan yang tidak terkawal
- bintik keruh dalam biji mata
- Penglihatan berganda dan kabur
- Penyakit paru-paru tertentu (*pulmonary fibrosis*) atau radang paru-paru (*pneumonitis*)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Tambocor Tablet 100mg

Penyimpanan

Simpan ubat anda di bawah 30 °C.

Jangan simpan Tambocor Tablet 100mg atau ubat lain dalam bilik mandi atau berhampiran dengan sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau di atas unjuran tapak tingkap.

Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat ini.

Pastikan ubat ini sentiasa dijauhkan daripada kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari atas lantai adalah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Berwarna putih, bulat, dwicembung yang bertanda "TR100" pada satu muka dengan garisan tengah dan kosong pada muka sebelah.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Flecainide acetate 100mg

- Bahan tidak aktif

Pregelatinised maize starch, microcrystalline cellulose, hydrogenated vegetable oil, magnesium stearate, croscarmellose sodium.

Nombor MAL

MAL21106012ACZ

TAMBOCOR TABLET 100MG

Flecainide acetate 100mg

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Pengilang

Unique Pharmaceutical Laboratories(A
Division of J.B. Chemicals &
Pharmaceuticals Limited)
Plot Nos 215-219, GIDC Industrial
Area, Panoli, Dist. Bharuch, 394116
India.

Pemegang Pendaftaran Produk

iNova Pharmaceuticals (Singapore) Pte
Ltd (Incorporated in Singapore)
Malaysia Branch
5F-2, 5th Floor, Tower 2, @ PFCC,
Jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri,47100
Puchong,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

03/03/2025

Nombor siri

NPRA (R1) 21/013