

DIFFLAM[®] ANTI-INFLAMMATORY 3MG LOZENGES (LEMON)

Benzydamine hydrochloride 3.00mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)
2. Bagaimana Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon) berfungsi
3. Sebelum mengambil Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)
4. Cara menggunakan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)
5. Semasa menggunakan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)

Benzydamine Hydrochloride dalam Difflam Anti-inflammatory Lozenges 3mg (Lemon) Lozenges digunakan untuk melegakan keradangan dan kesakitan tekak.

Bagaimana Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon) berfungsi

Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon) berfungsi dengan mengurangkan kesakitan, kemerahan dan bengkak mulut dan sakit tekak.

Sebelum menggunakan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan menggunakan ubat ini jika anda mempunyai alahan kepada:

- mana-mana ubat yang mengandungi Benzydamine Hydrochloride
- mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Sesetengah simptom reaksi alahan termasuk:

- sesak nafas
- bunyi berdehrit atau kesukaran pernafasan
- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- ruam, gatal-gatal atau gatal-gatal pada kulit.

Jangan mengambil ubat ini jika anda mengandung atau bercadang untuk hamil. Ahli farmasi atau doktor anda akan membincangkan faedah dan risiko yang mungkin mengambil ubat semasa mengandung.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek atau jika bungkusan koyak atau terdapat kesan-kesan terbuka.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula menggunakan ubat ini, berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan kepada apa-apa ubat-ubatan lain, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu ahli farmasi anda jika anda mempunyai mana-mana masalah

kesihatan berikut:

- asma atau masalah pernafasan yang lain

Tanya ahli farmasi atau doktor anda mengambil ubat ini jika anda sedang menyusukan.

Ia adalah tidak diketahui jika Benzydamine hydrochloride akan meresap ke dalam susu ibu. Ahli farmasi atau doktor anda akan membincangkan potensi faedah dan risiko mengambil ubat jika anda sedang menyusukan.

Jika anda belum memberitahu ahli farmasi atau doktor anda mengenai mana-mana di atas, beritahu dia sebelum anda mula menggunakan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon).

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat-ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda dapat tanpa preskripsi atau yang herba dari farmasi anda, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Ahli farmasi atau doktor anda mempunyai maklumat ubat-ubatan untuk memerlukan perhatian atau dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)

Ikut semua arahan pada pek atau arahan yang diberikan oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti.

DIFFLAM[®] ANTI-INFLAMMATORY 3MG LOZENGES (LEMON)

Benzylamine hydrochloride 3.00mg

Jika anda tidak memahami arahan pada kotak, minta ahli farmasi atau doktor anda untuk membantu.

-Berapa banyak harus diambil

Dewasa dan kanak-kanak lebih dari 6 tahun: 1 lozenge

Kanak-kanak bawah 6 tahun: Jangan gunakan

-Bila perlu mengambil

Ambil 1 lozenge setiap 1-2 jam atau jika perlu.

Dos maksima 12 lozenges setiap hari.

-Berapa lama perlu diambil

Tidak harus digunakan secara berterusan selama lebih daripada 7 hari.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa untuk menggunakan Diffiam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon), mengambil dos seterusnya dengan seberapa segera yang anda ingat.

Jangan mengambil dos berganda untuk mengganti dos anda telah terlepas.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dengan serta-merta telefon doktor anda untuk nasihat, atau pergi Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital yang terdekat. Jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak Diffiam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon), lakukan ini

walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Semasa menggunakan Diffiam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)

-Perkara yang perlu dilakukan

Berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda jika simptom anda tidak bertambah baik.

Ahli farmasi atau doktor anda akan menilai keadaan anda dan membuat keputusan jika anda perlu terus menggunakan ubat ini.

-Perkara tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Diffiam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon) untuk merawat apa-apa aduan lain melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

Jangan memberi ubat kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Jangan menggunakan lebih daripada dos yang disyorkan melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

Jangan gunakan ubat ini di kalangan kanak-kanak di bawah umur 6 tahun.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan yang berlebihan Diffiam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon) yang mengandungi Isomalt mungkin mempunyai kesan julap.

Kesan-kesan sampingan

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda secepat mungkin jika anda tidak berasa sihat semasa anda menggunakan Diffiam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon).

Ubat ini membantu kebanyakan orang, namun ia mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diinginkan dalam beberapa orang. Semua ubat-ubatan boleh mempunyai kesan sampingan. Kadang kala ia serius, tetapi kebanyakan masa ia tidak. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan jika anda mendapat beberapa kesan sampingan.

Jangan berasa bimbang tentang senarai kesan-kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak mengalami apa-apa daripada kesan-kesan ini.

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- kebas dalam bahagian mulut
- rasa pedih dalam mulut
- kekeringan mulut dan dahaga

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang biasa dialami dengan ubat anda. Kesan-kesan ini biasanya adalah tidak serius.

Jika mana-mana yang berikut berlaku, beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat anda:

- sesak nafas
- bunyi berdehit atau kesukaran pernafasan

DIFFLAM[®] ANTI-INFLAMMATORY 3MG LOZENGES (LEMON)

Benzydamine hydrochloride 3.00mg

- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- ruam, gatal-gatal atau gatal-gatal pada kulit

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang sangat serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera atau rawatan hospital. Kesan-kesan sampingan adalah amat jarang bagi dos rendah bagi ubat ini dan apabila digunakan untuk tempoh yang singkat

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda notis apa-apa yang membuat anda merasa kurang sihat.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga mungkin berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara menyimpan dan pelupusan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)

-Penyimpanan

Simpan ubat anda dalam pek asal.

Simpan ubat anda di tempat yang suhu sederhana dan kering. (di bawah 30 °C).

Jangan simpan Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges (Lemon)

atau mana-mana perubatan lain di bilik mandi atau berhampiran sinki. Jangan biarkan ia di ambang tingkap atau di dalam kereta.

Haba panas dan kelembapan boleh merosakkan ubat ini.

Pastikan ubat ini sentiasa dijauhkan daripada kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter di atas lantai adalah tempat yang baik untuk menyimpan ubat.

-Pelupusan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan mana-mana ubat yang ditinggalkan, atau jika tarikh luput telah berlaku.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Difflam Anti-inflammatory 3mg Lozenges adalah lozenge bulat warna hijau dengan rasa anise-mint.

Ia dipek dalam sekotak 16 lozenges dan 180 lozenges.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Setiap lozenge mengandungi:

- Benzydamine hydrochloride 3mg

-Bahan tidak aktif

- isomalt
- saccharin sodium
- quinoline yellow
- patent blue V

- aromatic 52503t

-Nombor MAL

MAL24106014ACZ

Pengilang

Unique Pharmaceuticals Laboratories (A Div. of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.)
Survey No. 101/2 & 102/1,
Daman Industrial Estate, Airport Road,
Kadaiya, Daman, 396210, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

iNova Pharmaceuticals (Singapore) Pte Ltd (Incorporated in Singapore)
Malaysia Branch
No. 5F-2, 5th Floor, Tower 2 @ PFCC,
Jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri, 47100
Puchong, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

21/01/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)250115/1407