

DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid

Ambroxol hydrochloride (30mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid
2. Bagaimana DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid berfungsi
3. Sebelum menggunakan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid
4. Cara menggunakan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid
5. Semasa menggunakan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid

DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid yang digunakan untuk menipiskan mucus (kahak) yang hadir dalam penyakit bronkial dan paru-paru yang akut dan kronik, di mana kahak yang tebal dan degil menimbulkan masalah.

Bagaimana DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid berfungsi

DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid mengandungi ambroxol hydrochloride yang menghilangkan rembesan atau mukus di dalam saluran pernafasan dengan mengurangkan kelikatannya.

Sebelum menggunakan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid jika terdapat alahan kepada ambroxol hydrochloride atau bahan tidak aktif yang terkandung dalam DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid.

Mengandung dan menyusukan anak

Penggunaan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid pada trimester pertama adalah tidak digalakkan. Minta nasihat doktor anda sekiranya anda hamil, atau mungkin akan hamil semasa jangka rawatan anda.

Ibu yang sedang menyusukan bayi tidak digalakkan untuk mengambil DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid.

Sebelum mula menggunakan

Sebelum mengambil DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid, anda mesti memberitahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mempunyai, atau telah mengalami masalah buah pinggang atau hati.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat- ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda dapat tanpa preskripsi atau yang herba dari farmasi anda, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Ahli farmasi atau doktor anda mempunyai maklumat ubat-ubatan yang memerlukan perhatian atau dielakkan semasa menggunakan ubat ini.

Cara menggunakan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid

-Berapa banyak harus digunakan

Selalu mengambil ubat ini mengikut arahan seperti mana yang tercatat atas risalah ini, atau seperti mana yang diarahkan doktor atau ahli farmasi anda. Tanya doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda kurang pasti.

Kanak-kanak berumur 1 – 2 tahun: 2.5ml larutan ubat harus diambil 2 kali sehari.

Kanak-kanak berumur 2 – 5 tahun: 2.5ml larutan ubat harus diambil 3 kali sehari.

Kanak-kanak berumur 6 – 12 tahun: 5ml larutan ubat harus diambil 2 ke 3 kali sehari.

Orang dewasa dan remaja berumur 12 tahun ke atas: 10ml larutan ubat harus diambil 2 kali sehari.

Dos ini adalah untuk 14 hari pertama; dos boleh dikurangkan separuh selepas 14 hari.

-Bila perlu digunakan

Ambil seperti mana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini selagi doktor memberitahu anda.

Jika batuk berterusan, sila berjumpa doktor atau ahli farmasi anda

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos

DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid

Ambroxol hydrochloride (30mg)

yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hamper masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doctor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doctor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu kereta dan pengendalian mesin

Tiada bukti yang menunjukkan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid mempunyai kesan ke atas keupayaan memandu kereta dan pengendalian mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindak balas kulit yang serius. Berhenti menggunakan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana simptom berikut:

- 1) alahan teruk: kesukaran bernafas, pening, bengkak kulit atau ruam
- 2) tindak balas kulit yang teruk; kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda mengalami sebarang kesan sampingan semasa atau selepas mengambil DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid, agar gejala tersebut mendapat rawatan yang wajar. Selain itu, kesan yang tidak

dijangka, yang tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku pada mana-mana ubat yang lain. Anda harus memberitahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda memerhatikan kesan yang luar biasa semasa atau selepas pengambilan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid

-Penyimpanan

DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid harus disimpan di tempat yang kering dan suhunya kekal di bawah 30°C.

Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat melalui sistem air kumbahan atau sisa buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Sirap berwarna kuning jernih hingga tidak berwarna dengan rasa butterscotch oren

DURO-TUSS® AX CHESTY Cough Liquid

Ambroxol hydrochloride (30mg)

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Setiap 5ml larutan ubat
mengandungi 30mg ambroxol
hydrochloride.

-Bahan tidak aktif

L-Menthol, Polyoxyl 40
hydrogenated castor oil,
glycerin,
Hydroxyethylcellulose,
Propylene Glycol,
Methylparaben, Propylparaben,
Saccharin Sodium, Sucrose,
Sorbitol solution 70% (non
crystallising), perisa oren,
perisa Vanilla Butterscotch, air.

-Nombor MAL

MAL24076029X

Pengilang

Interphil Laboratories, Inc
Canlubang Industrial Estate, Bo.
Pittland Cabuyao, Laguna 4025,
Philippines

Pemegang Pendaftaran Produk

iNova Pharmaceuticals (Singapore)
Pte Ltd (Incorporated in Singapore)
Malaysia Branch
5F-2, 5th Floor,
Tower 2,
@ PFCC,
Jalan Puteri 1/2 , Bandar Puteri,
47100 Puchong,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

26/ 03/ 2025

Nombor siri

NPRA(R2/1)250218/1419
