

DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY ANTI-BACTERIAL LOZENGES (RASPBERRY)

Benzydamine hydrochloride / Cetylpyridinium chloride (3mg/1.33mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)
2. Bagaimana Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry) berfungsi
3. Sebelum mengambil Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)
4. Cara menggunakan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)
5. Semasa menggunakan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)

Benzydamine Hydrochloride dalam Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry) digunakan untuk melegakan keradangan dan kesakitan tekak.

Cetylpyridinium Chloride mempunyai aktiviti antiseptik dan digunakan dalam rawatan jangkitan mulut dan tekak.

Bagaimana Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry) berfungsi

Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry) berfungsi dengan mengurangkan

kesakitan, kemerahan dan bengkak mulut dan sakit tekak.

Sebelum menggunakan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan menggunakan ubat ini jika anda mempunyai alahan kepada:

- mana-mana ubat yang mengandungi Benzydamine Hydrochloride atau Cetylpyridinium chloride
- mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Sesetengah simptom reaksi alahan termasuk:

- sesak nafas
- bunyi berdehit atau kesukaran pernafasan
- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- ruam, gatal-gatal atau gatal-gatal pada kulit.

Jangan mengambil ubat ini jika anda mengandung atau bercadang untuk hamil. Ahli farmasi atau doktor anda akan membincangkan faedah dan risiko yang mungkin mengambil ubat semasa mengandung.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek atau jika bungkus koyak atau terdapat kesan-kesan terbuka.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula menggunakan ubat ini, berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan kepada apa-apa ubat-ubatan lain, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu ahli farmasi anda jika anda mempunyai mana-mana masalah kesihatan berikut:

- asma atau masalah pernafasan yang lain

Tanya ahli farmasi atau doktor anda mengambil ubat ini jika anda sedang menyusukan.

Ia adalah tidak diketahui jika Benzydamine hydrochloride atau Cetylpyridinium chloride akan meresap ke dalam susu ibu. Ahli farmasi atau doktor anda akan membincangkan potensi faedah dan risiko mengambil ubat jika anda sedang menyusukan.

Jika anda belum memberitahu ahli farmasi atau doktor anda mengenai mana-mana di atas, beritahu dia sebelum anda mula menggunakan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry).

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat-ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda dapat tanpa preskripsi atau yang herba dari farmasi anda, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Ahli farmasi atau doktor anda mempunyai maklumat ubat-ubatan untuk memerlukan perhatian atau dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)

Ikut semua arahan pada pek atau arahan yang diberikan oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti.

Jika anda tidak memahami arahan pada kotak, minta ahli farmasi atau doktor anda untuk membantu.

-Berapa banyak harus diambil

Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry) tidak boleh dikunyah. Lozenges perlu dihisap hingga cair perlahan-lahan di dalam mulut.

Dewasa dan kanak-kanak lebih dari 6 tahun: 1 lozenge

Kanak-kanak bawah 6 tahun: Jangan gunakan

-Bila perlu mengambil

Ambil 1 lozenge setiap 1-2 jam atau jika perlu.

Dos maksima 12 lozenges setiap hari.

-Berapa lama perlu diambil

Tidak harus digunakan secara berterusan selama lebih daripada 7 hari.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa untuk menggunakan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry), mengambil dos seterusnya dengan seberapa segera yang anda ingat.

Jangan mengambil dos berganda untuk mengganti dos anda telah terlepas.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dengan serta-merta telefon doktor anda untuk nasihat, atau pergi Unit Kemalangan dan Kecemasan di

hospital yang terdekat. Jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry), lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Semasa menggunakan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)

-Perkara yang perlu dilakukan

Berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda jika simptom anda tidak bertambah baik.

Ahli farmasi atau doktor anda akan menilai keadaan anda dan membuat keputusan jika anda perlu terus menggunakan ubat ini.

-Perkara tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry) untuk merawat apa-apa aduan lain melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

Jangan memberi ubat kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Jangan menggunakan lebih daripada dos yang disyorkan melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

Jangan gunakan ubat ini di kalangan kanak-kanak di bawah umur 6 tahun.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry) yang mengandungi Isomalt secara berlebihan mungkin mempunyai kesan jualap.

Kesan-kesan sampingan

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda secepat mungkin jika anda tidak berasa sihat semasa anda menggunakan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry).

Ubat ini membantu kebanyakan orang, namun ia mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini dalam beberapa orang. Semua ubat-ubatan boleh mempunyai kesan sampingan. Kadang kala ia serius, tetapi kebanyakan masa ia tidak. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan jika anda mendapat beberapa kesan sampingan.

Jangan berasa bimbang tentang senarai kesan-kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak mengalami apa-apa daripada kesan-kesan ini.

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- kebas dalam bahagian mulut
- rasa pedih dalam mulut
- kekeringan mulut dan dahaga

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang biasa dialami dengan ubat anda. Kesan-kesan ini biasanya adalah tidak serius.

Jika mana-mana yang berikut berlaku, beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat anda:

- sesak nafas
- bunyi berdehrit atau kesukaran pernafasan
- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- ruam, gatal-gatal atau gatal-gatal pada kulit

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang sangat serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera atau rawatan hospital. Kesan-kesan sampingan adalah amat jarang bagi dos rendah bagi ubat ini dan apabila digunakan untuk tempoh yang singkat

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda notis apa-apa yang membuat anda merasa kurang sihat.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga mungkin berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.moh.gov.my [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry)

-Penyimpanan

Simpan ubat anda dalam pek asal.

Simpan ubat anda di tempat yang suhu sederhana dan kering. (di bawah 30 ° C).

Jangan simpan Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry) atau mana-mana perubatan lain di bilik mandi atau berhampiran sinki. Jangan biarkan ia di ambang tingkap atau di dalam kereta.

Haba panas dan kelembapan boleh merosakkan ubat ini.

Pastikan ubat ini sentiasa dijauhkan daripada kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter di atas lantai adalah tempat yang baik untuk menyimpan ubat.

-Pelupusan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan mana-mana ubat yang ditinggalkan, atau jika tarikh luput telah berlalu.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges (Raspberry) adalah lozenge bulat warna merah jambu dengan rasa raspberry.

Ia dipek dalam sekotak 16 lozenges.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Setiap lozenge mengandungi:

- Benzydamine hydrochloride 3mg
- Cetylpyridinium chloride 1.33mg

-Bahan tidak aktif

- isomalt
- saccharin sodium
- carmoisine
- raspberry flavour
- custard flavour

-Nombor MAL

MAL12115060ACZ

Pengilang

Unique Pharmaceuticals Laboratories
Survey No. 101/1 & 102/1 Damansara Industrial Estate, Airport Road,
Kadaiya Damansara 396210 India.

Pemegang Pendaftaran Produk

iNova Pharmaceuticals (Singapore) Pte Ltd (Incorporated in Singapore)
Malaysia Branch
5F-2, 5th Floor,
Tower 2, @ PFCC,
Jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri,
47100 Puchong,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

04/ 03/ 2025

Nombor siri

NPRA(R4/1)100119/00003