

DIFFLAM SOLUTION

Benzylamine hydrochloride (0.15% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Difflam Solution
2. Bagaimana Difflam Solution berfungsi
3. Sebelum mengambil Difflam Solution
4. Cara menggunakan Difflam Solution
5. Semasa menggunakan Difflam Solution
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Difflam Solution
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk

Apakah kegunaan Difflam Solution

Benzylamine Hydrochloride dalam Difflam Solution digunakan untuk melegakan keradangan dan kesakitan tekak.

Bagaimana Difflam Solution berfungsi

Difflam Solution berfungsi dengan mengurangkan kesakitan, kemerahan dan bengkak mulut dan sakit tekak.

Sebelum menggunakan Difflam Solution

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan menggunakan ubat ini jika anda mempunyai alahan kepada:

- mana-mana ubat yang mengandungi Benzylamine Hydrochloride
- mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Sesetengah simptom reaksi alahan termasuk:

- sesak nafas
- bunyi berdehit atau kesukaran pernafasan
- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- ruam, gatal-gatal atau gatal-gatal pada kulit.

Kehamilan dan penyusuan

Jika anda mengandung, cuba untuk hamil atau menyusu, bertanya kepada ahli farmasi atau doktor untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan Difflam Solution.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek atau jika bungkusannya koyak atau terdapat kesan-kesan terbuka.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula menggunakan ubat ini, berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan kepada apa-apa ubat-ubatan lain, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu doctor atau ahli farmasi jika anda ada masalah kesihatan yang berikut:

- Penyakit hati
- Penyakit buah pinggan

Jika anda belum memberitahu ahli farmasi atau doktor anda mengenai mana-mana di atas, beritahu dia sebelum anda mula menggunakan Difflam Solution.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat-ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda dapat tanpa preskripsi atau yang herba dari farmasi anda, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Ahli farmasi atau doktor anda mempunyai maklumat ubat-ubatan untuk memerlukan perhatian atau dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Difflam Solution

Ikut semua arahan pada pek atau arahan yang diberikan oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti.

Jika anda tidak memahami arahan pada kotak, minta ahli farmasi atau doktor anda untuk membantu.

Difflam Solution digunakan sebagai ubat berkumur. Ia tidak harus ditelan dan perlu diludahkan selepas setiap kali digunakan.

Ia harus dibilas di sekeliling mulut untuk sekurang-kurangnya 30 saat.

-Berapa banyak harus diambil

Dewasa: 15ml (kira-kira satu sudu besar)

Kanak-kanak (berumur 6 tahun ke atas): 5 hingga 15ml

-Bila perlu mengambil

Berkumur Difflam Solution untuk sekurang-kurangnya 30 saat setiap 1 ½ hingga 3 jam.

-Berapa lama perlu diambil

Difflam Solution ini tidak harus digunakan secara berterusan selama lebih daripada 7 hari melainkan diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa untuk menggunakan Difflam Solution, mengambil dos seterusnya dengan seberapa segera yang anda ingat.

Jangan mengambil dos berganda untuk mengganti dos anda telah terlepas.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Ia tidak akan menyebabkan anda apa-apa masalah jika anda secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak atau anda menelan sedikit ubat anda. Jika anda mempunyai apa-apa kebimbangan, hubungi doktor atau ahli farmasi.

Semasa menggunakan Difflam Solution

-Perkara yang perlu dilakukan

Berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda jika simptom anda tidak bertambah baik.

Ahli farmasi atau doktor anda akan menilai keadaan anda dan membuat keputusan jika anda perlu terus menggunakan ubat ini.

-Perkara tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Difflam Solution untuk merawat apa-apa aduan lain melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

Jangan memberi ubat kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Jangan menggunakan lebih daripada dos yang disyorkan melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

Jangan gunakan ubat ini di kalangan kanak-kanak di bawah umur 6 tahun.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Berbincang dengan ahli farmasi atau doctor and ajika symptom anda tidak bertambah baik.

Kesan-kesan sampingan

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda secepat mungkin jika anda tidak berasa sihat semasa anda menggunakan Difflam Solution.

Ubat ini mungkin menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini pada sesetengah orang. Semua ubat-ubatan boleh memberi kesan sampingan. Kadang-kadang kesan ini adalah serius tapi kebanyakan masa adalah tidak serius. Anda mungkin memerlukan rawatan jika terdapat beberapa kesan sampingan.

Jangan berasa bimbang tentang senarai kesan-kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak mengalami apa-apa daripada kesa-kesan ini.

Tanya ahli farmasi atau doktor anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda ada.

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- kebas mulut
- membakar dan rasa pedih sensasi
- kekeringan mulut dan dahaga

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang biasa dialami dengan ubat anda. Kesan-kesan ini biasanya adalah tidak serius.

Jika mana-mana yang berikut berlaku, beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat anda:

- sesak nafas
- bunyi berdehrit atau kesukaran pernafasan
- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- ruam, gatal-gatal atau gatal-gatal pada kulit

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang sangat serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera atau rawatan hospital. Kesan-kesan sampingan adalah amat jarang bagi dos rendah bagi ubat ini dan apabila digunakan untuk tempoh yang singkat.

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda notis apa-apa yang membuat anda merasa kurang sihat.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga mungkin berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Difflam Solution

-Penyimpanan

Simpan ubat anda dalam pek asal.

Simpan ubat anda di tempat yang suhu sederhana dan kering. (di bawah 30 ° C).

Jangan simpan Difflam Solution atau mana-mana perubatan lain di bilik mandi atau berhampiran sinki. Jangan biarkan ia di ambang tingkap atau di dalam kereta.

Haba panas dan kelembapan boleh merosakkan ubat ini.

Pastikan ubat ini sentiasa dijauhkan daripada kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter di atas lantai adalah tempat yang baik untuk menyimpan ubat.

-Pelupusan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan mana-mana ubat yang ditinggalkan, atau jika tarikh luput telah berlalu.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Difflam Solution adalah ubat kumur jenis larutan yang berwarna hijau.

Ia dipek dalam botol 100ml.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Setiap 15ml Difflam Solution mengandungi:

- Benzylamine hydrochloride
22,5 mg

-Bahan tidak aktif

- Glycerol
- Saccharin sodiuml
- Ethanol
- Methyl hydroxybenzoate
- Polysorbate 20
- Patent blue
- Quinoline yellow
- Aromatic 52.503T
- Purified water

-Nombor MAL

MAL12115061ACZ

Pengilang

Ensign Laboratories Sdn Bhd
490-500 Wellington Road
Mulgrave Victoria
Australia 3170

Pemegang Pendaftaran Produk

iNova Pharmaceuticals (Singapore) Pte
Ltd Ltd (Incorporated in Singapore)
Malaysia Branch
5F-2, 5th Floor, Tower 2, The PFCC,
Jalan Puteri 1/2 , Bandar Puteri, 47100
Puchong, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

13/ 02/ 2025

Nombor siri

NPRA(R4/1)100119/00004