

NUELIN SYRUP

Theophylline 80mg/15mL

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Nuelin Syrup
2. Bagaimana Nuelin Syrup berfungsi
3. Sebelum mengambil Nuelin Syrup
4. Cara menggunakan Nuelin Syrup
5. Semasa menggunakan Nuelin Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Nuelin Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Nuelin Syrup

Nuelin Syrup digunakan untuk merawat asma dan keadaan sukar nafas. Ia juga digunakan untuk mencegah serangan asma.

Bagaimana Nuelin Syrup berfungsi

Theophylline menyebabkan kelonggaran lapisan otot saluran udara.

Sebelum menggunakan Nuelin Syrup

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan menggunakan ubat ini jika anda mempunyai alahan kepada:

- Theophylline
- Aminophylline
- Caffeine
- mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Sesetengah simptom reaksi alahan termasuk:

- sesak nafas
- bunyi berdehrit atau kesukaran pernafasan

- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- ruam, gatal-gatal atau gatal-gatal pada kulit

Jangan memberikan ubat ini kepada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

Keselamatan dan keberkesanan di kalangan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 2 tahun belum dipastikan.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek atau jika bungkusan koyak atau terdapat kesan-kesan terbuka.

Jika anda tidak pasti sama ada anda atau pesakit perlu mula menggunakan ubat ini, berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda.

Nuelin Syrup telah diberikan untuk pesakit sahaja. Jangan memberikannya kepada orang lain yang mengalami keadaan yang sama.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan kepada apa-apa ubat-ubatan lain, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda ada masalah kesihatan yang berikut:

- ulser perut atau refluks
- denyutan jantung yang tidak teratur atau pesat
- apa-apa penyakit jantung yang lain
- tekanan darah tinggi
- mana-mana penyakit hati
- penyakit tiroid

Atau lain jika pesakit:

- demam
- hamil atau menyusukan
- mengambil apa-apa ubat-ubatan asma

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung atau bercadang untuk hamil atau menyusu.

Doktor atau ahli farmasi anda boleh berbincang dengan anda manfaat dan risiko yang terlibat.

Jika anda belum memberitahu ahli farmasi atau doktor anda mengenai mana-mana di atas, beritahu dia sebelum anda mula mengambil Nuelin Syrup.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda dapat tanpa preskripsi atau yang herba dari farmasi anda, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan Nuelin Syrup boleh mengganggu satu sama lain. Ini termasuk:

- Cimetidine
- Allopurinol (dose yang tinggi)
- Propanolol
- Erythromycin dan clarithromycin
- Ciprofloxacin dan enoxacin
- Alcohol
- Oral contraceptives
- Mexilitene
- Tacrine
- Thiabendazole
- Disulfiram
- Interferon alpha
- Verapamil
- Phenobarbitone
- Phenytoin
- Carbamazepine

- Rifampicin
- St. John's wort

Ubat-ubatan ini mungkin berinteraksi dengan Nuelin Syrup atau keberkesannya mungkin terjejas. Pesakit mungkin memerlukan dos ubat yang berbeza, atau mengambil ubat yang berbeza.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil arak atau merokok.

Ahli farmasi atau doktor anda mempunyai maklumat ubat-ubatan untuk memerlukan perhatian atau dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Nuelin Syrup

Ikut semua arahan yang diberikan oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti.

Arahan ini mungkin berbeza dengan maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Jika anda tidak memahami arahan pada botol, minta ahli farmasi atau doktor anda untuk mendapatkan bantuan.

Nuelin Syrup membantu untuk mencegah dan melegakan serangan asma.

Ambil ubat yang hanya seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa banyak harus diambil

Dos untuk orang dewasa biasanya 25mL setiap enam jam. Walaubagaimanapun, dos ini boleh bertambah atau dikurangkan oleh doktor anda.

Bagi kanak-kanak berusia lebih 2 tahun, dos Nuelin Syrup bergantung kepada berat badan kanak-kanak. (1mL/kg berat badan sehingga maksimum 25mL setiap enam jam)

Dewasa dan kanak-kanak lebih 12 tahun: 25mL setiap 6 jam.

Nuelin Syrup tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun kecuali atas nasihat doctor.

-Bila perlu mengambil

Ambil Nuelin Syrup satu jam sebelum makan dengan segelas air. Jika terdapat ketidakselesaan perut, ia perlu diambil dengan atau sebaik sahaja selepas makan.

-Berapa lama perlu diambil

Ambil ubat ini selagi doktor anda memberitahu anda.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa mengambil Nuelin Syrup, mengambilnya dengan seberapa segera yang anda ingat. Walau bagaimanapun, jika ia lebih daripada 4 jam, skip dos anda yang terlepas dan mengambil dos anda pada masa biasa.

Jangan sekali-kali mengambil dos berganda untuk mengganti dos yang terlepas. Jika anda mempunyai masalah diingatkan mengambil ubat anda, minta nasihat ahli farmasi.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dengan serta-merta telefon doktor anda untuk nasihat, atau pergi Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital yang terdekat, jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak Nuelin Syrup, lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Jika anda telah mengambil Nuelin Syrup terlalu banyak, anda mungkin berasa sakit dan muntah. Anda mungkin merasa cepat marah, gelisah atau cemas. Anda mungkin tidak dapat tidur. Dalam kes-kes yang teruk, jantung anda berdenyut lebih cepat dan tidak sekata dan anda mungkin

mempunyai suhu badan yang tinggi, sangat dahaga, kekeliruan dan sawan.

Semasa menggunakan Nuelin Syrup

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda memulakan sebarang ubat baru, ingatkan doktor dan ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil Nuelin Syrup.

Beritahu mana-mana doktor lain, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil ubat ini.

Jika anda bakal menjalani pembedahan, beritahu pakar bedah atau pakar bius bahawa anda mengambil ubat ini.

Jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini, beritahu doktor anda dengan segera.

-Perkara tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Nuelin Syrup untuk merawat apa-apa aduan lain melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

Jangan memberi ubat kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Pesakit tidak dinasihatkan berhenti mengambil ubat ini atau mengurangkan dos tanpa memberitahu doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa minum arak atau merokok. Ini boleh mempengaruhi kesan Nuelin Syrup.

Kesan-kesan sampingan

Beritahu ahli farmasi atau doctor anda secepat mungkin jika anda tidak berasa sihat semasa anda mengambil Nuelin Syrup.

Ubat ini mungkin menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini pada sesetengah orang. Semua ubat-ubatan boleh memberi kesan sampingan. Kadang-kadang kesan ini adalah serius, tetapi kebanyakannya masa adalah tidak serius. Anda mungkin memerlukan rawatan jika terdapat beberapa kesan sampingan.

Jangan berasa bimbang tentang senarai kesan-kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak mengalami apa-apa daripada kesan-kesan ini.

Tanya ahli farmasi atau doctor anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda ada.

Beritahu ahli farmasi atau doctor anda jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- Loya, muntah-muntah, sakit perut
- Pedih ulu hati
- Denyutan jantung yang cepat

Jika mana-mana yang berikut berlaku, beritahu doctor anda dengan segera atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat anda:

- Denyutan jantung yang sangat tidak teratur atau lebih cepat
- Sawan

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang sangat serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera atau rawatan hospital. Kesan-kesan sampingan ini adalah amat jarang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan, atau laman web npra.moh.gov.my (Public→Reporting)

Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)

Cara penyimpanan dan pelupusan Nuelin Syrup

-Penyimpanan

Simpan ubat dalam pek asal.

Jangan keluarkan ubat daripada pek tersebut sebab ia mungkin jadi rosak.

Simpan ubat anda di tempat yang suhu sederhana dan kering. (di bawah 30°C).

Jangan simpan Nuelin Syrup atau mana-mana perubatan lain di bilik mandi atau berhampiran sinki. Jangan biarkan ia di ambang tingkap atau di dalam kereta.

Haba panas dan kelembapan boleh merosakkan ubat ini.

Pastikan ubat ini sentiasa dijauhkan daripada kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter di atas lantai adalah tempat yang baik untuk menyimpan ubat.

-Pelupusan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan mana-mana ubat yang ditinggalkan, atau jika tarikh luput telah berlaku.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Nuelin Syrup adalah ubat sirap jelas, hamper cecair, berasa berry yang terkandung dalam botol 100ml.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Setiap 15mL Nuelin Syrup mengandungi:

- Theophylline 80mg

-Bahan tidak aktif

- Sucrose
- Sorbitol
- Berry citrus flavouring
- Purified water
- Methylhydroxybenzoate
- Propylhydroxybenzoate

-Nombor MAL

MAL13025048ACZ

Pengilang

Ensign Laboratories Pty Ltd
490-500 Wellington Road
Mulgrave Victoria
Australia 3170

Pemegang Pendaftaran Produk

iNova Pharmaceuticals (Singapore) Pte Ltd Ltd (Incorporated in Singapore)
Malaysia Branch
5F-2, 5th Floor,
Tower 2, @ PFCC,
Jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri,
47100 Puchong,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

25/03/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)240523/1276