

Nuelin SR 125 dan 250mg tablet

Theophylline 125mg; 250mg (as sustained-released tablet)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Nuelin SR tablet
2. Bagaimana Nuelin SR tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Nuelin SR tablet
4. Cara menggunakan Nuelin SR tablet
5. Semasa menggunakan Nuelin SR tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Nuelin SR tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Nuelin SR tablet

Nuelin SR tablet digunakan untuk merawat asma dan keadaan sukar nafas. Ia juga digunakan untuk mencegah serangan asma.

Bagaimana Nuelin SR tablet berfungsi

Theophylline menyebabkan kelonggaran lapisan otot saluran udara.

Sebelum menggunakan Nuelin SR tablet

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan menggunakan ubat ini jika anda mempunyai alahan kepada:

- mana-mana ubat yang mengandungi Theophylline
- Xanthines
- mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Sesetengah symptom reaksi alahan termasuk:

- sesak nafas
- bunyi berdehit atau kesukaran pernafasan
- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- ruam dan gatal-gatal kulit

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek atau jika bungkusan koyak atau terdapat kesan-kesan terbuka.

Nuelin SR tablet telah diberikan untuk anda sahaja. Jangan memberikannya kepada orang lain yang mengalami keadaan yang sama.

Jangan menggunakan Nuelin SR tablet untuk merawat serangan asma. Gunakan ubat inhaler anda (seperti Salbutamol).

-Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan kepada apa-apa ubat-ubatan lain, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda ada masalah kesihatan yang berikut:

- Penyakit tiroid
- Kelemahan jantung
- Pneumonia
- Jangkitan virus
- Penyakit hati

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil apa-apa ubat-ubatan lain untuk asma.

Beritahu doktor anda jika anda mengandung atau bercadang untuk hamil atau menyusui.

Doktor atau ahli farmasi anda boleh berbincang dengan anda manfaat dan risiko yang terlibat.

Jika anda belum memberitahu ahli farmasi atau doktor anda mengenai mana-mana di atas, beritahu dia sebelum anda mula mengambil Nuelin SR tablet.

-Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda dapat tanpa preskripsi atau yang herba dari farmasi anda, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan Nuelin SR tablet boleh mengganggu satu sama lain. Ini termasuk:

- Phenobarbitone
- Phenytoin
- Carbamazepine
- Rifampicin
- Halothane
- Beta-adrenergic agonists

Ubat-ubatan ini mungkin berinteraksi dengan Nuelin SR tablet atau keberkesanannya mungkin terjejas. Anda mungkin memerlukan dos ubat yang berbeza, atau mengambil ubat yang berbeza.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil arak atau merokok.

Ahli farmasi atau doktor anda mempunyai maklumat ubat-ubatan untuk memerlukan perhatian atau dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Nuelin SR tablet

Ikut semua arahan pada pek atau arahan yang diberikan oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti.

Arahan ini mungkin berbeza dengan maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Jika anda tidak memahami arahan pada botol, minta ahli farmasi atau doktor anda untuk membantu.

-Berapa banyak harus diambil

Dos untuk orang dewasa biasanya 250mg dua kali sehari. Walaubagaimapun, dos ini boleh bertambah atau dikurangkan oleh doktor anda. Oleh sebab ini, doktor mungkin memberikan anda dos setengah tablet.

Bagi kanak-kanak berusia lebih 2 tahun, dos Nuelin SR tablet bergantung kepada berat badan kanak-kanak.

Nuelin SR tablet tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun.

Nuelin SR tablet tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun.

Nuelin SR tablet harus diambil setiap 12 jam. Ambil Nuelin SR tablet dengan segelas penuh air dan jangan menguyah atau menghancurkan tablet.

-Bila perlu mengambil

Anda boleh mengambil Nuelin SR tablet dengan atau sebaik sahaja selepas makan supaya ia tidak membawa kesan buruk dalam perut.

-Berapa lama perlu diambil

Ambil ubat ini selagi doktor anda memberitahu anda atau jika perlu.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa mengambil Nuelin SR tablet anda, mengambilnya dengan seberapa segera yang anda ingat.

Walau bagaimanapun, jika ia lebih daripada 4 jam, skip dos anda yang terlepas dan mengambil dos anda pada masa biasa.

Jangan sekali-kali mengambil dos berganda untuk mengganti dos yang terlepas. Jika anda mempunyai masalah diingatkan mengambil ubat anda, minta nasihat ahli farmasi.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dengan serta-merta telefon doktor anda untuk nasihat, atau pergi Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital yang terdekat, jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak Nuelin SR tablet, lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Jika anda telah mengambil Nuelin SR tablet terlalu banyak, anda mungkin berasa sakit dan muntah. Anda mungkin merasa cepat marah, gelisah atau cemas. Anda mungkin tidak dapat tidur. Dalam kes-kes yang teruk, jantung anda berdenyut lebih cepat dan tidak sekata dan anda mungkin mempunyai suhu badan yang tinggi, sangat dahaga, kekeliruan dan sawan.

Semasa menggunakan Nuelin SR tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Nuelin SR tablet membantu untuk mencegah serangan asma. Anda diperlukan sentiasa mengambil Nuelin SR tablet secara berterusan atas nasihat doktor anda, walaupun anda tidak mengalami apa-apa gejala asma. Jika anda berfikir masalah asma menjadi semakin teruk atau jika anda mengalami serangan asma, sila berjumpa doktor anda dengan segera.

Nuelin SR tablet tidak akan memberi kelegaan semasa serangan asma, sila menggunakan ubat inhaler anda (seperti Salbutamol).

Jika anda memulakan sebarang ubat baru, ingatkan doktor dan ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil Nuelin SR tablet.

Beritahu mana-mana doktor lain, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil ubat ini.

Jika anda bakal menjalani pembedahan, beritahu pakar bedah atau pakar bius bahawa anda mengambil ubat ini.

Jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini, beritahu doktor anda dengan segera.

-Perkara tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Nuelin SR tablet untuk merawat apa-apa aduan lain melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

Jangan memberi ubat kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Anda tidak dinasihatkan berhenti mengambil ubat ini atau mengurangkan dos tanpa memberitahu doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa minum arak atau merokok. Ini boleh mempengaruhi kesan Nuelin SR tablet.

Kesan-kesan sampingan

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda secepat mungkin jika anda tidak berasa sihat semasa anda mengambil Nuelin SR tablet.

Ubat ini mungkin menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini pada

sesetengah orang. Semua ubat-ubatan boleh memberi kesan sampingan. Kadang-kadang kesan ini adalah serius, tetapi kebanyakannya masa adalah tidak serius. Anda mungkin memerlukan rawatan jika terdapat beberapa kesan sampingan.

Jangan berasa bimbang tentang senarai kesan-kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak mengalami apa-apa daripada kesan-kesan ini.

Tanya ahli farmasi atau doctor anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda ada.

Beritahu ahli farmasi atau doctor anda jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- Gastrik
- Loya dan muntah-muntah
- Hilang selera makan
- Pedih ulu hati
- Kesukaran tidur
- Tremor (mengeletar)

Jika mana-mana yang berikut berlaku, beritahu doctor anda dengan segera atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat anda:

- Denyutan jantung yang sangat tidak teratur atau lebih cepat
- Sawan

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang sangat serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera atau rawatan hospital. Kesan-kesan sampingan ini adalah amat jarang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public→Reporting Medicinal Problems/Side Effects/AEFI)

Cara penyimpanan dan pelupusan Nuelin SR tablet

-Penyimpanan

Simpan ubat dalam pek asal.

Jangan keluarkan ubat daripada pek tersebut sebab ia mungkin jadi rosak.

Simpan ubat anda di tempat yang suhu sederhana dan kering. (di bawah 30°C).

Jangan simpan Nuelin SR tablet atau mana-mana perubatan lain di bilik mandi atau berhampiran sinki. Jangan biarkan ia di ambang tingkap atau di dalam kereta.

Haba panas dan kelembapan boleh merosakkan ubat ini.

Pastikan ubat ini sentiasa dijauhkan daripada kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter di atas lantai adalah tempat yang baik untuk menyimpan ubat.

-Pelupusan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan mana-mana ubat yang ditinggalkan, atau jika tarikh luput telah berlaku.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Setiap kotak Nuelin SR tablet mengandungi 100 pil dalam bentuk pek blister.

Nuelin SR 125 tablet adalah ubat pil bulat warna putih yang bertanda 125 pada permukaan pil dan N/L di sebelah pil.

Nuelin SR 250 tablet adalah ubat pil bulat warna putih yang bertanda 250 pada permukaan pil dan N/L di sebelah pil.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Setiap Nuelin SR 125 tablet mengandungi:

- Theophylline 125mg

Setiap Nuelin SR 250 tablet mengandungi:

- Theophylline 250mg

-Bahan tidak aktif

- Guar Gum
- Magnesium Stearate

-Nombor MAL

MAL13085050ACZ (125mg)

MAL13075064ACZ(250mg)

Pengilang

Adcock Ingram Ltd
No.49 (C&D),
Bommasandra Industrial Area,
Anekal Taluk Bangalore 560099,
India

Pemegang Pendaftaran Produk

iNova Pharmaceuticals (Singapore) Pte Ltd (Incorporated in Singapore)
Malaysia Branch
5F-2, 5th Floor,
Tower 2, @ PFCC,
Jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri,
47100 Puchong,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

28/03/2025

Nombor Siri

NPRA (R1/1) 28032025/064