

Norflex Tablet 100mg

Orphenadrine citrate 100mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Norflex Tablet 100mg
2. Bagaimana Norflex Tablet 100mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Norflex Tablet 100mg
4. Cara menggunakan Norflex Tablet 100mg
5. Semasa menggunakan Norflex Tablet 100mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Norflex Tablet 100mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Norflex Tablet 100mg

Norflex Tablet 100mg digunakan untuk melegakan otot tertentu dalam badan anda dan untuk melegakan kesakitan dan ketidakselesaan yang disebabkan oleh keseliuhan, strain atau kecederaan lain untuk otot-otot anda.

Bagaimana Norflex Tablet 100mg berfungsi

Orphenadrine citrate adalah sejenis ubat melegakan kekejangan otot. Ia bertindak di sistem saraf pusat untuk menghasilkan kesan relaks otot.

Sebelum menggunakan Norflex Tablet 100mg

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan menggunakan ubat ini jika anda mempunyai alahan kepada:

- mana-mana ubat yang mengandungi Orphenadrine citrate

- mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Jangan menggunakan ubat ini jika anda mempunyai mana-mana yang berikut:

- glaucoma (tekanan tinggi dalam mata)
- usus tersumbat atau penyakit oesophageal
- pembesaran prostat atau pundi kencing halangan
- myasthenia gravis (penyakit oto yang menyebabkan kekenduran kelopak mata, penglihatan berganda, sukar bercakap dan menelan, dan, kadang-kadang, kelemahan otot pada tangan atau kaki).

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek atau jika bungkusannya koyak atau terdapat kesan-kesan terbuka.

Jangan memberikan ubat ini kepada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.

Keselamatan dan keberkesanan di kalangan kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun belum dipastikan.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu ahli farmasi anda jika anda mempunyai:

- Alahan kepada apa-apa ubat-ubatan lain, makanan, pengawet atau pewarna.
- Mempunyai sebarang masalah jantung
- Mempunyai apa-apa masalah hati atau buah pinggang

Pengambilan Norflex Tablet 100mg tidak digalakkan semasa mengandung atau menyusukan bayi. Beritahu doktor

anda jika anda hamil atau bercadang untuk hamil atau menyusukan bayi.

Jika anda tidak pasti sama ada untuk mula mengambil ubat ini, berbincang dengan doktor anda.

-Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda dapat tanpa preskripsi atau yang herba dari farmasi anda, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan Norflex Tablet 100mg boleh mengganggu satu sama lain. Ini termasuk:

- Anti-muscarinic ubat (seperti amantadine, butyrophenones, phenothiazine & tricyclic antidepressants).

Anda mungkin memerlukan jumlah ubat-ubatan anda yang berbeza, atau anda mungkin perlu mengambil ubat-ubatan yang berbeza. Doktor atau ahli farmasi mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat-ubatan untuk perhatian atau dielakkan sementara mengambil Norflex Tablet 100mg.

Cara menggunakan Norflex Tablet 100mg

Ikut semua arahan pada pek atau arahan yang diberikan oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti.

Arahan ini mungkin berbeza dengan maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Jika anda tidak memahami arahan pada botol, minta ahli farmasi atau doktor anda untuk membantu.

-Berapa banyak harus diambil

Dewasa: Satu biji dua kali sehari

Ambil Norflex Tablet 100mg seperti mana yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi. Jangan menukar dos sendiri kecuali atas arahan doktor.

-Bila perlu mengambil

Ambil Norflex Tablet 100mg dengan atau tanpa makanan.

-Berapa lama perlu diambil

Ambil ubat ini selagi doktor anda memberitahu anda atau jika perlu.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa mengambil satu dos Norflex Tablet 100mg dan ingat dalam masa sejam, ambil ubat ini dengan segera. Jika anda tidak ingat, skip dos anda terlepas dan mengambil dos anda yang berikutnya.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dengan serta-merta telefon doktor anda untuk nasihat, atau pergi Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital yang terdekat, jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak Norflex Tablet 100mg, lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Gejala akibat dos berlebihan termasuk kehairahan; kekeliruan; kekeliruan yang teruk yang boleh menyebabkan koma; sawan; kadar denyutan jantung yang cepat, pengembangan pupil mata dan kesikaran membuang air kecil.

Semasa menggunakan Norflex Tablet 100mg

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda

bahawa anda menggunakan Norflex Tablet 100mg.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil ketika menggunakan ubat ini.

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana ubat ini memberi kesan kepada anda.

Norflex Tablet 100mg boleh menyebabkan sesetengah orang mempunyai penglihatan yang kabur atau menjadi mengantuk, pening, pengsan atau kurang berjaga-jaga. Ia juga boleh menyebabkan kelemahan otot pada sesetengah orang. Jika anda mempunyai sebarang gejala-gejala ini, jangan memandu atau mengendalikan jentera atau berbuat apa-apa lain yang boleh membahayakan.

Norflex Tablet 100mg boleh menyebabkan kekeringan mulut. Untuk melegakan mulut kering, ambil gula-gula getah atau gula-gula tanpa gula, mencairkan sedikit ais di dalam mulut anda atau menggunakan pengganti air liur.

Jika mulut kering berterusan selama lebih dari 2 minggu, beritahu doktor gigi anda.

Kekeringan berterusan mulut boleh meningkatkan peluang penyakit pergigian, termasuk kerosakan gigi, penyakit gusi dan jangkitan kulat.

-Perkara tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Norflex Tablet 100mg untuk merawat apa-apa aduan lain melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

Jangan memberi ubat kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana Norflex Tablet 100mg memberi kesan kepada anda.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat-ubatan boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kadang-kadang ia adalah serius, kebanyakan masa adalah tidak serius.

Kesan sampingan berikut biasanya tidak memerlukan perhatian perubatan dan mungkin akan hilang semasa rawatan apabila tubuh anda menyesuaikan diri dengan ubat.

Berbincang dengan doktor anda jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan berikut terus atau membimbangkan anda:

Lebih biasa: loya, mulut kering, penglihatan kabur.

Kurang biasa atau jarang berlaku: ruam, rasa mengantuk.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga mungkin berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public→Reporting Medicinal Problems/Side Effects/AEFI)

Cara penyimpanan dan pelupusan Norflex Tablet 100mg

- Lactose

-Penyimpanan

Simpan ubat anda di tempat yang suhu sederhana dan kering. (di bawah 30 ° C).

Jangan simpan Norflex Tablet 100mg atau mana-mana perubatan lain di bilik mandi atau berhampiran sinki. Jangan biarkan ia di ambang tingkap atau di dalam kereta.

Haba panas dan kelembapan boleh merosakkan ubat ini.

Pastikan ubat ini sentiasa dijauhkan daripada kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter di atas lantai adalah tempat yang baik untuk menyimpan ubat.

-Pelupusan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan mana-mana ubat yang ditinggalkan, atau jika tarikh luput telah berlalu.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Norflex Tablet 100mg adalah ubat pil warna putih yang bertanda N/X dan tiada tanda di sebelah pil. Ia dipek dalam pek blister yang mengandungi 100 biji pil.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Setiap tablet mengandungi:

- Orphenadrine citrate 100mg

-Bahan tidak aktif

- Magnesium Stearate
- Colloidal Anhydrous Silica
- Ethyl Cellulose

-Nombor MAL

MAL13055067ACRZ

Pengilang

Adcock Ingram Ltd
No.49 (C&D),
Bommasandra Industrial Area,
Anekal Taluk Bangalore 560099,
India

Pemegang Pendaftaran Produk

iNova Pharmaceuticals (Singapore) Pte
Ltd (Incorporated in Singapore)
Malaysia Branch
6F-2A, 6th Floor,
Tower 4, The PFCC,
Jalan Puteri 1/2 , Bandar Puteri,
47100 Puchong,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

28/03/2025

Nombor Siri

NPRA (R1/1) 28032025/063