

DYNA C 100 TABLET

Ascorbic Acid (100 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dyna C 100 Tablet
2. Bagaimana Dyna C 100 Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dyna C 100 Tablet
4. Cara menggunakan Dyna C 100 Tablet
5. Semasa menggunakan Dyna C 100 Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna C 100 Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dyna C 100 Tablet

Digunakan sebagai suplemen kesihatan.

Bagaimana Dyna C 100 Tablet berfungsi

Ascorbic Acid digunakan untuk membuat kolagen dan bahan dalam sel-sel badan. Ia juga berguna dalam penyerapan zat besi daripada saluran gastro-usus dan dalam rawatan sesetengah masalah darah.

Sebelum menggunakan Dyna C 100 Tablet

- *Bila tidak boleh menggunakan*
- Sekiranya anda alah (hipersensitif) kepada sebarang bahan-bahan kandungan produk ini.

Mengandung dan menyusukan anak
Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Dyna C 100 Tablet.

- Sebelum mula menggunakan Dyna C 100 Tablet

Beritahu doktor jika anda mempunyai masalah:

- Pembuangan *oxalate* (bahan yang berkaitan dengan batu karang) dalam air kencing secara berlebihan
- Phenylketouria (PKU)

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Dyna C 100 Tablet

- *Berapa banyak harus digunakan*
Kanak-kanak (4 – 12 tahun dan ke atas): 2 – 4 tablet sekali sehari selepas makan atau seperti diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

Arahan yang diberikan mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Dyna C 100 Tablet untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Pengambilan dos Ascorbic Acid berlebihan selalunya diikuti dengan pembuangan air kencing berlebihan dan cirit-birit.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Dyna C 100 Tablet

- *Perkara yang perlu dilakukan*
Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dyna C 100 Tablet.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri Dyna C 100 Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika tablet ini membuat anda merasa loya, pening atau letih, atau memberikan sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Ascorbic Acid-biasanya ditoleransi dengan baik. Dos yang besar mungkin menyebabkan cirit-birit dan pembentukan batu karang. Dos 600 mg atau lebih meningkatkan penghasilan air kencing.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna C 100 Tablet

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak
Lindungi daripada cahaya
Simpan di tempat kering di bawah 30°C

Pastikan bekas ditutup rapat

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

DYNA C 100 TABLET

Ascorbic Acid (100 mg)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet tidak bersalut berbentuk bujur yang boleh dikunyah, dengan warna dan perisa oren.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ascorbic Acid

- Bahan-bahan tidak aktif

Sunset Yellow, Sunset Yellow Lake, Aerosil, Aspartame, Mannitol, Magnesium Stearate, Lactose, Gelatin 240/250 Bloom & Orange Powder.

- Nombor MAL

MAL19972895XZ

Pengilang

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.

2497, Mk. 1, Lorong Perusahaan Baru
5, Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600
Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Izuhan Pharmacy Sdn. Bhd.

94, Lebuhr Campbell,
10100 Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

20/10/2020

Nombor Siri

NPRA(R4/2)201020/00283