

TOKUSHIN MEDICAL PLASTER

Menthol (6.50%w/w), Methyl Salicylate (5.00%w/w), Camphor (1.25%w/w)

Apakan yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan TOKUSHIN MEDICAL PLASTER
2. Bagaimana TOKUSHIN MEDICAL PLASTER berfungsi
3. Sebelum mengambil TOKUSHIN MEDICAL PLASTER
4. Cara menggunakan TOKUSHIN MEDICAL PLASTER
5. Semasa menggunakan TOKUSHIN MEDICAL PLASTER
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan TOKUSHIN MEDICAL PLASTER
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakan kegunaan TOKUSHIN MEDICAL PLASTER

Untuk melegakan sakit reumatik, neuralgia, ketegangan bahu, lebam, terseliuh, dan sakit otot yang lain.

Bagaimana TOKUSHIN MEDICAL PLASTER berfungsi

TOKUSHIN MEDICAL PLASTER mengandungi bahan aktif Menthol, Methyl Salicylate, dan Camphor. Menthol, apabila digunakan pada kulit, melancarkan saluran darah yang menyebabkan sensasi kesejukan diikuti dengan kesan analgesik. Diaplikasikan secara luaran, Methyl Salicylate digunakan untuk melegakan kesakitan pada gangguan muskuloskeletal, sendi dan tisu lembut. Camphor bertindak sebagai analgesik rubefacient dan ringan.

Sebelum mengambil TOKUSHIN MEDICAL PLASTER

Bila tidak boleh digunakan

Jangan gunakan TOKUSHIN MEDICAL PLASTER jika

1. Anda mengambil warfarin, penggunaan secara berlebihan ke kulit untuk otot atau sakit sendi dapat meningkatkan peluang pendarahan.
2. Anda mempunyai kulit sensitif atau dermatitis
3. Penggunaan secara terus ke dalam lubang hidung.

Sebelum menggunakannya

Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Sekiranya anda alah kepada Menthol, Methyl Salicylate, dan Camphor, atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

Pengambilan ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil warfarin.

Cara menggunakan TOKUSHIN MEDICAL PLASTER

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 1 hingga 2 kali sehari.

Bila perlu digunakan

Gunakan untuk melegakan sakit reumatik, neuralgia, ketegangan bahu, lebam, terseliuh, dan sakit otot yang lain.

Berapa lama perlu digunakan

Penggunaan harus diteruskan apabila terdapat tanda-tanda sakit reumatik, neuralgia, ketegangan bahu, lebam, terseliuh, dan sakit otot yang lain.

Jika terlupa menggunakan

Gunakan product ini dengan segera dan kemudian teruskan penggunaan macam biasa.

Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Pesakit yang mengambil warfarin mungkin berisiko mengalami pendarahan jika diaplikasi secara berlebihan pada kulit.

Semasa menggunakan TOKUSHIN MEDICAL PLASTER

Perkara yang perlu dilakukan

Pastikan tempat yang terjejas adalah bersih dan kering.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Produk ini tidak sewajarnya digunakan pada bayi and kanak-kanak di bawah umur 2 tahun dan dikontraindikasikan pada mereka yang menunjukkan hipersensitiviti terhadap sebarang komponen dalam formulasi ini.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Untuk kegunaan luaran sahaja. Jauhkan daripada kanak-kanak.

Kesan-kesan Sampingan

Hentikan penggunaan jika ruam, kegatalan, kemerahan atau ledakan berlaku

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web www.npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan TOKUSHIN MEDICAL PLASTER

Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C

Simpan di tempat yang kering dan sejuk serta terlindung daripada cahaya.

Pelupusan

Lupuskan produk selepas tarikh luput.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk TOKUSHIN MEDICAL PLASTER

Plaster fabrik bersegi empat tepat dilapisi dengan lapisan nipis koloid berubat.

Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan ramuan di dalam produk ini ialah Menthol, Methyl Salicylate, Camphor, Liquid Paraffin, Rubber RSS1, Wingstay L, Polyisobutene, Zinc Oxide, Hydrocarbon Resin, Polybutene, dan Lanolin Anhydrous.

Nombor MAL

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

THP Medical Sdn. Bhd
(1135528-K)

Lot PT 1281 (Plot 308), Jalan Perindustrian Bukit Minyak 18, Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, 14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

01/10/2024

Nombor siri

NPRA(R2)24/110

