

LAZINE 5MG TABLETS

Levocetirizine dihydrochloride (5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan LAZINE
2. Bagaimana LAZINE berfungsi
3. Sebelum mengambil LAZINE
4. Cara mengambil LAZINE
5. Semasa mengambil LAZINE
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan LAZINE
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemasikini RiMUP

Apakah kegunaan LAZINE

LAZINE digunakan untuk merawat symptom-symptom:

- Alahan rinitis (keradangan membran mukus di dalam hidung) termasuk alahan rinitis berpanjangan.
- Gatal-gatal berpanjangan yang tidak diketahui puncanya.

Bagaimana LAZINE berfungsi

LAZINE mengandungi bahan aktif *levocetirizine dihydrochloride*.

LAZINE adalah ubat anti alahan. Ia bertindak dengan menghalang sejenis bahan semulajadi (histamina) yang dihasilkan oleh badan anda semasa reaksi alahan.

Sebelum mengambil LAZINE

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil LAZINE sekiranya anda:

- Alah (hipersensitif) kepada bahan aktif *levocetirizine dihydrochloride*, *cetirizine*, *piperazine* atau apa-apa bahan yang disenaraikan terkandung di dalam produk.
- Mempunyai kemerosotan fungsi buah pinggang yang teruk dengan *creatinine clearance* di bawah 10ml/min.

Penggunaan LAZINE adalah tidak digalakkan bagi bayi dan kanak-kanak di bawah 6 tahun.

Kehamilan dan penyusuan

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil mana-mana ubat. Beritahu doktor jika anda hamil, bercadang untuk hamil atau menyusukan bayi.

-Sebelum mula mengambil LAZINE

Beritahu doktor anda jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda mempunyai intoleransi terhadap sesetengah gula. Tablet ini mengandungi laktosa.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil *theophylline* (digunakan untuk merawat penyakit asma) atau anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Cara mengambil LAZINE

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa mengambil LAZINE seperti mana yang diberitahu oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Dos harian yang biasa untuk:

- Orang dewasa dan kanak-kanak berumur 6 tahun dan ke atas: 5mg (1 tablet bersalut).

Arahan dos khas bagi golongan tertentu:

Jika anda mengalami gangguan fungsi buah pinggang, anda mungkin akan diberi dos yang lebih rendah mengikut keterukan tahap penyakit buah pinggang anda, dan berat badan akan diambil kira bagi kanak-kanak. Dos akan ditentukan oleh doktor anda.

Jika anda mengalami penyakit buah pinggang peringkat akhir atau sedang menjalani dialisis, anda tidak boleh mengambil LAZINE.

Tiada penyesuaian dos diperlukan jika anda menghadapi kemerosotan hati. Namun, jika anda menghadapi kedua-dua kemerosotan hati dan buah pinggang, sila berjumpa dengan doktor anda untuk penyesuaian dos.

Tiada penyesuaian dos diperlukan bagi warga tua, dengan syarat fungsi buah pinggang mereka adalah normal.

-Bila perlu diambil

Tablet bersalut harus diambil secara oral, ditelan sepenuhnya bersama cecair dan boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

-Berapa lama perlu digunakan

Jangka masa penggunaan bergantung kepada jenis, tempoh dan jenis aduan anda dan ditentukan oleh doktor anda.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini. Tanya doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa untuk mengambil LAZINE atau jika anda mengambil dos yang lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh doktor, jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

Teruskan pengambilan dengan mengambil dos yang seterusnya tepat pada masanya.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital yang berdekatan anda dengan segera jika

LAZINE 5MG TABLETS

Levocetirizine dihydrochloride (5mg)

anda merasakan anda atau orang lain telah mengambil ubat ini secara berlebihan walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan yang segera.

Simptom-simptom terlebih dos termasuklah rasa mengantuk di kalangan dewasa dan pada mulanya kegelisahan dan keresahan, diikuti oleh rasa mengantuk di kalangan kanak-kanak.

Semasa menggunakan LAZINE

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor pergigian dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil LAZINE.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa sedang mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil mana-mana ubat-ubatan baharu tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan LAZINE kepada orang lain walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian harus diberikan jika LAZINE diambil bersama alkohol. Bagi mereka yang sensitif, penggunaan serentak cetirizine atau levocetirizine dengan alkohol atau ubat-ubatan lain yang bertindak ke atas otak boleh menjejaskan kewaspadaan.

Dalam ujian klinikal, kejadian mengantuk telah dilaporkan pada sesetengah orang yang mengambil cetirizine. Oleh itu, langkah berjaga-jaga perlu diambil apabila anda

memandu kereta atau mengendalikan jentera yang berpotensi berbahaya.

Kesan-kesan sampingan

LAZINE boleh menyebabkan kesan sampingan seperti:

Kerap berlaku

Mulut kering, sakit kepala, keletihan dan rasa mengantuk.

Tidak kerap berlaku

Sakit perut.

Berhenti mengambil LAZINE dan segera rujuk kepada doktor anda sebaik sahaja anda mengalami hipersensitiviti atau mana-mana kesan sampingan.

Reaksi hipersensitiviti mungkin termasuk bengkak mulut, lidah, muka dan/atau tekak, kesukaran bernafas atau menelan (sesak dada atau berdehit) gatal- gatal, dan reaksi alahan serius yang mungkin membawa maut.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perasan sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan dengan melayari laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConsSERF)* or *Vaccines (AEFI)*]

Cara penyimpanan dan pelupusan LAZINE

-Penyimpanan

Simpan di tempat kering di bawah suhu 25°C dan terlindung daripada cahaya.

Simpan LAZINE dan semua ubat yang lain dengan selamat, dan jauh daripada kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas bulan dan tahun yang ditunjukkan oleh angka selepas EX (atau EXP) yang dinyatakan pada pek. Dua angka pangkal menunjukkan bulan, manakala dua angka hujung menunjukkan tahun.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Penerangan Produk

-Rupa dan warna produk

Tablet bersalut berwarna putih, berskor, berbentuk bulat, tablet cekung standard, yang diukir dengan '161' pada satu sisi dan 'H' pada satu sisi sebelah lagi.

Saiz Pek: 3x10's Pek Blister Aluminium

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:

Setiap tablet bersalut mengandungi *Levocetirizine Dihydrochloride* (5mg)

-Bahan tidak aktif:

- *Lactose monohydrate*
- *Microcrystalline cellulose*
- *Silica, colloidal anhydrous*
- *Magnesium stearate*
- *Opadry White YS-1-7003*
- *Purified Water*

-Nombor MAL:

MAL11070006AZ

Pengilang

Hetero Labs Limited

Unit – III, 22 - 110, I.D.A., Jeedimetla, Hyderabad – 500 055, Telangana, India.

LAZINE 5MG TABLETS

Levocetirizine dihydrochloride (5mg)

Pemegang Pendaftaran Produk

Camber Laboratories Sdn. Bhd.,
Unit E-13A-02, Menara SUEZCAP 2,
No. 2, KL Gateway, Jalan Kerinchi,
Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 Kuala
Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

11/11/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/1)241106/1368