

AMLO-H 5mg TABLET

AMLO-H 10mg TABLET

Amlodipine Besilate (5 mg & 10 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan AMLO-H
2. Bagaimana AMLO-H berfungsi
3. Sebelum menggunakan AMLO-H
4. Cara menggunakan AMLO-H
5. Semasa menggunakan AMLO-H
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan AMLO-H
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan AMLO-H

AMLO-H adalah salah satu daripada kumpulan ubat dikenali sebagai kalsium antagonis. AMLO-H digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi) atau beberapa jenis sakit dada dipanggil angina, satu bentuk yang jarang berlaku yang dikenali sebagai Prinzmetal atau varian angina.

Bagaimana AMLO-H berfungsi

Pada pesakit dengan tekanan darah tinggi, AMLO-H berfungsi dengan menenangkan saluran darah, supaya darah mengalir dengan lebih lancar. Dalam keadaan pesakit angina, AMLO-H berfungsi dengan meningkatkan bekalan darah ke otot jantung yang kemudiannya menerima lebih oksigen dan menghalang berlakunya kesakitan dada. AMLO-H tidak memberikan bantuan segera sakit dada dari angina.

Sebelum menggunakan AMLO-H

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan AMLO-H jika anda ada alahan kepada amlodipine (bahan aktif dalam AMLO-H), atau kepada bahan-bahan tidak aktif. Doktor atau ahli farmasi boleh memberikan anda salinan senarai bahan-bahan ini.

-Sebelum mula menggunakan AMLO-H anda:

- pernah mengalami sakit jantung
- pernah mengalami masalah hati
- sedang hamil atau merancang untuk hamil. Doktor anda akan menentukan jika AMLO-H adalah rawatan yang terbaik untuk anda.
- sedang menyusukan bayi. Jangan menyusukan anak semasa mengambil AMLO-H. Anda boleh berhenti menyusu atau mengambil ubat yang berbeza.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi, termasuk ubat semula jadi atau herba.

Cara menggunakan AMLO-H.

Ambil AMLO-H dengan makanan dan minuman. Ubat anda boleh digunakan sebelum atau selepas makan. Jus limau gedang tidak boleh dimakan oleh orang-orang yang mengambil AMLO-H. Ini kerana limau dan jus limau gedang boleh membawa kepada peningkatan dalam tahap darah ramuan amlodipine aktif, yang boleh menyebabkan peningkatan tidak menentu dalam tekanan darah dan mengurangkan kesan AMLO-H.

-Berapa banyak harus digunakan

Dos biasa AMLO-H adalah satu tablet setiap hari.

-Bila perlu digunakan

Ia adalah yang terbaik untuk mengambil ubat anda pada masayang sama setiap hari dengan meminum air. Jangan mengambil tablet AMLO-H dengan jus limau gedang.

Sentiasa mengambil ubat anda mengikut

seperti yang doctor anda telah sarankan. Anda perlu menyepak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda asih tidak pasti.

-Berapa lama perlu digunakan

Adalah penting untuk terus mengambil tablet. Jangan tunggu sehingga tablet anda kehabisan sebelum berjumpa doktor anda. Doktor anda akan menasihatkan anda berapa lama untuk mengambil ubat anda. Keadaan anda boleh kembali jika anda berhenti menggunakan ubat anda sebelum dinasihatkan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai bagaimana untuk mengambil produk ini, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa menggunakan

Jangan bimbang. Jika anda terlupa untuk mengambil tablet, tinggalkan dos tersebut. Ambil dos seterusnya pada masa yang tepat. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Mengambil terlalu banyak tablet sekali gus boleh membuatkan anda tidak sihat. Jika anda mengambil kandungan AMLO-H tablet dengan banyak sekaligus, hubungi doktor anda segera atau pergi ke jabatan hospital yang terdekat.

Semasa menggunakan AMLO-H

-Perkara yang perlu dilakukan

Simpan risalah ini. Anda mungkin perlu membacanya lagi. Jika andamempunyai sebarang pertanyaan lanjut, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

AMLO-H 5mg TABLET

AMLO-H 10mg TABLET

Amlodipine Besilate (5 mg & 10 mg)

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini telah ditetapkan untuk anda. Jangan serahkan kepada oranglain. Ia boleh membahayakan mereka, walaupun tanda-tanda mereka adalah sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Kehamilan

Jika anda fikir anda mungkin hamil, atau sedang merancang untuk hamil, beritahu doktor anda sebelum anda mengambil AMLO- H. Wanita yang berpotensi untuk hamil perlu memastikan bahawa mereka menggunakan kontrasepsi yang efektif.

Menyusukan anak

Anda tidak boleh mengambil AMLO-H jika anda sedang menyusukan bayi. Rujuk kepada doctor atau ahli farmasi and sebelum mengambil sebarang ubat.

Memandu dan menggunakan sebarang alatan

AMLO-H tidak berkemungkinan untuk menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan sebarang peralatan.

Kesan-kesan sampingan

kesan-kesan sampingan yang berikut. Kebanyakan kesan sampingan adalah ringan atau sederhana:

- sakit kepala
- bengkak pada kaki atau pergelangan anda
- keletihan, mengantuk yang melampau
- sakit perut yang teruk, loya
- pening
- Kemerahan kulit (perasaan panas atau hangat di muka anda)
- debaran jantung (denyutan jantung yang sangat cepat)

Ia jarang berlaku, tetapi apabila anda mula-mula mengambil AMLO-H atau

meningkatkan dos anda, anda mungkin mengalami serangan jantung atau angina anda mungkin menjadi lebih buruk. Jika itu berlaku, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi terus ke bilik kecemasan hospital yang terdekat. Beritahu doktor anda jika anda bimbang tentang apa-apa kesan sampingan yang anda alami. Ini bukan semua kesan sampingan yang mungkin disebabkan oleh AMLO-H. Untuk senarai lengkap, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan AMLO-H

-Penyimpanan

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak. Jangan gunakan selepas tarikh luput yang dinyatakan pada karton selepas "EXP". Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir kepada bulan tersebut.

Jangan simpan melebihi 30°C. Simpan dalam bungkusan asal untuk melindungi dari kelembapan.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Rujuk ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

AMLO-H 5: Tablet Amlodipine 5 mg berwarna putih keputihan, tablet berbentuk bulat dicetak dengan "J" di

satu pihak dan "20" di sisi lain. Tablet yang boleh didapati dalam jalur blister pek 10.

AMLO-H 10: Berwarna putih keputihan berbentuk bulat, dicetak dengan "J" di satu pihak dan "21" di sisi lain. Tablet yang boleh didapati dalam jalur blister pek 10.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:

Bahan aktif adalah amlodipine (sebagai besilate).

AMLO-H 5: Setiap tablet mengandungi 5 mg amlodipine (sebagai besilate)

AMLO-H 10: Setiap tablet mengandungi 10 mg amlodipine (sebagai besilate).

-Bahan tidak aktif:

Selulosa microcrystalline, Silika Koloidal anhydrous dan Magnesium Stearate.

-Nombor MAL:

AMLO-H 5mg Tablet:

MAL16085020AZ

AMLO-H 10mg Tablet:

MAL16125033AZ

Pengilang

Hetero Labs Limited

Unit V, TSIC Formulation SEZ, S.No. 439, 440, 441 & 458, Polepally Village, Jadcherla, Mahaboob Nagar District – 509301, Telangana State, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Camber Laboratories Sdn. Bhd., Unit E-13A-02, Menara SUEZCAP 2, No. 2, KL Gateway, Jalan Kerinchi, Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

18/08/2025

AMLO-H 5mg TABLET

AMLO-H 10mg TABLET

Amlodipine Besilate (5 mg & 10 mg)

Nombor Siri

NPRA(R2/2)250818/1524