

OLMESAR 20 (OLMESARTAN MEDOXOMIL TABLETS 20MG)

OLMESAR 40 (OLMESARTAN MEDOXOMIL TABLETS 40MG)

Olmesartan Medoxomil (20mg & 40mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)
2. Bagaimana OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil) berfungsi
3. Sebelum mengambil OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)
4. Cara mengambil OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)
5. Semasa mengambil OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemasikini RiMUP

Apakah kegunaan OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)

Olmesartan Medoxomil tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil antagonis reseptor angiotensin-II. Ia digunakan untuk menurunkan tekanan darah.

Bagaimana OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil) berfungsi

Olmesartan Medoxomil menurunkan tekanan darah dengan menjadikan saluran darah tidak tegang dengan menghalang reseptor angiotensin-II.

Sebelum mengambil OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)

-Bila tidak boleh mengambil

Jika anda ada alahan kepada Olmesartan Medoxomil atau mana-mana bahan lain ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak
Jangan ambil OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil) jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil) jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor ahli farmasi sebelum mengambil ubat.

-Sebelum mula mengambil OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai masalah kesihatan yang berikut:

- Masalah buah pinggang
- Penyakit hati
- Penyakit jantung atau masalah dengan jantung anda.

Seperti mana-mana ubat yang mengurangkan tekanan darah, penurunan tekanan darah yang tinggi pada pesakit yang mempunyai gangguan aliran darah dalam jantung atau otak boleh mengakibatkan serangan jantung atau strok. Oleh itu doktor anda akan memeriksa tekanan darah anda dengan berhati-hati.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara mengambil OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)

-Berapa banyak harus digunakan

Dos biasa adalah 20mg sekali sehari. Dos boleh meningkat kepada 40mg sekali sehari. Jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati, dos maksimum adalah 20mg sekali sehari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan

OLMESAR 20 (OLMESARTAN MEDOXOMIL TABLETS 20MG)

OLMESAR 40 (OLMESARTAN MEDOXOMIL TABLETS 40MG)

Olmesartan Medoxomil (20mg & 40mg)

hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan tekanan darah rendah dan melambatkan denyutan jantung.

Semasa menggunakan OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil).

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil) dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin menyebabkan anda mengantuk atau pening kepala. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil) boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan biasa:

Pening, sakit kepala, mual, senak, cirit-birit, sakit perut, jangkitan dalam perut keletihan, sakit tekak, hidung berair atau tersumbat, bronkitis, simptom seperti selesema, batuk, sakit, sakit di dada, belakang, tulang atau sendi, jangkitan pada saluran kencing, bengkak pergelangan kaki, kaki, tangan, atau lengan, darah dalam air kencing.

Beberapa perubahan dalam keputusan ujian darah juga telah dilihat dan termasuk yang berikut: Peningkatan tahap lemak, meningkatkan kadar asid urik, peningkatan urea darah, peningkatan keputusan ujian fungsi hati dan otot.

Kesan sampingan tidak biasa

Bilangan platelet yang rendah; Bengkak muka, mulut dan/ atau kotak suara bersama-sama dengan gatal-gatal dan ruam (reaksi *anaphylactic*); pening; sakit dada; muntah; alahan pada kulit, kemerahan kulit, ruam, gatal; sakit otot; muka bengkak; tenaga berkurangan; tidak selesa.

Kesan sampingan jarang:

Tahap kalium yang tinggi dalam darah; tekanan darah menurun terlalu rendah; kulit bengkak; otot kejang; masalah buah pinggang; letih; *creatinine* dalam darah meningkat.

Kesan sampingan sangat jarang:

Cirit- birit yang kronik menyebabkan berat badan menurun.

Kesan sampingan yang tidak diketahui:

Jika anda mengalami kekuningan pada bahagian putih mata, air kencing yang gelap, gatal-gatal kulit, walaupun anda telah bermula terapi dengan OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan medoxomil) dari dulu lagi, hubungi doktor anda sertamerta. Doktor akan menilai gejala anda dan memutuskan bagaimana anda perlu meneruskan ubat-ubatan tekanan darah tinggi anda.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan OLMESAR 20 & 40 (Olmesartan Medoxomil)

-Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian dan

OLMESAR 20 (OLMESARTAN MEDOXOMIL TABLETS 20MG) OLMESAR 40 (OLMESARTAN MEDOXOMIL TABLETS 40MG)

Olmesartan Medoxomil (20mg & 40mg)

pandangan kanak-kanak.
Simpan di bawah suhu 30°C dan
lindungi daripada kelembapan.

-Pelupusan

Jangan buang ubat bersama-sama
dengan air sisa atau sampah dari rumah.
Tanyalah ahli farmasi tentang cara
membuang ubat yang tidak diperlukan
lagi. Langkah- langkah begini akan
membantu memelihara alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Untuk 20mg: Putih ke pudar putih,
bulat, dwicembung tablet bersalut filem
diukir dengan 'H' pada satu belah dan
'O3' pada belah lain.

Untuk 40mg: Putih ke pudar putih,
bujur, dwicembung tablet bersalut filem
diukir dengan 'H' pada satu belah dan
'O4' pada belah lain.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif: *Olmesartan Medoxomil*

-Bahan tidak aktif:

*Lactose Monohydrate, cellulose
microcrystalline, Low substituted
hydroxyl propyl cellulose,
Hydroxypropyl cellulose,
Magnesium stearate, Opadry white
03A580003, Purified water.*

-Nombor MAL:

OLMESAR 20: MAL18046167AZ

OLMESAR 40: MAL18046166AZ

Pengilang

Hetero Labs Limited
Unit V, Sy. No 439,440,441 & 458,
TSIIC Formulation SEZ,Polepally
Village,Jadcherla Mandal,
Mahaboobnagar Dist. - 509301,
Telangana, INDIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

Camber Laboratories Sdn Bhd
Unit E-13A-02,
Menara Suezcap 2, No 2,
KL Gateway, Jalan Kerinchi,
Gerbang Kerinchi Lestari,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

30/10/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/2)241030/1365

**OLMESAR 20 (OLMESARTAN MEDOXOMIL
TABLETS 20MG)
OLMESAR 40 (OLMESARTAN MEDOXOMIL
TABLETS 40MG)**

Olmesartan Medoxomil (20mg & 40mg)
