

DIFFERIN® GEL

Adapalene 0.1% w/w

Apa dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Differin® Gel
2. Bagaimana Differin® Gel berfungsi
3. Sebelum menggunakan Differin® Gel
4. Cara menggunakan Differin® Gel
5. Semasa menggunakan Differin® Gel
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara menyimpan dan pelupusan Differin® Gel.
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Differin® Gel

Differin® Gel adalah ubat preskripsi untuk kulit (luaran) sahaja bagi merawat jerawat-jerawat vulgaris di mana comedones, papules dan pustules mendominasi. Rawatan ini sesuai untuk jerawat di muka, dada atau belakang badan.

Bagaimana Differin® Gel berfungsi

Bahan aktif dalam Differin® Gel adalah Adapalene. Ia mempunyai sifat anti-radang yang mengurangkan komponen keradangan jerawat (papules dan pustules) dan menormalkan pembentukan sel kulit dan mengakhibatkan pembentukan jerawat menurun.

Sebelum anda menggunakan Differin® Gel

- Apabila tidak boleh menggunakannya

- Jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung.
- Jika anda alah kepada sebarang bahan di dalam produk ini.
- Jika anda mempunyai luka, mengalami masalah kulit melecet atau jerawat yang teruk

• *Mengandung dan menyusukan anak*

- Jangan menggunakan Differin® Gel jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung. Doktor anda boleh memberikan anda lebih maklumat.
- Jangan menggunakan Differin® Gel pada bahagian dada jika anda menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula menggunakannya

Sentiasa menggunakan Differin® Gel sebagaimana yang dinasihatkan oleh doktor dan ahli farmasi anda. Tanyakan kepada mereka jika anda kurang pasti

- Pengambilan dengan ubat lain

Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, baru sahaja atau mungkin menggunakan mana-mana ubat lain.

Pengunaan ejen mengelupas, *astringents* atau produk yang merengsa boleh mengakibatkan lebih kesan merengsa.

Lain-lain produk anti-jerawat yang mengandungi *erythromycin*, *clindamycin phosphate* atau *benzoyl peroxide* boleh digunakan dengan Differin® Gel, tetapi mesti digunakan pada waktu pagi manakala Differin® Gel digunakan pada waktu malam, kecuali menerima nasihat lain daripada doktor anda.

Cara menggunakan Differin® Gel

- Berapa banyak harus digunakan

Differin® Gel perlu digunakan dengan lapisan nipis ke kawasan yang terjejas jerawat sekali sehari sebelum tidur dan selepas dibersihkan.

- Bila perlu digunakan

Differin® Gel perlu digunakan apabila anda mempunyai tanda-tanda penyakit (jerawat vulgaris) dan perskripsi dari doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Differin® Gel harus terus digunakan selagi doktor atau ahli farmasi mengesyorkan.

- Jika anda terlupa untuk menggunakannya

Mula menggunakan ubat ini sebaik sahaja anda ingat dengan cara yang sama seperti sebelum ini.

- Jika anda menggunakan terlalu banyak (berlebihan)

Jika ubat itu digunakan dengan berlebihan, tiada hasil yang lebih cepat atau lebih baik akan diperolehi dan tanda kemerahan, mengelupas atau ketidakselesaan mungkin berlaku.

Semasa menggunakan Differin® Gel

- Perkara yang anda perlu dilakukan

Bersihkan kawasan yang akan dirawat dan pastikan kulit kering sebelum menggunakan ubat ini.

Picit tiub perlahan-lahan untuk mendapatkan kuantiti produk yang mencukupi di hujung jari anda sebelum digunakan di kawasan yang terjejas.

Basuh tangan anda selepas penggunaan ubat.

Jika anda mengalami sensitiviti atau kerengsaan yang teruk selepas menggunakan ubat ini, berhenti menggunakannya dan beritahu doktor anda.

- Perkara yang anda tidak boleh lakukan

Differin® Gel tidak boleh diambil melalui mulut dan ia adalah untuk

DIFFERIN® GEL

Adapalene 0.1% w/w

penggunaan luaran pada kulit yang terjejas sahaja.

Differin® Gel tidak boleh bersentuhan dengan mata, mulut, hidung atau membran mukus. Jika produk memasuki mata, basuh segera dengan air suam.

Differin® Cream tidak boleh digunakan di kawasan yang mempunyai kulit yang rosak (luka, kawasan melecet), kulit terbakar dan kulit yang terengsa.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Pesakit yang menggunakan produk ini tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari yang berlebihan atau sinaran UV. Penggunaan skrin pelindung matahari pada kawasan dirawat adalah disyorkan.

Produk kosmetik boleh digunakan tetapi mereka tidak boleh menyebabkan liang disekat atau kulit kering.

Memandu dan menggunakan Mesin

Ubat ini tidak menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Biasa ($\geq 1/100$ sehingga $< 1/10$)

- Kulit kering
- Kerengsaan kulit
- Rasa sensasi seperti kulit terbakar
- *Erythema* (Kulit kemerahan)

Luar biasa ($\geq 1/1000$ hingga $< 1/100$)

- *Contact dermatitis* (ruam gatal yang disebabkan oleh hubungan langsung dengan bahan kerengsaan)
- Ketidakselesaan kulit

- Kulit terbakar
- *Pruritus* (kegatalan) kulit
- Pengelupasan kulit
- Jerawat

Tidak diketahui

- Alahan *Contact Dermatitis* (Ruam gatal yang disebabkan oleh tindak balas alahan terhadap bahan yang bersentuhan)
- Rasa sakit kulit
- Kulit Bengkak
- Terbakar dikawasan yang disapu
- Pigmentasi kulit yang rendah atau tinggi.
- Kerengsaan, *erythema*, *pruritus* dan bengkak kelopak mata
- Tindak balas alergi yang teruk yang memberikan kesan kepada pernafasan dan peredaran darah
- Bengkak pada bahagian muka dan kulit yang teruk

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers --> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan *Differin®* Gel

- Penyimpanan

- Simpan pada suhu bilik (tidak melebihi 30 °C)
- Elakkan suhu sejuk beku semasa pengangkutan dan penyimpanan
- Jauhkan dari capaian kanak-kanak
- Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada label produk. Tarikh luput merujuk

kepada hari terakhir pada bulan tersebut

- Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat melalui bungan air atau sisa rumah. Tanya pegawai farmasi anda bagaimana cara untuk melupuskan ubat yang anda tidak lagi gunakan. Langkah ini membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Differin® Gel adalah gel putih yang dibungkus dalam tiub polietilena ketumpatan rendah putih yang dilengkapi dengan topi skru polipropilena putih.

- Bahan

Bahan aktif

- *Adapalene*

Bahan tidak aktif

- *Carbomer*
- *Propylene*
- *Glycol*
- *Poloxamer 182*
- *Disodium edetate*
- *Methyl parahydroxybenzoate, phenoxyethanol*
- *Sodium hydroxide*
- Air yang ditapis

- Nombor MAL:

MAL20001212ARZ

Pengeluar

Laboratoires Galderma
Zone Industrielle, Montdesir
74540 Alby-sur-Chéran
Perancis

DIFFERIN[®] GEL

Adapalene 0.1% w/w

Pemegang pendaftaran produk

Galderma Malaysia Sdn Bhd
Unit 904, Level 9, Uptown One, Jalan
SS21/58 Damansara Utama, 47400
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

21 May 2025

Nombor siri

NPRA (R1/1) 27042020/076