

Differin® Cream

Adapalene 0.1% w/w

Apa dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Differin® Cream
2. Bagaimana Differin® Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Differin® Cream
4. Cara menggunakan Differin® Cream
5. Semasa menggunakan Differin® Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara menyimpan dan pelupusan Differin® Cream.
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Differin® Cream

Differin® Cream adalah ubat preskripsi untuk kulit (luaran) sahaja bagi merawat jerawat-jerawat vulgaris di mana comedones, papules dan pustules mendominasi. Rawatan ini sesuai untuk jerawat di muka, dada atau belakang badan.

Bagaimana Differin® Cream berfungsi

Bahan aktif dalam Differin® Cream adalah Adapalene. Ia mempunyai sifat anti-radang yang mengurangkan komponen keradangan jerawat (*papules* dan *pustules*) dan menormalkan pembentukan sel kulit dan mengakhiri pembentukan jerawat menurun.

Sebelum anda menggunakan Differin® Cream

- Apabila tidak boleh menggunakannya

- Jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung.

- Jika anda alah kepada sebarang bahan di dalam produk ini.
- Jika anda mempunyai luka, mengalami masalah kulit melecet atau jerawat yang teruk.

Mengandung dan menyusukan anak

- Jangan menggunakan Differin® Cream jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung. Doktor anda boleh memberikan anda lebih maklumat.
- Jangan menggunakan Differin® Cream pada bahagian dada jika anda menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula menggunakannya

Sentiasa menggunakan Differin® Cream sebagaimana yang dinasihatkan oleh doktor dan ahli farmasi anda. Tanyakan kepada mereka jika anda kurang pasti.

- Pengambilan dengan ubat lain

Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, baru sahaja atau mungkin menggunakan mana-mana ubat lain.

Penggunaan ejen mengelupas, astringents atau produk yang merengsa boleh mengakibatkan lebih kesan merengsa.

Ubat anti-jerawat yang lain yang mengandungi *erythromycin*, *clindamycin phosphate* atau *benzoyl peroxide* boleh digunakan dengan Differin® Cream, tetapi mesti digunakan pada waktu pagi manakala Differin® Cream digunakan pada waktu malam, kecuali menerima nasihat lain daripada doktor anda.

Cara menggunakan Differin® Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Differin® Cream perlu digunakan dengan lapisan nipis ke kawasan yang terjejas jerawat.

- Bila perlu digunakan

Differin® Cream perlu digunakan sekali sehari sebelum tidur dan selepas mencuci, atau seperti yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu digunakan

Differin® Cream harus digunakan mengikut tempoh yang ditetapkan. Doktor anda boleh membuat temujanji susulan untuk menilai penambahbaikan pada kulit anda.

- Jika anda terlupa untuk menggunakannya

Mula menggunakan ubat ini sebaik sahaja anda ingat dengan cara yang sama seperti sebelum ini.

- Jika anda menggunakan terlalu banyak (berlebihan)

Jika ubat itu digunakan dengan berlebihan, tiada hasil yang lebih cepat atau lebih baik akan diperolehi dan tanda kemerahan, mengelupas atau ketidakselesaan mungkin berlaku.

Semasa anda menggunakannya

- Perkara yang anda perlu dilakukan

Bersihkan kawasan yang akan dirawat dan pastikan kulit kering sebelum menggunakan ubat ini.

Differin® Cream

Adapalene 0.1% w/w

Picit tiub perlahan-lahan untuk mendapatkan kuantiti produk yang mencukupi di hujung jari anda sebelum digunakan di kawasan yang terjejas. Basuh tangan anda selepas penggunaan ubat.

Jika anda mengalami sensitiviti atau kerengsaan yang teruk dengan penggunaan ubat ini, berhenti menggunakannya dan beritahu doktor anda. Jika kerengsaan setempat adalah kecil, kurangkan penggunaan ubat ini, hentikan penggunaan buat sementara, atau hentikan penggunaan dengan sama sekali dan gunakan semula selepas kerengsaan telah reda.

- Perkara yang anda tidak boleh lakukan

Differin® Cream tidak boleh diambil melalui mulut dan ia adalah untuk penggunaan luaran pada kulit yang terjejas sahaja.

Differin® Cream tidak boleh bersentuhan dengan mata, mulut, hidung atau membran mukus. Jika produk memasuki mata, basuh segera dengan air suam.

Differin® Cream tidak boleh digunakan di kawasan yang mempunyai kulit yang rosak (luka, kawasan melecet), kulit terbakar dan kulit yang terengsa.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Pesakit yang menggunakan produk ini tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari yang berlebihan atau sinaran UV. Penggunaan skrin pelindung matahari pada kawasan dirawat adalah disyorkan.

Produk kosmetik boleh digunakan tetapi mereka tidak boleh menyebabkan liang disekat atau kulit kering.

Kesan-kesan sampingan

Biasa ($\geq 1/100$ sehingga $< 1/10$)

- Kulit kering
- Kerengsaan kulit
- Rasa sensasi seperti kulit terbakar
- Erythema (Kulit kemerahan)

Luar biasa ($\geq 1/1000$ hingga $< 1/100$)

- Contact dermatitis (ruam gatal yang disebabkan oleh hubungan langsung dengan bahan kerengsaan)
- Ketidakselesaan kulit
- Kulit terbakar
- Kegatalan
- Pengelupasan kulit
- Jerawat

Tidak diketahui

- Alahan Contact Dermatitis Dermatitis (Ruam gatal yang disebabkan oleh tindak balas alahan terhadap bahan yang bersentuhan)
- Rasa sakit kulit
- Kulit Bengkak
- Terbakar dikawasan yang disapu
- Pigmentasi kulit yang rendah atau tinggi.
- Kerengsaan, erythema, pruritus dan bengkak kelopak mata
- Tindak balas alergi yang teruk yang memberikan kesan kepada pernafasan dan peredaran darah
- Bengkak pada bahagian muka dan kulit yang teruk

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Differin® Cream

- Penyimpanan

- Simpan pada suhu bilik (tidak melebihi 30 °C)
- Elakkan suhu sejuk beku semasa pengangkutan dan penyimpanan
- Jauhkan dari capaian kanak-kanak
- Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada label produk. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut

- Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat melalui bungan air atau sisa rumah. Tanya pegawai farmasi anda bagaimana cara untuk melupuskan ubat yang anda tidak lagi gunakan. Langkah ini membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Differin® Cream adalah krim putih yang dibungkus dalam tiub aluminium yang boleh dilipat dan dilengkapi dengan penutup skru yang diperbuat dari polipropilena berwarna putih.

- Bahan

-Bahan aktif

- Adapalene

Differin[®] Cream

Adapalene 0.1% w/w

-Bahan tidak aktif

- Carbomer
- PEG-20 methyl GLucose sesquistearate
- Glycerol
- Squalene semulajadi
- Methyl Parahydroxybenzoate
- Propyl Parahydroxybenzoate
- Disodium
- Methyl Glucose Sesquistekadar
- Phenoxyethanol
- Cyclomethicone
- Natrium Hydroxide
- Air yang ditapis

-Nombor MAL:

MAL04103438ARZ

Pengeluar

Laboratoires Galderma
Z.I.-Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran-Perancis

Pemegang pendaftaran produk

Galderma Malaysia Sdn Bhd
Unit 904. Level 9, Uptown One,
Jalan SS21/58, Damansara Utama,
47400 Petaling Jaya, Selangor

Tarikh semakan

April 2025

Nombor siri

NPRA (R1/2) 27042020/075