

## Apa dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Gel Rozex
2. Bagaimana Gel Rozex berfungsi
3. Sebelum menggunakan Gel Rozex
4. Cara menggunakan Gel Rozex
5. Semasa menggunakan Gel Rozex
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Gel Rozex
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Gel Rozex

Gel Rozex digunakan secara topikal untuk merawat jerawat, *pustules* (bintik-bintik) dan kemerahan akibat dari *rosacea*.

## Bagaimana Gel Rozex berfungsi

Gel Rozex mengandungi bahan aktif *metronidazole* yang bertindak terhadap mikroorganisma berbahaya untuk mengawal jangkitan dan keradangan pada kulit akibat dari *rosacea*.

## Sebelum anda menggunakan Gel Rozex

- Apabila tidak boleh menggunakannya

Gel Rozex tidak boleh digunakan oleh individu yang mempunyai sejarah hipersensitiviti kepada *metronidazole*, parabens, atau bahan lain dalam formulasi.

- Sebelum mula menggunakannya

Gel Rozex dilaporkan boleh menyebabkan mata berair. Oleh itu, bersentuhan kepada mata harus dielakkan. Jika iritasi berlaku, anda diarahkan untuk menggunakan kurang kerap, berhenti penggunaan sementara atau berhenti sehingga

arahan lanjut daripada doktor.

- Pengambilan dengan ubat lain

Gel Rozex dijangka mempunyai minimum interaksi dengan ubat ubatan lain. Individu yang menerima rawatan antikoagulant perlu memaklumkan doktor mereka kerana penyerapan *metronidazole* ke dalam aliran darah boleh meningkatkan kesan antikoagulant (cair darah) ubat-ubatan tersebut.

## Cara menggunakan Gel Rozex

- Berapa banyak harus digunakan

Sapu Gel Rozex dua kali sehari, pagi dan petang, ke seluruh bahagian berkenaan selepas membersih muka.

- Bila perlu digunakan

Sapu dua kali sehari, pagi dan petang. Kosmetik boleh digunakan selepas disapu Gel Rozex.

## Berapa lama perlu digunakan

Penambahbaikan kulit boleh dilihat dalam masa tiga minggu. Doktor anda akan memutuskan berapa lama anda perlu menggunakan Gel Rozex untuk memastikan *Rosacea* anda di bawah kawalan.

## Jika anda terlupa untuk menggunakannya

Walaupun gel ini berfungsi terbaik jika anda menggunakannya dengan kerap seperti yang diarahkan, jangan bimbang jika anda terlupa untuk menggunakan gel anda pada masa yang ditetapkan.

Apabila anda ingat, mula menggunakannya lagi dengan cara yang sama.

## Jika anda menggunakan terlalu banyak (berlebihan)

Produk ini hanya boleh digunakan pada kulit sahaja. Jangan ditelan. Jika anda tidak sengaja berbuat demikian, dapatkan nasihat perubatan.

## Semasa anda menggunakannya

- Perkara yang anda perlu lakukan

Kawasan yang hendak dirawat hendaklah dibersihkan dan dikeringkan sebelum sapu Gel Rozex. Sentiasa menggunakan ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Sila tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti

## -Perkara yang anda tidak boleh lakukan

Jangan mengambil Gel Rozex jika anda alah kepada *metronidazole* atau mana-mana bahan lain ubat ini

Reaksi alahan boleh termasuk ruam atau gatal

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jika anda mempunyai gejala darah abnormal, anda tidak digalakkan menggunakan Gel Rozex kecuali anda ada kebenaran doktor.

- Produk ini tidak boleh digunakan kepada kanak-kanak.

- Menggunakan Gel Rozex boleh berinteraksi dengan ubat yang cair darah (anticoagulants) seperti *warfarin* dan *dicoumarin*. Hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat jika anda mengambil ubat cair darah, atau jika anda mengalami apa-apa gejala darah tidak normal.

- Jika anda hamil atau menyusukan bayi, anda tidak digalakkan untuk

# ROZEX<sup>®</sup> GEL

Metronidazole 0.75%

menggunakan produk ini, melainkan doktor anda menganggap ia penting.

• Jika anda hamil atau menyusukan bayi, fikir anda hamil atau sedang merancang hamil, sila tanya doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan ubat ini.

## Kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang dilaporkan ialah iritasi kulit, kulit kelihatan kering, merah dan berasa sensasi panas, serta mata berair.

Jika iritasi kulit berlaku, anda boleh menggunakan gel kurang kerap atau berhenti menggunakannya sementara sehingga iritasi kulit reda. Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda jika perlu.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesanadvers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman sesawang [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) [Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Cara penyimpanan dan pelupusan Gel Rozex

### - Menyimpan

- Jauhi ubat ini daripada kanak-kanak.
- Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak kepada tiub dan kotak. Tarikh luput merujuk pada hari terakhir bulan

itu.

- Jangan simpan ubat di atas suhu 25° C. Jangan beku ubat.

### - Pelupusan

Jangan buang ubat dalam tandas atau tong sampah. Tanya ahli farmasi anda cara pelupusan ubat ini. Langkah ini dapat melindungi alam sekitar.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

- Gel Rozex adalah gel warna jernih ke pucat kuning yang boleh bertukar kepada warna pucat coklat dari semasa ke semasa.
- Ia boleh didapati dalam bentuk 5g, 15g, atau 30g tiub, hanya melalui preskripsi daripada doktor anda. Tidak semua saiz pek akan dipasarkan

### - Bahan

#### - Bahan aktif

Bahan aktif adalah *metronidazole*. Setiap gram Gel Rozex mengandungi 7.5 mg *metronidazole*

#### - Bahan tidak aktif:

Ramuan lain ialah *carbomer 940*, *disodium edetate*, *methyl parahydroxybenzoate*, *propyl parahydroxybenzoate*, *propylene glycol*, *sodium hydroxide* (untuk penyelarasan pH) dan air tapis.

### - Nombor MAL:

MAL19992052ARZ

## Pengeluar

Laboratoires Galderma,  
Z.I. Montdesir  
74540, Alby-Sur-Cheran, France

## Pemegang pendaftaran produk:

Galderma Malaysia Sdn BhdUnit  
904, Level 9, Uptown One, Jalan  
SS21/58, Damansara Utama, 47400  
Petaling Jaya, Selangor.

## Tarikh kemaskini RiMUP:

10/04/2025

## Nombor siri:

NPRA(R4/1)290120/00018