

Gaviscon Advance Peppermint Flavour

Natrium Alginate 1000mg/10ml, Kalium Bicarbonate 200mg/10ml

Di dalam risalah ini:

1. Apakah kegunaan *Gaviscon Advance*
2. Bagaimana *Gaviscon Advance* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Gaviscon Advance*
4. Cara menggunakan *Gaviscon Advance*
5. Semasa menggunakan *Gaviscon Advance*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Gaviscon Advance*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Gaviscon*

Advance:

rawatan simptom yang disebabkan oleh refluks asid, asid hempedu dan pepsin ke dalam esofagus seperti regurgitasi asid, pedih ulu hati, gangguan pencernaan (berlaku kerana refluks kandungan perut), misalnya, setelah operasi gastrik, akibat hernia hiatus, semasa kehamilan, oesophagitis refluks yang disertakan, termasuk gejala refluks laringopharyngeal seperti suara serak dan gangguan suara lain, sakit tekak dan batuk. Ini juga dapat digunakan untuk mengubati gejala refluks gastro-oesophageal semasa rawatan bersamaan atau setelah penarikan terapi penekan asid.

Bagaimana *Gaviscon Advance* berfungsi:

Apabila mengambil *Gaviscon Advance*, ia bertindak balas dengan asid gastrik dengan cepat untuk membentuk rakit gel asid alginik yang mempunyai pH hampir neutral yang mengapung pada isi perut dengan cepat dan berkesan menghalang refluks gastro-oesophageal sehingga 4 jam, dan melindungi esofagus dari asid, pepsin dan asid hempedu. Dalam kes-kes yang teruk, rakit itu sendiri akan masuk ke dalam kerongkongan lebih daripada isi perut dan memberi kesan mereda. Tambahan pula, bukti in vitro

telah menunjukkan bahawa rakit mempunyai tindakan sekunder dan mampu memerangkap asid hempedu dan pepsin ke dalam strukturnya, maka melindungi esofagus dari komponen gastrik ini.

Sebelum menggunakan *Gaviscon*

Advance:

Anda tidak boleh menggunakannya:
Jangan mengambil produk ini jika anda mempunyai hipersensitiviti terhadap salah satu bahan, termasuk ester hidroksibenzoat (paraben).

Kehamilan dan penyusuan

Produk ini bebas gula dan bebas gluten. Anda boleh mengambil produk ini jika anda hamil atau menyusu.

Sebelum anda mula menggunakannya:

Produk ini mengandungi 106 mg (5.0 mmol) natrium setiap dos 10 ml, bersamaan dengan 5.3% harian maksimum untuk natrium sepertimana disyorkan oleh WHO. Dos harian maksimum produk ini bersamaan dengan 21% harian maksimum untuk natrium sepertimana disyorkan oleh WHO. Produk ini dianggap tinggi natrium. Ini harus diambil kira terutama bagi mereka yang menjalani diet rendah garam (misalnya: segelintir kes kegagalan jantung kongestif dan gangguan ginjal).

Kalium: Ubat ini mengandungi 78 mg (2.0 mmol) kalium setiap dos 10 ml. Ini harus dipertimbangkan oleh pesakit dengan fungsi ginjal yang berkurangan atau pesakit yang menjalani diet kalium terkawal.

Setiap 10 ml mengandungi 200 mg (2.0 mmol) kalsium karbonat. Penjagaan perlu diambil dalam merawat pesakit dengan hiperkalsemia, nefrocalcinosis dan calculi ginjal yang mengandungi kalsium secara berulang.

Produk ini mengandungi Methyl hydroxybenzoate dan Propyl hydroxybenzoate, yang boleh

menyebabkan reaksi alergi (mungkin ditanggguhkan).

Mengambil ubat lain:

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil atau baru-baru ini mengambil ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi. Selang masa 2 jam harus dipertimbangkan antara pengambilan *Gaviscon* dan pemberian produk perubatan lain terutamanya tetrasiklin, fluoroquinolones, garam besi, hormon tiroid klorokuin, bifosfonat, dan estramustin.

Cara menggunakan *Gaviscon Advance*

Berapa banyak perlu digunakan

Orang dewasa, termasuk orang tua dan kanak-kanak 12 tahun ke atas: 5-10ml selepas makan dan waktu tidur. Kanak-kanak di bawah 12 tahun: Hanya boleh diambil atas nasihat ahli perubatan.

Bila perlu menggunakannya

Gaviscon Advance digunakan untuk rawatan simptom akibat refluks asid, asid hempedu dan pepsin ke dalam esofagus. Ia juga boleh digunakan untuk mengubati gejala refluks gastro-oesophageal semasa rawatan bersamaan atau setelah penarikan terapi penekan asid.

Berapa lama perlu menggunakannya

Sekiranya gejala berterusan selepas 7 hari, sila berjumpa doctor.

Sekiranya anda lupa menggunakannya

Sekiranya anda lupa dos, tidak perlu menggandakan dos lain kali, teruskan mengambil seperti sebelumnya.

Sekiranya anda menggunakan terlalu banyak (berlebihan)

Simptom berlebihan mungkin kecil. Sebilangan ketidakselesaan perut mungkin dialami. Rujuk doktor atau ahli farmasi anda sekiranya ini tidak hilang

Semasa menggunakan *Gaviscon Advance*

Perkara yang mesti anda lakukan

Ambil ubat anda sepertimana yang diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil *Gaviscon Advance*

Perkara yang tidak mesti anda lakukan

Jangan berikan *Gaviscon Advance* kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput. Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Kesan-kesan sampingan

Jarang sekali (kurang dari 1 dari 10000 pesakit) terdapat kemungkinan reaksi alergi terhadap ramuan. Gejala ini mungkin termasuk ruam kulit, gatal-gatal, kesukaran bernafas, pening atau pembengkakan muka, bibir, lidah atau tekak. Jarang berlaku (kurang daripada 1 dalam 100 orang), terdapat kesan sampingan yang dilaporkan seperti cirit-birit, loya dan muntah.

Sekiranya anda mengalami ini atau kesan sampingan lain, hentikan pengambilan produk dan berjumpa doktor dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835590, atau laman web npa.moh.gov.my.

[Public → Reporting → Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan *Gaviscon Advance*

Penyimpanan

Jauhkan ubat dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30 ° C. Jangan sejukkan.

Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sampah isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Baqaimana rupanya

Suspensi oral likat putih dengan bau pudina.

- Ramuan

Bahan-bahan aktif
1000mg natrium alginate
200mg kalium bikarbonat

- Bahan tidak aktif

Air deionisasi, natrium Saccharin, natrium hidroksida, kalsium karbonat, metil hidroksibenzoat, karbomer, propil hidroksibenzoat, perasa pudina.

Nombor MAL:

MAL05121192XR

Pengilang:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull HU8 7DS, UK

Pemegang Pendaftaran Produk

RB (Health) Malaysia Sdn Bhd
Level 17, Menara One Sentrum.
No. 201, Jalan Tun Sambathan,
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini

11/12/2025

NPRA(R2/1)210402/652