

# Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension

Sodium Alginate 225mg and Magnesium alginate 87.5mg

## Di dalam risalah ini:

1. Apakah kegunaan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*
2. Bagaimana *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*
4. Cara menggunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*
5. Semasa menggunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*

*Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* menghalang refluks dengan menstabilkan kandungan perut, jadi mengurangkan kejadian refluks dan membawa suapan (*possetting*) pada bayi dan kanak-kanak kecil berumur 1 hingga 24 bulan.

## Bagaimana *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* berfungsi

*Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* mengandungi bahan aktif *sodium alginate* dan *magnesium alginate* yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil “*reflux suppressants*”.

Refluks ialah proses di mana kandungan perut mengalir semula ke atas tiub yang membawa dari mulut ke perut (dikenali sebagai kerongkong atau esofagus). Ini boleh menyebabkan bayi menjadi sakit, meludah lebih daripada biasa dan menjadi tertekan.

*Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* menghalang refluks dengan menstabilkan kandungan perut, jadi mengurangkan kejadian refluks dan membawa suapan (*possetting*) pada bayi dan kanak-kanak kecil berumur 1 hingga 24 bulan.

## Sebelum menggunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*

Jangan gunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*

- Kecuali atas cadangan doktor atau profesional penjagaan kesihatan lain
- Jika anak anda alah kepada mana-mana ramuan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*
- Jika anak anda sedang sakit, mengalami demam atau cirit-birit
- Jika anda telah diberitahu atau disyaki anak anda mengalami kerosakan pada buah pinggang mereka atau mereka telah diberi diet rendah garam
- Jika anda telah diberitahu bahawa anak anda mengalami penyumbatan dalam usus mereka (sekatan usus)

## Amaran dan langkah berjaga-jaga

Berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* jika bayi anda pramatang atau di bawah satu bulan.

Terdapat laporan yang sangat jarang berlaku tentang perubahan konsistensi najis (cth. sembelit dan cirit-birit) berhubung penggunaan produk ini. Jika anda bimbang atau anda perasan perubahan ketara atau berterusan dalam tabiat buang air besar, dapatkan nasihat profesional penjagaan kesihatan dengan segera.

Jika simptom anak anda berterusan selepas 7 hari dapatkan nasihat doktor anda.

## Ubat-ubatan lain *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anak anda mengambil, baru-baru ini mengambil atau mungkin mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

## *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* dengan makanan dan minuman

Jangan gunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* dengan agen pemekat makanan lain atau persediaan susu bayi yang mengandungi agen pemekat.

Jika anda tidak pasti, anda harus bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum memberikan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* kepada anak anda.

*Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* mengandungi natrium.

Ubat ini mengandungi 23.9 mg natrium (komponen utama masakan/garam meja) dalam setiap sachet. Ini bersamaan dengan 1% daripada pengambilan natrium harian maksimum yang disyorkan untuk orang dewasa.

## Cara menggunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*

Sentiasa gunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* sepertimana yang diterangkan dalam risalah ini atau seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Untuk bayi berumur 1 hingga 24 bulan. *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* tidak boleh digunakan pada bayi pramatang atau mereka yang berumur di bawah 1 bulan melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Tidak sesuai untuk kanak-kanak melebihi 24 bulan (2 tahun), dewasa atau warga emas.

Untuk bayi 1-12 bulan: Sila dapatkan nasihat perubatan sebelum mengambil produk.

Dos dan arahan bancuhan bergantung pada berat anak anda dan kaedah penyusuan yang anda gunakan:

Bayi di bawah 4.5 kg (10 lb) – satu sachet harus digunakan

Bayi melebihi 4.5 kg (10 lb) – dua sachet hendaklah digunakan

Buka uncang dan campurkan kandungannya serta-merta sebelum digunakan seperti yang diarahkan di bawah:

### Bayi yang diberi susu botol:

- Campurkan setiap sachet ke dalam 115 ml (4 oz cecair) suapan susu di dalam botol
- Goncang dengan baik
- Makan seperti biasa

Bayi yang diberi susu ibu dan bayi lain dari 1 bulan sehingga 24 bulan (2 tahun):

- Campurkan setiap sachet dengan 5 ml (1 sudu teh) air masak yang telah disejukkan sehingga terbentuk pes yang licin
- Tambah lagi 10 ml (2 sudu teh) air masak yang telah disejukkan dan gaul
- Bagi bayi yang diberi susu ibu, berikan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* di pertengahan setiap suapan atau hidangan menggunakan sudu atau botol susu
- Untuk semua bayi lain berikan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* pada akhir setiap hidangan menggunakan sudu atau botol penyusuan

Jangan berikan lebih daripada enam kali (maksimum 6 atau 12 sachet bergantung kepada berat anak anda) dalam masa 24 jam.

**Semasa menggunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension***

Jika keadaan anak anda berterusan atau menjadi lebih teruk, minta nasihat doktor atau profesional penjagaan kesihatan anda yang lain dengan segera.

Anda tidak boleh menggunakan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* selama lebih daripada tujuh hari tanpa berunding dengan doktor anda atau profesional penjagaan kesihatan yang lain.

Jika anak anda mengambil lebih banyak *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* daripada yang sepatutnya:

Jika anak anda mengambil terlalu banyak *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*, mereka mungkin mengalami halangan usus, sakit, hilang selera makan, menjadi cepat marah atau letih dan lemah.

Jika anda secara tidak sengaja memberikan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* terlalu banyak, minta nasihat doktor anda atau profesional penjagaan kesihatan lain dengan segera.

Jika anda terlupa memberikan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*:  
Jika dos terlepas jangan dua kali ganda dos dengan suapan seterusnya. Teruskan sahaja dengan dos yang disyorkan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang penggunaan produk ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

**Kesan-kesan sampingan**

Seperti semua ubat, *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Sangat jarang (kurang daripada 1 dalam 10,000 pesakit) pesakit mungkin mengalami sembelit dan cirit-birit. Kesan sampingan yang kekerapannya tidak dapat dianggarkan daripada data yang tersedia termasuk ruam, kembung perut, ketidakselesaan perut (gastrik) dan halangan usus.

Jika kanak-kanak mempunyai sebarang kesan sampingan, hentikan pemberian *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* dan beritahu doktor anda atau profesional penjagaan kesihatan yang lain.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my). [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

**Cara penyimpanan dan pelupusan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension***

Jauhkan ubat ini daripada kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada karton selepas EXP(bulan/tahun).

Jangan simpan melebihi 30°C.

Jangan gunakan jika sachet rosak atau meterai keselamatan rosak.

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat lanjut**

**Kandungan *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension*:**

Bahan aktif dalam setiap paket *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* ialah 225 mg natrium alginat dan 87.5 mg magnesium alginat. Bahan-bahan lain ialah manitol (E421) dan silika koloid.

**Apakah rupa *Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* dan kandungannya:**

*Gaviscon Infant Powder for Oral Suspension* ialah serbuk untuk suspensi oral.

Setiap karton mengandungi 30 sachet serbuk yang digabungkan secara berpasangan.

MAL number:  
MALXXXXXXXX

**Pengilang**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull HU8 7DS, UK

**Pemegang Pendaftaran Produk**

RB (Health) Malaysia Sdn Bhd Level 17, Menara One Sentrum. No. 201, Jalan Tun Sambathan, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia

**Tarikh kemaskini RiMUP**

10 March 2023

**Nombor siri:**

NPRA (R1) 23/008