

Gaviscon Double Action Liquid (Mixed Berries Flavour)

Sodium Alginate 500 mg/10ml, Sodium Hydrogen Carbonate 213 mg/10ml, Calcium Carbonate 325 mg/10ml.

Di dalam risalah ini:

1. Apakah kegunaan *Gaviscon Double Action Liquid*
2. Bagaimana *Gaviscon Double Action Liquid* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Gaviscon Double Action Liquid*
4. Cara menggunakan *Gaviscon Double Action Liquid*
5. Semasa menggunakan *Gaviscon Double Action Liquid*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Gaviscon Double Action Liquid*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Gaviscon Double Action Liquid*:

Ubat ini digunakan untuk rawatan simptom yang berkaitan dengan asid dari refluks gastro-oesophageal seperti pedih ulu hati, regurgitasi asid dan pencernaan, contohnya, setelah makan, atau semasa mengandung.

Bagaimana *Gaviscon Double Action Liquid* berfungsi:

Gaviscon Double Action Liquid adalah kombinasi alginat dan dua antasid (kalsium karbonat dan natrium hidrogen karbonat) yang bertindak dengan dua cara:

1. Membentuk penghalang pelindung di atas isi perut untuk melegakan kesakitan yang membara di dada anda yang boleh bertahan sehingga 4 jam.
2. Meneutralkan asid perut yang berlebihan untuk melegakan kesakitan dan ketidakselesaan.

Sebelum menggunakan *Gaviscon Double Action Liquid*:

Anda tidak boleh menggunakannya:

Jangan mengambil ubat ini jika:

- Anda tahu anda alah kepada mana mana ramuan ubat ini.
- Anda menghidap penyakit buah pinggang yang sederhana atau teruk.

Kehamilan dan penyusuan

Anda boleh mengambil produk ini jika anda hamil atau menyusu atau merancang untuk mempunyai bayi. Seperti semua ubat, tempoh rawatan harus dihadkan sebanyak mungkin.

Sebelum anda mula menggunakannya:

Bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini jika anda:

- Mengalami gangguan elektrolit yang menyebabkan tahap fosfat rendah dalam darah (hipofosfemia).
- Menghidapi penyakit ginjal atau jantung yang serius, kerana segelintir garam boleh mengganggu penyakit ini (berbincang dengan doktor anda mengenai kandungan garam).

Produk ubat ini mengandungi 127.35 mg (5.53 mmol) sodium setiap 10 ml dos. Dos harian maksimum produk ini mengandungi 1018 mg sodium (terdapat dalam garam meja). Ini bersamaan dengan 51% pengambilan makanan harian orang dewasa yang disyorkan untuk sodium.

Sila berunding dengan ahli farmasi atau doktor anda jika anda memerlukan *Gaviscon Double Action Liquid* setiap hari untuk jangka masa yang lama, terutamanya jika anda telah dinasihatkan untuk menjalani diet rendah garam.

Produk ini juga mengandungi 130 mg (3.25 mmol) kalsium setiap dos 10 ml. Sila berunding dengan doktor sebelum mengambil ubat ini jika anda mempunyai batu karang di ginjal atau tahap kalsium yang tinggi dalam darah anda.

Mengambil ubat lain:

Seperti produk antasid lain, pengambilan ubat ini dapat menyembunyikan gejala keadaan perubatan lain yang lebih serius.

Jangan mengambil produk ini dalam masa dua jam setelah mengambil ubat lain kerana ia boleh mengganggu tindakan beberapa ubat lain.

Ini amat penting jika anda mengambil antibiotik (tetrasiklin dan fluoroquinolones), garam besi, hormon tiroid, klorokuin (untuk malaria), bifosfonat (untuk osteoporosis) dan estramustine.

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini pernah mengambil ubat lain yang diperoleh tanpa preskripsi.

Cara menggunakan *Gaviscon Double Action Liquid*:

Untuk pengambilan secara oral. Goncangkan dengan baik sebelum digunakan. Jangan minum terus dari botol

Berapa banyak perlu digunakan

Dewasa dan kanak-kanak 12 tahun ke atas: Apabila gejala muncul, ambil 10-20 ml setelah makan dan sebelum tidur, hingga empat kali sehari.

Kanak-kanak di bawah 12 tahun: Hanya boleh diambil atas nasihat perubatan.

Bila perlu menggunakannya

Ambil selepas makan dan sebelum tidur, sehingga 4 kali sehari.

Berapa lama perlu menggunakannya

Sekiranya simptom berterusan selepas 7 hari, sila rujuk doktor anda.

Sekiranya anda lupa menggunakannya

Sekiranya anda lupa mengambil dos, tidak perlu menggandakan dos seterusnya, teruskan mengambil seperti sebelumnya.

Sekiranya anda menggunakan terlalu banyak (berlebihan)

Sekiranya anda mengambil terlalu banyak produk ini, tidak mungkin mendatangkan bahaya kepada anda.

Walau bagaimanapun, anda mungkin merasa kembung. Rujuk doktor anda sekiranya ini tidak hilang.

Semasa menggunakan *Gaviscon Double Action Liquid*:

Gaviscon Double Action Liquid (Mixed Berries Flavour)

Sodium Alginate 500 mg/10ml, Sodium Hydrogen Carbonate 213 mg/10ml, Calcium Carbonate 325 mg/10ml.

Perkara yang mesti anda lakukan

Sentiasa gunakan ubat ini seperti yang dijelaskan dalam risalah ini atau seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Perkara yang tidak mesti anda lakukan

Jangan berikan Gaviscon Double Action Liquid kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun kecuali atas nasihat doktor. Terdapat risiko peningkatan kadar natrium dalam darah (hipernatremia) pada kanak-kanak yang mempunyai masalah buah pinggang atau yang mengalami perut atau usus yang meradang (gastroenteritis).

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan gunakan produk ini selepas tarikh luput yang tertera pada botol EXP (bulan / tahun). Tarikh luput merujuk pada hari terakhir tarikh tersebut bulan. Jauhkan semua ubat dengan selamat dari kanak-kanak.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Gaviscon Double Action Liquid boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Sekiranya anda mengalami kesan sampingan ini, hentikan pengambilan produk dan berjumpa doktor dengan segera. Sangat jarang berlaku (kurang dari 1 dari 10,000 pesakit yang dirawat) kemungkinan reaksi alergi terhadap bahan tersebut. Gejala ini mungkin termasuk sakit perut, cirit-birit, mual, muntah, ruam kulit, gatal-gatal, pening, bengkak muka, bibir, lidah, atau tekak dan kesukaran bernafas.

Pengambilan kalsium karbonat dalam jumlah besar, salah satu komponen produk ini, boleh menyebabkan

peningkatan pH darah (alkalosis), terlalu banyak kalsium dalam darah (hiperkalsemia), peningkatan rembesan asid perut, dan sembelit. Ini biasanya berlaku berikutan dos yang lebih besar daripada yang disyorkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web www.npra.gov.my [Public → Reporting → Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Gaviscon Double Action Liquid

Penyimpanan

Jangan simpan di atas 30°C. Jangan sejukkan atau beku. Gunakan dalam masa 6 bulan dari pembukaan. Periksa penutup cap bahawa ia tidak putus terlebih dahulu sebelum menggunakan produk ini.

Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sampah isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Bagaimana rupanya

Suspensi putih hingga krim dengan bau dan rasa beri

Ramuan

Bahan-bahan aktif per 10ml
500 mg natrium alginat
213 mg natrium hidrogen karbonat
325 mg kalsium karbonat

- Bahan tidak aktif
karbomer 974P, metil (E218) dan propil (E216) parahydroxybenzoates, sodium saccharin, perasa raspberry, perasa cranberry, perasa buah fantasi, sodium hidroksida, dan air.

Nombor MAL:

MAL25016034X

Pengilang:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull HU8 7DS, UK

Pemegang Pendaftaran Produk RB

(Health) Malaysia Sdn Bhd Level 17, Menara One Sentrum.
No. 201, Jalan Tun Sambathan, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini

29/1/2026

RiMUP Nombor Siri:

NPRA(R2) 23/166