

Strepsils Max Pro Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

Flurbiprofen 8.75mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge
2. Bagaimana Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge berfungsi
3. Sebelum menggunakan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge
4. Cara menggunakan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge
5. Semasa menggunakan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

Untuk melegakan simptom sakit tekak, termasuk tekak rensa dan tekak bengkak.

Bagaimana Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge berfungsi

Bahan aktif (yang membuatkan Strepsils Max Pro Honey & Lemon 8.75mg lozenge bertindak) adalah Flurbiprofen. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai ubat anti radang tanpa steroid (NSAIDs). NSAIDs memberikan kelegaan dengan menukar tindakbalas tubuh terhadap kesakitan, bengkak dan suhu tinggi.

Sebelum menggunakan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Strepsils Max Pro Honey & Lemon 8.75mg lozenge jika anda:

- alah pada Flurbiprofen atau sebarang bahan lain atau aspirin atau ubat penahan sakit lain
- pernah (atau pernah dua kali atau lebih mengalami) ulser perut, penembusan (perforation) atau pendarahan perut
- pernah mengalami asma yang teruk, ruam kulit, hidung berair yang gatal atau bengkak muka selepas mengambil Flurbiprofen, aspirin atau ubat yang serupa
- pernah mengalami pendarahan atau penembusan gastrousus apabila mengambil NSAIDs
- sedang mengambil penahan sakit NSAIDs lain atau lebih daripada 75mg aspirin sehari
- mengalami masalah hati atau buah pinggang yang teruk
- mengalami masalah jantung, tekanan darah tinggi atau gangguan pembekuan darah
- mengalami kesukaran bernafas
- mengandung di peringkat 3 bulan terakhir

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan mengambil ubat ini jika anda berada dalam 3 bulan terakhir kehamilan. Jika anda berada dalam 6 bulan pertama kehamilan atau sedang menyusukan bayi, bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini

- Sebelum menggunakan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Strepsils Max Pro Madu & Lemon 8.75mg Lozenge jika anda:

- pernah atau mengalami asma yang teruk atau mempunyai alahan
- mempunyai masalah jantung, buah pinggang atau hati
- mengalami strok
- mempunyai sejarah penyakit usus (seperti *ulcerative colitis*, *Crohn's disease*)
- adalah warga tua, kerana anda lebih cenderung untuk mengalami kesan sampingan yang disenaraikan di dalam risalah ini
- adalah dalam 6 bulan pertama kehamilan atau menyusukan bayi

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil sebarang ubat-ubatan lain. Khususnya, beritahu mereka jika anda mengambil:

- Aspirin dengan dos yang rendah (sehingga 75mg setiap hari)
- Ubat untuk tekanan darah tinggi atau kegagalan jantung (*antihypertensive*, *cardiac glycosides*)
- Ubat-ubatan untuk mencairkan darah (*anticoagulants*, *antiplatelet agents*)
- Ubat-ubatan untuk penyakit *gout* (*probenecid*, *sulfinpyrazone*)
- Ubat-ubatan NSAIDs lain atau *corticosteroid* (seperti *celecoxib*, *ibuprofen*, *diclofenac sodium* atau *prednisolone*)
- *Mifepristone* (ubat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan)
- Antibiotik quinolone (seperti *ciprofloxacin*)
- *Cyclosporine* atau *tacrolimus* (untuk menyekat sistem imun anda buat sementara)
- *Phenytoin* (untuk merawat epilepsi)

Strepsils Max Pro Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

Flurbiprofen 8.75mg

- *Methotrexate* (untuk merawat penyakit auto-imun atau kanser)
- *Litium* atau *SSRIs* (untuk kemurungan)
- *Oral antidiabetics* (untuk merawat kencing manis)
- *Zidovudine* (untuk merawat HIV)

Pengambilan Strepsils Max Pro Honey & Lemon 8.75mg Lozenge dengan makanan, minuman dan alkohol

Alkohol perlu dielakkan semasa rawatan dengan Strepsils Max Pro Honey & Lemon 8.75mg Lozenge kerana ia meningkatkan risiko pendarahan di dalam perut atau usus.

Setiap lozeng mengandungi 1,069mg Glukosa cecair dan 1,407mg Sukrosa Cecair/lozeng

Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda tidak mempunyai toleransi terhadap sesetengah gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil produk perubatan ini.

Cara menggunakan Strepsils Max Pro Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa, golongan tua dan kanak-kanak berumur 12 tahun keatas: Sebiji lozeng dihisap dan dilarutkan perlahan-lahan di dalam mulut setiap 3-6 jam seperti yang diperlukan. Maksimum 5 lozeng dalam tempoh 24 jam.

Anda perlu mengambil dos terendah bagi masa sesingkat yang perlu untuk melegakan simptom anda.

Pesakit perlu berjumpa doktor jika simptom berterusan atau menjadi lebih teruk, atau jika produk diperlukan untuk lebih daripada 3 hari.

Adalah disyorkan bahawa produk ini boleh digunakan maksimum untuk tiga hari.

Untuk mengelakkan kerengsaan, gerakkan gula-gula ubat batuk itu sekeliling mulut semasa menghisap.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaa ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil Strepsils Max Pro Madu & Lemon 8.75mg Lozenges lebih dari yang sepatutnya, anda mungkin berasa mengantuk atau loya. Anda perlu mendapatkan nasihat perubatan

dengan segera sekiranya berlebihan, walaupun anda berasa sihat.

Semasa menggunakan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Strepsils Max Pro Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

Flurbiprofen 8.75mg

BERHENTI MENGAMBIL ubat dan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta jika anda mengalami:

- Tanda-tanda reaksi alahan yang teruk seperti:
 - ruam kulit yang teruk
 - kulit mengelupas, berkuping atau melepuh
 - bengkak muka, tekak atau lidah
 - pernafasan berdehit, sesak nafas, sakit dada yang tidak boleh dijelaskan

Beritahu doctor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami:

Biasa:

- Pening, sakit kepala
- Kerengsaan tekak
- Ulser mulut atau sakit di mulut
- Sakit tekak
- Loya dan cirit-birit
- Gatal-gatal pada kulit

Luar biasa:

- mengantuk
- Melepuh dalam mulut atau tekak, kebas di tekak
- Kembung perut, sakit perut, angin, sembelit, masalah pencernaan, muntah
- mulut kering
- Pedih dalam mulut
- Ruam kulit, kulit gatal
- Demam, sakit
- Rasa mengantuk atau kesukaran untuk tidur
- Asma yan teruk, berdehit, sesak nafas

Jarang:

- Tindak balas *anaphylactic*

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi semakin serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan

di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui nombor telefon: 03-78835490, atau laman web www.npra.gov.my (Consumers -> Reporting -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Strepsils Honey & Lemon 8.75mg Lozenge

- Penyimpanan

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak. Simpan pada suhu di bawah 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Berbentuk bulat, berwarna kuning pucat keperangan dengan ikon timbul pada kedua-dua belah lozenge tersebut.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ia mengandungi bahan aktif Flurbiprofen 8.75mg.

- Bahan tidak aktif

Ia mengandungi *Macrogol 300, Potassium hydroxide, Lemon Flavour, Menthol, Liquid glucose, Refined Sugar, Honey.*

- Nombor MAL

MAL18016023ASZ

Pengilang

Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Limited, 65 Moo 12, Lardkrabang- Bangplee Road, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand

Pemegang Pendaftaran Produk

RB (Health) Malaysia Sdn Bhd (1297081-V)

Level 17, Menara One Sentrum, No. 201, Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. Careline number: 1800-888-889

Tarikh kemaskini RiMUP

01/03/2017

NPRA(R2/1)190621/173