

WOODWARD'S GRIPE WATER Product Insert Leaflet

W 148.5mm x H 210mm

WOODWARD'S GRIPE WATER ORAL SOLUTION

Terpeneless Dill Seed Oil 2.30 mg/5ml
Sodium Bicarbonate 52.50 mg/5ml

Product Description: A colorless to very pale yellow liquid, free from sediment and matter in suspension.

Pharmacodynamics: Sodium Hydrogen Carbonate has a well-established antacid action. Dill Seed Oil is a widely used aromatic carminative especially for use in the treatment of flatulence in children.

Indication: For the relief from wind pains, digestive upsets especially during teething period.

Recommended Dosage:

One to six months old - one teaspoonful (5ml)
Six months to two years old - two teaspoonfuls (10ml)
Two years and above - two to three teaspoonfuls (10-15ml)
These doses may be given during or after each feed up to 4 times in 24 hours.

Route of Administration: For oral administration

Contraindications: Should not be used where impaired kidney function or hypersensitivity to hydroxybenzoates exists.

Warnings and Precautions: If symptoms persist, medical advice should be sought.

Keep all medicines out of the reach of children.

Patients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take this medicine.

Label must include equivalent sentences of:

This medicinal product contains 1.4mmol (or 32.2mg) sodium per dose. To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.

If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product.

This medicine contains hydroxybenzoate derivatives (E215, E217 and E219) which may cause allergic reactions (possibly delayed).

Interactions with Other Medicaments: Unknown

Statement on usage during pregnancy and lactation: Not applicable

Adverse Effects/ Undesirable Effects: Unknown

Overdose and Treatment: Symptoms following overdose are rare and are generally due to the effects of sodium hydrogen carbonate. These may include diarrhoea, metabolic alkalosis and hypernatraemia. In the event of severe overdosing, medical advice should be sought immediately.

Symptoms of hypernatraemia may include drowsiness and irritability, pyrexia and tachypnoea. In more severe instances of acute sodium overload, signs of dehydration and convulsions may occur.

The treatment of hypernatraemia includes repair of any dehydration present and gradual reduction of the plasma sodium. The alkalosis, if present, will respond usually to the treatment of hypernatraemia. At all times intensive monitoring of the electrolytes, and patients circulatory and central nervous system are necessary.

Storage Conditions: Store below 25°C

Packaging available: 148 ml

Name and address of product registration holder:

RB (Health) Malaysia Sdn Bhd (1297081-V)
Level 17, Menara One Sentrum, No. 201, Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia.
Careline Number : 1800-888-889

Reckitt Benckiser (Singapore) Pte. Ltd.
12 Marina Boulevard #19 – 01, Marina Bay Financial Centre, Tower 3, Singapore 018982

Date of revision of PI: 4 May 2016

WOODWARD'S GRIPE WATER ORAL SOLUTION

Terpeneless Dill Seed Oil 2.30 mg/5ml Sodium Bicarbonate 52.50 mg/5ml

Perihal Produk: Sejenis cecair tak berwarna atau ber warna kuning langsung, bebas enapan dan dan jirim terampai.

Farmakodinamik: Sodium Hydrogen Carbonate mempunyai tindakan antasid yang mantap. Dill Oil See merupakan sejenis karminatif beraroma digunakan secara meluas terutama dalam merawat kembung kanak-kanak.

Indikasi: Untuk melegakan kembung perut, kurang hadam terutamanya semasa pertumbuhan gigi.

Sukatan: Satu hingga enam bulan - satu sudu teh (5ml)
Enam bulan hingga dua tahun - dua sudu teh (10ml)
Dua tahun dan ke atas - dua hingga tiga sudu teh (10-15ml)

Sukatan-sukatan ini boleh diberikan semasa atau selepas makan sehingga 4 kali dalam masa 24 jam.

Kaedah Pemberian: Melalui mulut.

Kontraindikasi: Jangan digunakan apabila berlaku fungsi buah pinggang terjejas atau hipersensitiviti kepada hidroksibenzoat.

Amaran dan Tindakan Pencegahan: Jika gejala berlarutan, dapatkan rawatan perubatan.

Jauhkan daripada kanak-kanak.

Pesakit yang bermasalah intolerans fruktosa nadir dilarang mengambil ubat ini.

Label mestilah memuatkan ayat setara berbunyi:

Produk ubat ini mengandungi 1.4mmol (atau 32.2mg) natrium bagi setiap dos. Perlu diambil perhatian oleh pesakit yang menjalani diet natrium terkawal.

Jika doktor memberitahu anda menghadapi intolerans terhadap sesetengah gula, hubungilah doktor anda sebelum mengambil produk ubat ini.

Ubat ini mengandungi terbitan hidroksibenzoat (E215, E217 dan E219) yang boleh menyebabkan tindak balas alergi (mungkin terlewat).

Saling tindak balas dengan Ubat-ubatan Lain: Tak diketahui

Kenyataan tentang penggunaan semasa hamil dan penyusuan: Tak berkenaan

Kesan Buruk/ Kesan Tak Diingini: Tak diketahui

Dos Berlebihan dan Rawatan: Gejala berikutan dos berlebihan adalah jarang-jarang dan umumnya disebabkan oleh kesan daripada natrium hidrogen karbonat. Antara lain kesannya ialah cirit-birit, alkalosis metabolisme dan hipernatraemia. Jika sekiranya berlaku dos berlebihan teruk, segeralah dapatkan rawatan perubatan.

Antara gejala-gejala hipernatraemia ialah mengantuk dan kerengsaan, pireksia dan takipnea. Dalam kes dos natrium akut yang lebih teruk, tanda-tanda dehidrasi dan konvulsi boleh berlaku.

Antara cara rawatan hipernatraemia ialah membetulkan dehidrasi yang wujud dan mengurangkan plasma natrium secara beransur-ansur.

Alkalosis, jika wujud, akan biasanya memberi gerak balas kepada rawatan hipernatraemia. Pada setiap masa, amatlah mustahak elektrolit, dan sistem peredaran dan saraf pusat pesakit dipantau dengan rapi.

Suhu Penyimpanan: Simpan pada suhu di bawah 25°C.

Pembungkusan tersedia: 148 ml

【 吴德物次 】肥仔水口服液

蔘籐油 2.30 毫克/5 毫升 碳酸氫鈉 52.50 毫克/5 毫升

產品說明：無色或淡黃色液體，无沉積物和浮懸物。

藥效學：碳酸氫鈉能有效進行抗酸作用。蔘籐籽油是廣泛被使用的芳香理氣劑，常用來治療兒童腸胃脹氣的問題。

適應症：能幫助解除發牙期間所引起的脹風疼痛和消化不良。

建議劑量：一至六個月 一茶匙（5 毫升）

六個月至兩歲 二茶匙（10 毫升）

兩歲以上 二至三茶匙（10-15 毫升）

上述劑量，可在每次餵哺之時或餵哺之後服用，在廿四小時內，最多可服用四次。

服用法：口服

禁忌：患有腎臟功能障礙或對羥基苯甲酸酯過敏者不得服用。

警告與預防：如微狀未見好轉。即應去看醫生。

請存放於小孩所不能觸及之處。

患有罕見遺傳問題，如糖不耐受症不得服用此產品。

標籤需包括相當於下列意思句子：

此藥用產品每劑量含1.4毫摩爾（或32.2毫克）鈉。需控制鈉含量飲食的病患須留意。

如果您的醫生認為您對某些糖類有不耐受症，服用此藥用產品前請聯絡您的醫生。

此藥含羥基苯甲酸浮生物(E215, E217和E219)，可能會引起過敏反應（可能有延遲反應）。

與其他藥物的相互作用：未知

孕期和哺乳期：不適用

反效果／不良影響：未知

過量與救護：過量的症狀非常罕見，有此反應通常是受到碳酸氫鈉的影響。可能會引起腹瀉，代謝性鹼中毒和低鈉血症。在出現嚴重過量症狀時，應立即送醫救治。

低鈉血症症狀包括昏沉和煩躁，發熱和呼吸急促。更嚴重的鈉過量症狀會有脫水和抽搐等情況出現。

低鈉血症的救治方法包括為任何出現的脫水狀況補水，如此，血漿鈉含量就會慢慢減少。若出現代謝性鹼中毒症，通常使用治療低鈉血症的方法來治療會有反應。此時需要密集監測患者的電解質，循環和神經系統。

儲存條件：存放于攝氏25度以下。

包裝體積：148毫升

FRONT

BACK