

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan RefluxD Suspension
2. Bagaimana RefluxD Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan RefluxD Suspension
4. Cara menggunakan RefluxD Suspension
5. Semasa menggunakan RefluxD Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan RefluxD Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan RefluxD Suspension

Rawatan gejala berkaitan asid refluks gastro-esofagus seperti regurgitasi asid, pedih ulu hati dan senak perut, contohnya selepas makan atau semasa mengandung.

Bagaimana RefluxD Suspension berfungsi

RefluxD Suspension ialah gabungan dua antasid (kalsium karbonat dan natrium bikarbonat) dan alginat dan berfungsi dalam dua cara.

- 1) Meneutralkan asid perut yang berlebihan untuk melegakan kesakitan dan ketidakselesaan.
- 2) Membentuk asid pelindung (hyperacidity).

Sebelum menggunakan RefluxD Suspension

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan ambil produk ini jika anda alah kepada mana-mana ramuan (lihat senarai ramuan).
- Sebelum mula menggunakan
Sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda,
 - Jika anda menderita atau mengalami penyakit buah pinggang atau jantung yang ketara, kerana sesetengah garam boleh mengganggu penyakit ini.
 - Jika anda pesakit Hiperkalsemia, efrokalsinosis atau mengalami batu karang berulang.

- Jika mengambil ubat-ubat lain
Beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.
- Mengandung dan menyusukan anak
Anda boleh mengambil produk ini jika anda hamil atau menyusu. Seperti semua ubat, tempoh rawatan harus dihadkan sebanyak mungkin.

Cara menggunakan RefluxD Suspension

- Berapa banyak harus digunakan
Untuk pengambilan secara oral, Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas : ambil 1~2 sachet (10~20mL), 4 kali sehari (selepas makan dan sebelum tidur).

RefluxD Suspension hanya boleh diambil atas nasihat perubatan doktor untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.

Jika mengambil dos kalsium karbonat dengan banyak, ia boleh menyebabkan Alkalosis, acid rebound, Hypercalcaemia, Milk-alkali Syndrome, and sembelit (ini berlaku jika mengambil produk melebihi dos yang disyorkan).

- Bila perlu digunakan
Guna seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Berapa lama perlu digunakan
Teruskan mengambil RefluxD Suspension selama yang disyorkan oleh doktor anda.
- Jika menggunakan terlalu banyak (terlebih dos)
Mengambil banyak dos dos kalsium karbonat setiap hari untuk tempoh yang berpanjangan boleh menyebabkan tahap kalsium yang tinggi dalam darah. Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-

tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa menggunakan RefluxD Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan
Kekalkan kepada dos yang disyorkan. Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika gejala berterusan atau bertambah teruk.

Sekiranya berlaku dos berlebihan, rawatan simptomatik harus diberikan.

- Perkara yang anda tidak boleh lakukan
Jangan ambil produk ini dalam masa dua jam selepas mengambil ubat lain, kerana ia boleh mengganggu tindakan beberapa ubat lain (terutamanya H2 antihistaminics, tetracyclines, digoxine, fluoroquinolones, iron salts, thyroid hormones, ketoconazole, neuroleptics, thyroxine, penicillamine, beta-blockers (atenolol, metoprolol, propranolol), glucocorticoid, chloroquine, dan diphosphonates.

Kesan-kesan sampingan

Sangat jarang (kurang daripada 1 dalam 10,000 pesakit yang dirawat) terdapat kemungkinan tindak balas alahan terhadap ramuan. Gejala ini mungkin termasuk ruam kulit, gatal-gatal, kesukaran bernafas, pening, atau bengkak pada muka, bibir, lidah atau tekak. Jika anda mengalami ini atau sebarang kesan sampingan yang lain, hentikan pengambilan produk dan dapatkan nasihat doktor anda dengan segera. Kesan sampingan lain yang kekerapan tidak diketahui atau sangat jarang mungkin termasuk sembelit, kerengsaan, gerenyetan atau kekejangan otot, senak perut dan tahap kalsium yang tinggi dalam darah.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan RefluxD Suspension

- Penyimpanan

- Jauhkan ubat ini dari pandangan dan capaian kanak-kanak.
- Simpan di bawah suhu 30°C (jangka hayat 24 bulan).
- Simpan dalam bungkusan asal.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui sisa air atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Produk

- Rupa dan warna produk

RefluxD Suspension adalah cecair ampaian oral berwarna kuning cair hingga krim dengan rasa pudina dalam sachet.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan-bahan aktif:

Sodium Alginate
Sodium Bicarbonate
Calcium Carbonate

- Bahan-bahan tidak aktif:

Sodium Hydrate, Enzymatically
Modified Stevia, Steviol glucoside,
Carbomer 934P, Sodium
Hydroxide, Methylparaben,
Propylparaben, Citrus flavor 91069,
Peppermint Oil , Purified Water.

- Nombor MAL

MAL25046042X

Pengilang

GENUONE SCIENCES Inc.
245 Sandangil, Jeonui-myeon,
Sejong-si, Republic of Korea

Pemegang Pendaftaran Produk

AiPharma Healthcare Sdn. Bhd.
No. 83, Jalan I-Park 1/9,
Kawasan Perindustrian I-Park,
Bandar Indahpura, 81000 Kulai,
Johor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

07/07/2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 25/032