

LYZODASE ORAL LIQUID

Lysozyme Hydrochloride (20 mg /5 ml), Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6) (10mg/5ml), Methylparaben 0.05%w/v, Propylparaben 0.005%w/v

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Lyzodase Oral Liquid
2. Bagaimana Lyzodase Oral Liquid berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lyzodase Oral Liquid
4. Cara menggunakan Lyzodase Oral Liquid
5. Semasa menggunakan Lyzodase Oral Liquid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang pendaftaran produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan Lyzodase Oral Liquid

Lyso-B Oral Liquid digunakan untuk melegakan sakit tekak. Ia merupakan sirap tanpa gula.

2. Bagaimana Lyzodase Oral Liquid berfungsi

Lysozyme hydrochloride diekstrak daripada telur putih dan digunakan untuk memulihkan tisu yang rosak, sebagai ejen anti-keradangan dan menguatkan sistem pertahanan badan semulajadi. Pyridoxine HCl (Vit B6) membantu meningkatkan tindak balas imuniti dengan meningkatkan pengeluaran antibody and juga membantu dalam interaksi komunikasi antara cytokines dan chemokines.

3. Sebelum menggunakan Lyzodase Oral Liquid

-Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda mempunyai alahan terhadap bahan-bahan aktif atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam produk ini.
- Jika anda mempunyai sejarah hipersensitiviti terhadap telur putih.

-Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor anda

- jika anda mempunyai alahan terhadap ubat-ubatan lain, pengawet makanan, makanan, dalam bentuk dermatitis atopik atau asma bronkial.
- Adalah lebih baik untuk tidak menggunakan ubat ini semasa hamil dan menyusu.

-Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

4. Cara menggunakan Lyzodase Oral Liquid

-Berapa banyak harus digunakan

Dos yang disyorkan:

Kanak-kanak 6 – 12 tahun: 5 ml

Dewasa: 10 ml.

Sila telan dengan perlahan-lahan.

Maksimum 4 kali sehari apabila diperlukan.

Jika gejala-gejala bertambah buruk atau tidak bertambah baik dalam masa 7 hari, berjumpa dengan doktor anda.

-Bila perlu digunakan

- Cuba mengambil ubat pada waktu yang sama setiap hari.
- Ambil ubat mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.
- Bincang dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

-Berapa lama perlu digunakan

Tempoh rawatan ditentukan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

5. Semasa menggunakan Lyzodase Oral Liquid

-Perkara yang perlu dilakukan

Simpan RiMUP. Anda mungkin perlu membaca semula. Jika anda ada sebarang pertanyaan, sila tanya doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini adalah preskripsi untuk anda sahaja. Jangan bagi orang lain. Ia mungkin tidak sesuai untuk orang lain walaupun mereka mempunyai tanda-tanda yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan mengambil melebihi dos yang disyorkan.

6. Kesan-kesan sampingan

Boleh menyebabkan cirit-birit, anoreksia, ketidakselesaan perut, loya dan muntah. Boleh menyebabkan reaksi hipersensitiviti seperti ruam kulit. Dalam kes yang jarang berlaku, kejutan mungkin berlaku dengan pengambilan ubat ini. Oleh itu, pesakit perlu dipantau dengan teliti.

Hentikan ubat dan minta bantuan perubatan jika sebarang di atas berlaku kepada anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

7. Cara penyimpanan and pelupusan

-Penyimpanan

Simpan bawah 30° C.

Jangan guna produk ini melampaui tarikh luput yang dicetak pada komponen pembungkusan.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Jauhi daripada kanak-kanak

8. Maklumat lanjut

-Rupa and warna produk

Lyzodase Oral Liquid adalah sirap yang jernih, pekat, likat dan manis dengan perisa pisang.

LYZODASE ORAL LIQUID

Lysozyme Hydrochloride (20 mg /5 ml), Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6) (10mg/5ml), Methylparaben 0.05%w/v, Propylparaben 0.005%w/v

-Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:
Lysozyme hydrochloride
Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6)

Bahan-bahan tak aktif:
Glycerin, sorbitol, perisa pisang,
methylparaben, propylparaben dan
sodium acetate.

-Nombor Pendaftaran

Lyzodase Oral Liquid
MAL20076054XC

9. Pengilang

AV Manufacturing Sdn. Bhd.(667760-V),
Lot 10621, Jalan Permata 2,
Arab Malaysian Industrial Park
71800 Nilai, Negeri Sembilan,
Malaysia.

10. Pemegang pendaftaran produk

Vismedic Sdn Bhd (890098-W)
No. 28B, Jalan BP 6/6, Bandar Bukit
Puchong, 47120 Puchong, Selangor

11. Tarikh kemaskini RiMUP

May 2023

Nombor siri

NPRA(R2/1) 230502/1057