# GELIGA BALM CAP KRIS

*Methyl Salicylate* 50%w/w, *Menthol* 5%w/w, *Camphor* 5%w/w

**Apakah yang ada pada risalah ini**

1. Apakah kegunaan Geliga Balm
2. Bagaimana Geliga Balm berfungsi
3. Sebelum menggunakan Geliga Balm
4. Cara menggunakan Geliga Balm
5. Semasa menggunakan Geliga Balm
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Geliga Balm
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

**Apakah kegunaan Geliga Balm**

Ia memberi kelegaan simptomatik untuk sakit otot dan sendi yang ringan dan sederhana, kekejangan otot, sakit bahu dan kejang leher.

**Bagaimana Geliga Balm berfungsi**

*Methyl salicylate*, *menthol* dan *camphor* adalah analgesik luaran yang merangsang rasa kehangatan dan/ atau sejuk. Ini menghasilkan tindakbalas yang merengsa yang memberikan kelegaan sementara sakit ringan pada otot dan sendi yang berkaitan dengan sakit belakang, artritis, ketegangan dan seliuh.

**Sebelum menggunakan Geliga Balm**

*- Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan guna sekiranya anda alah terhadap sebarang bahan kandungan lain dalam Geliga Balm ini.

*- Sebelum menggunakan*

Pada mulanya sapu kuantiti yang kecil pada kawasan kulit yang terhad dan memerhati sama ada ketidakselesaan atau gatal berlaku sebelum sapu pada kawasan kulit yang lebih besar. Jika iritasi kulit berlaku, sila berhenti gunakannya.

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

*- Jika mengambil ubat-ubat lain*

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

Penyapuan yang berlebihan oleh pesakit yang mengambil warfarin mungkin meningkatkan risiko perdarahan.

**Cara menggunakan Geliga Balm**

*- Berapa banyak harus digunakan*

Gosokkan pada bahagian terbabit 2 hingga 3 kali sehari.

Untuk kegunaan luar sahaja. Tidak boleh dimakan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

*- Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

*- Berapa lama perlu digunakan*

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

*- Jika terlupa menggunakan*

Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek.

*- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika terambil dos berlebihan.

Gejala termasuk sakit kepala, pening, loya dan muntah, kerengsaan kulit, dermatitis, ruam, kegatalan, kemerahan atau bengkak, sensasi terbakar atau tercucuk, boleh dikawal dengan mengurangkan dos.

**Semasa menggunakan Geliga Balm**

*- Perkara yang perlu dilakukan*

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

*- Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

*- Perkara yang perlu diberi perhatian*

Elakkan bersentuhan dengan mata dan membran mukus. Jangan memohon kepada luka atau kulit yang rosak. Elakkan penggunaan yang berlebihan semasa kehamilan dan penyusuan. Jangan gunakan secara meluas pada bahagian badan atau membalut.

Tanya penjagaan perubatan kesihatan anda apa- apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Geliga Balm.

**Kesan-kesan sampingan**

Sakit kepala, pening, loya dan muntah, kerengsaan kulit, dermatitis sentuh, ruam, kegatalan, kemerahan atau pembengkakan, pembakaran atau rasa menyengat mungkin berlaku.
Boleh menyebabkan tindak balas hipersensitifan / alergi pada sesetengah individu yang mempunyai masalah kulit sensitif.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my [Public →Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

**Cara penyimpanan dan pelupusan Geliga Balm**

*- Penyimpanan*

Simpan di bawah 30°C. Jauhkan daripada pancarun terus matahari. Jauhkan daripada capaian kanak- kanak.

*- Pelupusan*

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

**Product Description**

*- Rupa dan warna produk*

Salap berwarna putih dengan bau cirian.

*Bahan-bahan kandungan*

- Bahan aktif
  *Menthol, camphor, methyl salicylate*

- Bahan tidak aktif
  *Clove oil, turpentine oil, white soft paraffin, hard paraffin*

*- Nombor MAL:*

MAL20016152XC

**Pengilang**

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

**Pemegang Pendaftaran Produk**

Syarikat MYP Sdn Bhd
9-9A, Jalan Petaling, Larkin Industrial Area, 80350 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

**Tarikh kemaskini RiMUP**

6/12/2019

**Nombor Siri**

NPRA (R2) 19/188