

LATANDROPS 0.005% w/v EYE DROPS®

Latanoprost 0.005% w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan LATANDROPS
2. Bagaimana LATANDROPS berfungsi
3. Sebelum menggunakan LATANDROPS
4. Cara menggunakan LATANDROPS
5. Semasa menggunakan LATANDROPS
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan LATANDROPS
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan LATANDROPS

LATANDROPS Eye Drops digunakan untuk merendahkan tekanan dalam mata, jika anda mengalami glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup kronik atau hipertensi okular. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan peningkatan tekanan dalam mata sehingga mengganggu penglihatan anda.

Bagaimana LATANDROPS berfungsi

LATANDROPS mengandungi bahan aktif: *latanoprost*.

Latanoprost dari suatu kumpulan ubat yang dikenali sebagai analog prostaglandin. Latanoprost berfungsi dengan menambah pengaliran bendalir dari mata ke saluran darah.

Sebelum menggunakan LATANDROPS

- Bila tidak boleh menggunakan

- jika anda ada alahan terhadap bahan aktif LATANDROPS (*latanoprost*) atau kepada bahan-bahan lain terkandung dalam LATANDROPS;

- jika anda mengandungi (atau merancang untuk mengandungi);
- jika anda menyusui bayi.

- Sebelum mula menggunakan

LATANDROPS

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan LATANDROPS, jika anda berasa keadaan berikut berkaitan dengan anda:

- jika anda akan mengadakan pembedahan mata (termasuk pembedahan katarak) atau pernah ada pembedahan ke atas mata anda sebelum ini;
- jika anda mengalami masalah mata (seperti mata sakit, gatal, bengkak atau kabur);
- jika anda mengalami mata kering;
- jika anda memakai kanta sentuh, anda patut menanggalkannya sebelum menggunakan LATANDROPS. Selepas menggunakan LATANDROPS anda harus menunggu selama 15 minit sebelum memakai balik kanta sentuh;
- jika anda mengalami kesusahan bernafas kerana penyakit atau masalah paru-paru.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

LATANDROPS mungkin berinteraksi dengan ubat-ubatan lain. Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda tengah mengambil ubat-ubatan lain (atau ubat titis mata lain) yang diberikan anda tanpa preskripsi.

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi khasnya anda mengambil ubat-ubatan berikut:

- prostaglandin, analog prostaglandin, atau derivatif prostaglandin.

Cara menggunakan LATANDROPS

- Berapa banyak harus digunakan

Dos biasa bagi dewasa (termasuk warga emas) adalah setitis, sekali sehari pada mata berkenaan. Jangan guna LATANDROPS lebih daripada sekali sehari kerana

keberkesanan ubat mungkin berkurangan dengan penggunaan yang lebih kerap.

- Bila perlu digunakan

Titis ubat mata pada waktu petang setiap hari. Cuba menitis ubat mata anda pada waktu yang sama setiap hari. Ia tidak kisah sama ada menitis ubat sebelum atau selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan LATANDROPS seberapa lama seperti diarahkan oleh doktor sehingga doktor memberitahu anda masa untuk berhenti.

- Jika terlupa menggunakan

Teruskan dos berikutnya pada masa yang sama. Jangan gantikan dos supaya menggantikan dos yang terlupa. Jika anda tidak pasti, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda terlebih menitis ubat dalam mata, anda mungkin mengalami sedikit pedih pada mata dan mata mungkin berair dan merah. Ini akan sembuh dengan sendirinya, jika anda berasa risau, hubungi doktor untuk mendapatkan nasihat.

Semasa menggunakan LATANDROPS

- Perkara yang perlu dilakukan

Ubat ini tidak sesuai untuk ibu mengandung dan wanita yang menyusui bayi. Beritahu doktor dengan segera jika anda mengandungi semasa rawatan dengan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan LATANDROPS jika anda mengandungi. Beritahu doktor dengan segera jika anda mengandungi, rasa bermungkinan mengandungi atau merancang mengandungi.

Jangan gunakan LATANDROPS jika anda menyusui anak.

LATANDROPS 0.005% w/v EYE DROPS[®]

Latanoprost 0.005% w/v

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Semasa mengguna LATANDROPS, penglihatan mungkin menjadi kabur buat sementara. Jika ia berlaku, jangan memandu atau mengendalikan jentera atau mesin sehingga penglihatan menjadi jelas semula.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, LATANDROPS boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua pesakit mengalaminya.

Berikut adalah kesan-kesan sampingan yang dikenal pasti dengan penggunaan LATANDROPS. Kesan sampingan yang paling ketara adalah penukaran warna mata secara perlahan-lahan.

Kesan sampingan yang sangat biasa berlaku:

- Pertukaran secara perlahan-lahan pada warna mata dengan penambahan pigmen coklat pada bahagian warna mata yang dikenali sebagai iris. Jika anda mempunyai mata berwarna campuran (biru-coklat, kelabu-coklat, kuning-coklat, atau hijau-coklat), anda akan lihat perubahan ini lebih ketara daripada mata berwarna tunggal (biru, kelabu, hijau atau coklat). Sebarang perubahan warna mata mengambil masa bertahun-tahun. Perubahan warna mungkin kekal dan ia lebih ketara jika anda mengguna LATANDROPS pada sebelah mata sahaja.

Perubahan warna mata tidak menyebabkan mudarat pada mata. Perubahan warna mata tidak berterusan selepas rawatan dengan LATANDROPS dihentikan.

Kesan-kesan sampingan yang lain termasuk:

- Iritasi mata (rasa pedih, gatal, mencucuk, atau seperti habuk termasuk mata) dan sakit mata.
- Sakit kepala.

- Mata merah, jangkitan mata (konjunktivitis), kabur, berair, bengkak pada kelopak mata, iritasi atau gangguan pada permukaan mata.
- Ruam kulit atau gatal (pruritus).

Jika sebarang kesan sampingan menjadi serius, atau anda mendapati kesan sampingan yang tidak tercatat dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan LATANDROPS

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan dalam peti sejuk (2°C - 8°C).

Botol LATANDROPS yang telah dibuka: Simpan bawah 25°C.

Simpan botol ubat dalam kotaknya.

LATANDROPS boleh digunakan selama 4 minggu selepas dibuka.

Simpan botol ubat dalam kotaknya supaya terlindung daripada cahaya.

Jangan gunakan LATANDROPS selepas tarikh luputnya yang tercatat atas label dan kotak. Tarikh luput tercatat merujuk kepada hari terakhir bagi bulan berkenaan.

- Pelupusan

Jangan buang ubat dalam sinki atau dalam paip tandas. Tanyalah ahli farmasi cara pelupusan bagi ubat yang tidak berguna. Ia akan

melindungi alam sekitar daripada pencemaran.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Setiap kotak ubat mengandungi sebotol ubat titis mata LATANDROPS 2.5mL dengan sekeping sisip bungkusan.

LATANDROPS adalah cecair jernih dan tanpa warna.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Bahan aktif ubat ini adalah *latanoprost* 50mcg/mL.

- Bahan tidak aktif

Bahan-bahan tidak aktif termasuk: *Sodium chloride*, *Benzalkonium chloride* (sebagai pengawet), *Sodium dihydrogen phosphate monohydrate*, *Disodium hydrogen phosphate anhydrous*, *Water for injections*.

- Nombor MAL:

MAL10033194AZ

Pengilang

VIANEX S.A.-Plant A,
12th km Athens-Lamia National road,
14451 Metamorphossi, Attiki,
Greece.

Pemegang Pendaftaran Produk

MMS PHARMA (MALAYSIA) Sdn.
Bhd. (812060-M),
B-5-9, Impian Heights,
Bandar Puchong Jaya,
47100 Selangor.

Tarikh kemaskini RiMUP

20/03/2020

Nombor Siri

NPRA (R2/1)190924/253