

# Neurogab 75

Pregabalin Capsules 75mg

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Neurogab 75
2. Bagaimana Neurogab 75 berfungsi
3. Sebelum menggunakan Neurogab 75
4. Cara menggunakan Neurogab 75
5. Semasa menggunakan Neurogab 75
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Neurogab 75
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

## Apakah kegunaan Neurogab 75

Neurogab tergolong dalam kumpulan ubat yang digunakan untuk merawat epilepsy, kesakitan sistem saraf dan gangguan keresahan umum pada orang dewasa.

## Kesakitan sistem saraf periferi dan pusat:

Neurogab digunakan untuk merawat kesakitan yang berpanjangan yang disebabkan oleh kerosakan pada saraf. Pelbagai penyakit boleh menyebabkan kesakitan neuropatik periferi seperti diabetes atau herpes zoster. Sensasi kesakitan boleh diperihalkan sebagai panas, terbakar, berdenyut, menembak, menikam, tajam, kekejangan, kesemutan, kebas, pin dan jarum. Kesakitan neuropatik peripheral dan pusat juga boleh dikaitkan dengan perubahan mood, gangguan tidur, keletihan, dan boleh memberi kesan pada fungsi fizikal dan social dan kualiti hidup keseluruhan.

**Epilepsi:** Neurogab digunakan untuk merawat rawatan sawan separa dengan/tanpa generalisasi sekunder dalam

pesakit dewasa. Doktor anda akan memprekripsikan Neurogab untuk membantu rawatan epilepsy anda ketika rawatan semasa anda tidak mengawal keadaan anda. Anda harus mengambil Neurogab sebagai tambahan kepada rawatan semasa anda. Neurogab tidak digunakan sebagai rawatan tunggal, tetapi harus selalu digunakan bersama dengan rawatan anti-epilepsi lain.

## Gangguan Keresahan Umum:

Neurogab digunakan untuk merawat gangguan keresahan umum (GAD). Gejala GAD adalah kegelisahan dan kebimbangan yang berpanjangan dan sukar dikawal. GAD juga boleh menyebabkan kegelisahan atau berasa tidak senang, mudah letih, sukar menumpukan perhatian atau fikiran menjadi kosing, mudah marah, mengalami ketegangan otot atau gangguan tidur, Ini berbeza dengan tekanan kehidupan seharian.

## Bagaimana Neurogab 75 berfungsi

Neurogab 75 tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil anticonvulsants. Neurogab 75 berfungsi dengan cara yang berbeza: dalam epilepsy ia menghentikan sawan dengan mengurangkan aktiviti elektrik yang tidak normal di dalam otak, dengan sakit saraf ia menghalang kesakitan dengan mengganggu mesej sakit yang bergerak melalui otak dan ke bawah tulang belakang.

## Sebelum menggunakan Neurogab 75

- Bila tidak boleh mengguna  
Jangan mula mengambil Neurogab sekiranya anda alah terhadap Neurogab 75 atau apa-apa bahan yang terkandung dalam Neurogab.

- Sebelum mula mengguna  
Bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Neurogab 75.

- Sesetengah pesakit yang mengambil Neurogab 75 telah melaporkan simptom yang menunjukkan tindak balas alahan. Gejala ini termasuk bengkak muka, bibir, lidah, dan tekak, serta ruam kulit yang meresap.

- Sekiranya anda mengalami sebarang tindak balas ini, anda harus segera menghubungi doktor anda.

- Neurogab 75 telah dikaitkan dengan pening dan mengantuk, yang boleh meningkatkan kejadian kecederaan tidak sengaja (jatuh) pada pesakit tua. Oleh itu, anda harus berhati-hati sehingga anda terbiasa dengan sebarang kesan yang mungkin ada pada ubat tersebut.

- Neurogab 75 boleh menyebabkan kabur atau kehilangan penglihatan, atau perubahan lain dalam penglihatan, kebanyakannya yang bersifat sementara. Anda harus segera memberitahu doktor anda jika anda mengalami sebarang perubahan dalam penglihatan anda.

- Sesetengah pesakit diabetes yang menambah berat badan semasa mengambil Neurogab 75 mungkin memerlukan perubahan dalam ubat diabetes mereka.

- Kesan sampingan tertentu mungkin lebih biasa, seperti mengantuk, kerana pesakit yang mengalami kecederaan saraf tunjang mungkin mengambil ubat lain untuk merawat, contohnya, sakit atau spastik, yang mempunyai kesan sampingan yang serupa dengan Neurogab 75 dan keterukan kesan ini mungkin meningkat. apabila diambil bersama.

- Terdapat laporan kegagalan jantung dalam sesetengah pesakit apabila mengambil

# Neurogab 75

Pregabalin Capsules 75mg

Neurogab 75; pesakit ini kebanyakannya warga emas dengan keadaan kardiovaskular.

Sebelum mengambil ubat ini, anda harus memberitahu doktor anda jika anda mempunyai sejarah penyakit jantung.

Terdapat laporan kegagalan buah pinggang dalam sesetengah pesakit apabila mengambil Neurogab 75. Jika semasa mengambil Neurogab 75 anda mendapati kencing berkurangan, anda harus memberitahu doktor anda kerana menghentikan ubat boleh memperbaiki keadaan ini.

Sebilangan kecil orang yang dirawat dengan anti-epilepsi seperti Neurogab 75 mempunyai pemikiran untuk mencederakan atau membunuh diri mereka sendiri. Jika pada bila-bila masa anda mempunyai pemikiran ini, segera hubungi doktor anda.

Apabila Neurogab 75 diambil bersama ubat lain yang boleh menyebabkan sembelit (seperti beberapa jenis ubat sakit) ada kemungkinan masalah gastrousus mungkin berlaku (cth. sembelit, usus tersumbat atau lumpuh).

Beritahu doktor anda jika anda mengalami sembelit, terutamanya jika anda terdedah kepada masalah ini.

Sebelum mengambil ubat ini, anda harus memberitahu doktor anda jika anda mempunyai sejarah ketagihan alkohol atau sebarang penyalahgunaan dadah atau pergantungan.

Jangan mengambil ubat lebih daripada yang ditetapkan.

Terdapat laporan tentang sawan apabila mengambil Neurogab 75 atau sejourus selepas menghentikan Neurogab 75. Jika anda mengalami sawan, hubungi doktor anda dengan segera. Terdapat laporan mengenai pengurangan fungsi otak (ensefalopati) dalam sesetengah pesakit yang mengambil Neurogab 75 apabila mereka mempunyai keadaan lain. Beritahu doktor anda jika anda mempunyai sejarah sebarang keadaan perubatan yang serius, termasuk penyakit hati atau buah pinggang.

## - Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika mengambil, baru-baru ini mengambil atau mungkin mengambil ubat lain.

Neurogab dan ubat-ubatan lain mungkin saling mempengaruhi (interaksi). Apabila diambil bersama ubat-ubatan lain, Neurogab dapat meningkatkan kesan sampingan yang dilihat pada ubat-ubatan ini, termasuk kesukaran pernafasan dan koma. Tahap pening, mengantuk dan pengurangan tumpuan boleh terjadi jika Neurogab diambil bersama dengan produk ubat yang mengandungi:

- Oxycodone – digunakan sebagai ubat penahan sakit.
- Lorazepam – digunakan untuk merawat kegelisahan.
- Alkohol

Neurogab boleh diambil dengan pil perancang.

## Cara menggunakan Neurogab

### - Berapa banyak harus digunakan

- Ambil Neurogab tepat sebagaimana yang ditetapkan. Penyedia penjagaan kesihatan anda akan memberitahu anda

berapa banyak Neurogab yang perlu untuk diambil

- Neurogab mungkin boleh diambil dengan atau tanpa makanan
- Penyedia penjagaan kesihatan anda mungkin menukar dos anda. Jangan menukar dos anda tanpa berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan anda
- Dos yang disyorkan ialah 150 hingga 600 mg sehari yang dibahagikan kepada dua atau tiga dos.

### - Bila perlu digunakan

Mengambil Neurogab tepat sebagaimana yang ditetapkan. Penyedia penjagaan kesihatan anda akan memberitahu anda bila untuk mengambilnya. Anda dinasihatkan supaya mengambil Neurogab pada masa yang sama setiap hari.

### - Berapa lama untuk mengambil:

Jangan berhenti mengambil Neurogab tanpa memeriksa dengan penyedia penjagaan kesihatan anda. Jika anda berhenti mengambil Neurogab secara tiba-tiba, anda mungkin mengalami masalah sakit kepala, loya, cirit-birit atau masalah tidur. Sekiranya anda mempunyai epilepsi dan berhenti mengambil Neurogab secara tiba-tiba, anda mungkin mengalami sawan yang lebih kerap. Berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan anda tentang bagaimana untuk menghentikan Neurogab secara perlahan.

### - Jika terlupa menggunakan

Ini adalah penting untuk mengambil kapsul Neurogab anda pada waktu yang sama setiap hari. Sekiranya anda terlupa mengambil dos, ambil secepat anda ingat melainkan sudah tiba masanya untuk dos seterusnya. Sekiranya demikian, teruskan dengan dos seterusnya seperti biasa. Jangan mengambil dos

# Neurogab 75

Pregabalin Capsules 75mg

berganda untuk menebus dos yang dilupakan.

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda atau segera pergi ke unit kecemasan hospital terdekat. Bawa kotak atau sebotol kapsul Neurogab bersama anda. Anda mungkin berasa mengantuk, bingung, gelisah, atau gelisah akibat mengambil lebih banyak Neurogab daripada yang sepatutnya.

**Semasa menggunakan Neurogab**

- Perkara yang perlu dilakukan

**Berhenti mengambil Neurogab dan hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda dengan segera sekiranya anda mempunyai sebarang tanda reaksi alahan yang serius:**

- Bengkak pada muka, mulut, bibir, gusi, lidah, tekak atau leher anda
- Masalah pernafasan
- Ruam, gatal-gatal (bengkak timbul) atau lepuh

**Hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda dengan segera sekiranya anda mempunyai manamana gejala berikut, terutamanya jika ia adalah baru, lebih teruk atau membimbangkan anda:**

- Pemikiran bunuh diri atau mati
- Percubaan untuk membunuh diri
- Kemurungan yang baru atau lebih teruk
- Kebimbangan yang baru atau lebih teruk
- Rasa resah atau gelisah
- Serangan panik
- Masalah tidur (*insomnia*)
- Perasaan cepat marah yang baru atau lebih teruk
- Bertindak agresif, marah atau ganas
- Bertindak atas impuls berbahaya

- Peningkatan melampau dari segi kegiatan dan pertuturan (*mania*)

- Perubahan tingkah laku atau mood yang luar biasa

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

**Jangan memandu, mengendalikan mesin, atau melakukan aktiviti-aktiviti lain yang boleh membahayakan anda sehingga anda mengetahui kesan-kesan Neurogab 75 terhadap anda.**

Neurogab 75 mungkin menyebabkan pening dan mengantuk yang keterlaluan. Ini boleh menjejaskan keupayaan untuk melakukan aktiviti seperti memandu atau mengendalikan jentera, malah ia boleh meningkatkan risiko kecederaan yang tidak disengajakan (jatuh) dalam kalangan warga tua.

Tanya penyedia penjagaan kesihatan anda tentang masa yang sesuai bagi anda untuk melakukan aktiviti-aktiviti ini.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

**Sekiranya anda mempunyai pemikiran atau tindakan membunuh diri, jangan berhenti mengambil Neurogab tanpa berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan terlebih dahulu.**

- Berhenti mengambil Neurogab secara tiba-tiba boleh mengakibatkan masalah yang serius
- Pemikiran atau tindakan membunuh diri mungkin disebabkan oleh perkara-perkara lain daripada ubat-ubat. Jika anda mempunyai pemikiran atau tindakan membunuh diri, penyedia penjagaan kesihatan anda

mungkin akan memeriksa sebab-sebab lain.

**Bagaimana saya boleh berwaspada dengan gejala awal pemikiran dan tindakan membunuh diri**

- Menyedari sebarang perubahan, terutamanya perubahan secara tiba-tiba, dari segi mood, tingkah laku, pemikiran atau perasaan.
- Pastikan semua lawatan susulan dengan penyedia penjagaan kesihatan anda dibuat seperti yang dijadualkan
- Hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda antara masa lawatan seperti yang diperlukan, terutamanya jika anda risau tentang simptom-simptom ini.

**Kesan-kesan sampingan**

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

**Sangat biasa: boleh menjejaskan lebih daripada 1 dalam 10 orang**

Pening, mengantuk, sakit kepala

**Biasa: boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang**

- Meningkatkan selera makan
- Perasaan gembira, kekeliruan, penurunan minat seksual, mudah marah
- Gangguan dalam perhatian, kekok, gangguan ingatan, hilang ingatan, gegaran, kesukaran bercakap, rasa kesemutan, kebas, sedasi, lesu, insomnia, keletihan, rasa tidak normal.
- Penglihatan kabur, penglihatan berganda
- Vertigo, masalah keseimbangan, jatuh.
- Mulut kering, sembelit, muntah, kembung perut, cirit birit, loya, perut bengkak.
- Kesukaran dengan ereksi
- Bengkak badan termasuk bahagian kaki

# Neurogab 75

Pregabalin Capsules 75mg

- Rasa mabuk, gaya berjalan yang tidak normal
- Pertambahan berat badan
- Kejang otot, sakit sendi, sakit pinggang, sakit anggota badan
- Sakit tekak

## **Tidak biasa: boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang**

- Hilang selera makan, penurunan berat badan, gula darah rendah, gula darah tinggi.
- Perubahan dalam persepsi diri, kegelisahan, kemurungan, pergolakan, perubahan mood, kesukaran mencari perkataan, halusinasi, mimpi tidak normal, serangan panik, sikap tidak peduli, pencerobohan, mood meningkat, gangguan mental, kesukaran berfikir, peningkatan minat seksual, masalah fungsi seksual termasuk ketidakupayaan untuk mencapai klimaks seksual, ejakulasi tertunda.
- Perubahan dalam penglihatan, pergerakan mata yang luar biasa, perubahan dalam penglihatan termasuk penglihatan terowong, kilatan cahaya, pergerakan tersentak, reflex berkurangan, peningkatan aktiviti, pening semasa berdiri, kulit sensitif, kehilangan rasa, sensasi terbakar, gegaran semasa pergerakan, kesedaran menurun, kehilangan kesedaran, pengsan, peningkatan sensitiviti pada bunyi bising, rasa tidak sihat.
- Mata kering, mata bengkak, sakit mata, mata lemah, mata berair, kerengsaan mata.
- Gangguan irama jantung, peningkatan kadar denyutan jantung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, perubahan degupan jantung, kegagalan jantung.
- Flushing, hot flushes.
- Sukar bernafas, hidung kering, hidung tersumbat.
- Peningkatan pengeluaran air liur, pedih ulu hati, kebas di sekitar mulut.

- Berpeluh, ruam, menggigil, demam.
- Kedutan otot, bengkak sendi, kekejangan otot, sakit termasuk sakit otot, sakit leher.
- Sakit payudara
- Kesukaran atau sakit kencing, inkontinens
- Lemah, dahaga, dada sesak
- Perubahan dalam keputusan ujian darah dan hati (creatinine phosphokinase darah meningkat, alanine amino transferase meningkat, aspartate aminotransferase meningkat, kiraan platelet menurun
- Neutropenia, peningkatan kreatinin darah, penurunan kalim darah.
- Hipersensitiviti, muka bengkak, gatal-gatal, hidung berdarah, batuk, berdengkur.
- Senggugut yang menyakitkan.
- Kesejukan tangan dan kaki

## **Jarang: boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 1000 orang**

- Deria bau yang tidak normal, penglihatan berayun, persepsi kedalama yang berubah-ubah, kecerahan penglihatan, kehilangan penglihatan
- *Pupil* melebar, mata melintang
- Berpeluh sejuk, sesak tekak, lidah bengkak
- Keradangan pancreas
- Kesukaran menelan
- Pergerakan badan yang perlahan atau berkurang
- Cecair dalam perut meningkat
- Kekejangan
- Perubahan dalam rakaman perubahan elektrik (ECG) di jantung yang sesuai dengan gangguan irama jantung.

Kerosakan otot, pembuangan payudara, pertumbuhan payudara yang tidak normal, pertumbuhan payudara pada lelaki.

- Haid yang terganggu
- Kegagalan buah pinggang, penurunan jumlah air kencing
- Penurunan jumlah sel darah putih

- Kelakuan tidak wajar
- Reaksi alahan (mungkin termasuk kesukaran bernafas, keradangan mata), reaksi kulit yang serius dicirikan oleh ruam, lepuh, kulit mengelupas dan sakit
- *Jaundice* (kulit dan mata menguning)

## **Sangat jarang berlaku: boleh mempengaruhi sehingga 1 dari 10000 orang**

- Kegagalan hati
- Hepatitis (radang hati)

Jika anda mengalami muka atau lidah bengkak atau jika kulit anda menjadi merah dan mula melepuh atau mengelupas, anda harus mendapatkan nasihat perubatan segera. Kesan sampingan tertentu mungkin lebih biasa seperti mengantuk kerana pesakit yang mengalami kecederaan saraf tunjang mungkin mengambil ubat lain untuk merawat, contohnya sakit atau spastik, yang mempunyai kesan sampingan yang serupa dengan Neurogab 75 dan keterukan kesan ini mungkin meningkat apabila diambil bersama.

Jika anda mendapat sebarang kesan sampingan, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuk sebarang kemungkinan kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) [*Public → Reporting SideEffects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*]

# Neurogab 75

Pregabalin Capsules 75mg

---

## Cara penyimpanan dan pelupusan Neurogab 75

### - *Penyimpanan*

Jangan simpan melebihi 30°C.  
Jauhkan daripada pandangan  
dan capaian kanak-kanak

### - *Pelupusan*

Simpan di dalam bekas asal.  
Ubat ini tidak boleh  
dibuangkan melalui air sisa  
atau sampah sisa rumah. Tanya  
ahli farmasi anda bagaimana  
membuangkan ubat yang tidak  
diperlukan lagi. Langkah-  
langkah ini akan membantu  
melindungi alam sekitar.

## Maklumat lanjut

### - *Rupa dan warna produk*

#### **Kapsule Neurogab 75mg:**

Coklat/putih, kapsul gelatin  
keras bersaiz “4” dicetak  
dengan “M3” pada penutup  
dan “75mg” pada badan yang  
mengandungi serbuk berwarna  
putih.

### - *Bahan aktif*

Pregabalin

### - *Bahan tidak aktif*

Lactose Monohidrat, Kanji  
Jagung, Talkum, Kulit Kapsul,  
Gelatin, Titanium Dioksida,  
Gelatin, Air dan Natrium  
Lauryl Sulfate.

## Nombor MAL:

MAL23106011AZ

## **Pengilang**

Macleods Pharmaceuticals  
Limited, Block N-2, Village  
Theda, Post Office  
Lodhimajra, Tehsil Baddi,  
District Solan, Himachal  
Pradesh – 174101, India

## **Pemegang Pendaftaran**

### **Produk**

Macleods Pharmaceuticals  
Sdn. Bhd. A2-27-1 Soho Suites  
KLCC, Jalan Perak, 50450  
Kuala Lumpur, Malaysia.