

RHZ Kid Dispersible Tablet (DT)

Rifampicin 75 mg, Isoniazid 50 mg and Pyrazinamide 150 mg Dispersible Tablets

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan RHZ Kid DT
2. Bagaimana RHZ Kid DT berfungsi
3. Sebelum mengambil RHZ Kid DT
4. Cara menggunakan RHZ Kid DT
5. Semasa menggunakan RHZ Kid DT
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan Pelupusan RHZ Kid DT
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan RHZ Kid DT

RHZ Kid DT adalah gabungan tiga ubat yang bertindak melawan bakteria yang menyebabkan tuberkulosis (TB). Bahan aktif dalam RHZ Kid DT ialah:

- *Isoniazid*
- *Rifampicin*
- *Pyrazinamide*

RHZ Kid DT digunakan untuk rawatan awal tuberkulosis pada kanak-kanak dengan berat kurang daripada 25 kg.

RHZ Kid DT boleh diberikan secara bersendirian atau bersama dengan ubat TB yang lain.

Produk ini bertujuan untuk digunakan pada kanak-kanak. Namun begitu, maklumat keselamatan disediakan untuk isu kesihatan dewasa seperti penyakit hati, kehamilan dan penyusuan susu ibu, untuk membolehkan akses penuh kepada semua maklumat yang berkaitan.

Bagaimana RHZ Kid DT berfungsi

RHZ Kid DT mengandungi tiga ubat berbeza yang dipanggil *isoniazid*, *rifampicin* dan *pyrazinamide*. Semua ubat ini tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil ubat anti-tuberkulosis. Ia bekerja dengan membunuh bakteria yang menyebabkan tuberkulosis.

Sebelum mengambil RHZ Kid DT

- Bila anda tidak boleh

menggunakan RHZ Kid DT

Jangan ambil RHZ Kid DT jika anda:

- adalah hipersensitif (alah) kepada *isoniazid*, *pyrazinamide*, *rifampicin* atau ubat berkaitan yang dipanggil *rifamycins* atau kepada mana-mana bahan lain RHZ Kid DT (lihat di bahagian "Bahan-bahan kandungan RHZ Kid DT").
- sedang mengalami masalah hati baru (akut).
- sebelum ini mempunyai masalah hati (hepatitis) yang disebabkan oleh RHZ Kid DT, *rifampicin* atau *isoniazid*
- menghadapi *gouty arthritis* atau *hyperuricemia* (paras asid urik yang tinggi dalam darah)
- mempunyai masalah buah pinggang yang teruk
- mempunyai keadaan yang dipanggil porfiri
- Sedang mengambil ubat-ubatan tertentu:
 - o **Voriconazole** (ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat)
 - o **Ubat jangkitan HIV:** *atazanavir*, *bictegravir*/ *emtricitabine*/ *tenofovir alafenamide*, *darunavir*, *doravirine*, *elvitegravir*/ *cobicistat*, *etravirine*, *fosamprenavir*, *lopinavir*, *nevirapine*, *rilpivirine*, *ritonavir*, *tipranavir*
 - o **Ubat hepatitis C kronik:** *daclatasvir*, *elbasvir*/ *grazoprevir*, *glecaprevir*/ *pibrentasvir*, *ledipasvir*/ *sofosbuvir*, *ombitasvir*/ *paritaprevir*/ *ritonavir*, *sofosbuvir*
 - o **Ubat malaria:** *artemisinin* dan derivatifnya (*artemether*, *artemotil*, *artesunate*, *dihydroartemisinin*)

Jangan ambil RHZ Kid DT jika mana-mana perkara di atas berlaku kepada anda.

Jika anda tidak pasti tentang apa-apa, tanya penjaga kesihatan anda.

- Sebelum anda mula gunakan RHZ Kid DT

Amaran dan langkah berjaga-jaga
Rifampicin dalam RHZ Kid DT boleh menyebabkan tindak balas alahan yang teruk seperti ruam, anemia, kiraan platelet rendah, kesukaran bernafas, kejutan, demam atau kegagalan buah pinggang seperti bilangan sel platelet rendah (*thrombocytopenia*), purpura, anemia hemolitik, *dyspnoea* dan serangan seperti asma, kejutan atau kegagalan buah pinggang. Anda harus berhenti mengambil RHZ Kid DT dengan segera jika anda mengalami reaksi alahan yang teruk. Jika anda mengalami reaksi sedemikian, anda tidak boleh lagi dirawat dengan *rifampicin*.

Berbincang dengan penjaga kesihatan anda sebelum mengambil RHZ Kid DT.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai salah satu daripada penyakit berikut sebelum mengambil ubat ini:

- Masalah buah pinggang
- Masalah hati
- Diabetes
- Epilepsi
- Keradangan saraf periferi atau saraf optik
- Masalah dengan penglihatan
- Ketagihan alkohol kronik
- Malnutrisi (kurang makan)
- Psikosis (gangguan mental)

Bercakap dengan penjaga kesihatan anda jika anda mempunyai mana-mana keadaan ini, kerana RHZ Kid DT mungkin tidak sesuai untuk anda, atau penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda mungkin perlu menjalankan pemeriksaan tambahan.

Penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda akan memeriksa darah anda untuk fungsi hati dan perubahan metabolik sebelum memulakan terapi, dan pada selang masa yang tetap semasa rawatan dengan RHZ Kid DT.

Penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda juga akan memeriksa penglihatan anda sebelum dan semasa rawatan. Hubungi penyedia khidmat

RHZ Kid Dispersible Tablet (DT)

Rifampicin 75 mg, Isoniazid 50 mg and Pyrazinamide 150 mg Dispersible Tablets

penjagaan kesihatan anda dengan segera jika anda melihat sebarang masalah dengan penglihatan anda di antara sesi pemeriksaan.

RHZ Kid DT boleh menyebabkan penyakit hati (hepatitis). Anda harus berhati-hati terhadap gejala yang mungkin disebabkan oleh kerosakan hati, seperti kehilangan selera makan yang tidak dapat dijelaskan, loya, muntah, air kencing gelap, warna kuning pada kulit dan bahagian putih mata (jaundis), keletihan yang berterusan selama lebih daripada 3 hari dan sakit perut (perut) dan kelembutan. Jika ini berlaku, anda harus segera berbincang dengan penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda.

Anda mungkin berisiko khusus untuk menghidap hepatitis jika:

- anda berumur lebih daripada 35 tahun
- anda minum minuman beralkohol setiap hari (lihat "RHZ Kid DT dengan makanan dan minuman")
- anda mempunyai gangguan hati kronik
- anda adalah pengguna ubat suntikan (cth., heroin)

Jika mana-mana perkara ini berlaku kepada anda, penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda akan memeriksa fungsi hati anda dengan lebih kerap.

Tambahan pula, anda akan dipantau dengan teliti jika:

- anda menggunakan ubat jangka panjang lain pada masa yang sama (lihat "Ubat lain dan RHZ Kid DT"),
- anda mengalami kesemutan di tangan dan kaki (neuropati perifer),
- awak mengandung
- anda mempunyai jangkitan HIV.

Jika anda mendapat simptom seperti selesema seperti demam, sakit kepala, sakit otot dan lain-lain, anda harus segera melaporkannya kepada penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda, kerana RHZ Kid DT mungkin adalah puncanya.

Rasa kesemutan pada tangan dan kaki (neuropati perifer) adalah kesan sampingan yang paling biasa bagi isoniazid, salah satu bahan aktif dalam RHZ Kid DT (lihat "Kemungkinan kesan sampingan"). Anda harus melaporkan sebarang gejala sedemikian kepada penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda. Penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda mungkin menetapkan vitamin B6 (*pyridoxine*) untuk diambil semasa rawatan dengan RHZ Kid DT, kerana ia mengurangkan risiko mendapat neuropati.

Jika anda hipersensitif (alah) kepada *ethionamide* atau *niacin* (asid nikotinik), anda harus memberitahu penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda, kerana anda juga mungkin hipersensitif kepada RHZ Kid DT.

Jika anda mengambil kortison atau apa-apa ubat seperti kortison (dipanggil kortikosteroid), anda harus memberitahu penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda, kerana dos kortison mungkin perlu ditingkatkan semasa anda mengambil RHZ Kid DT.

RHZ Kid DT menyebabkan perubahan warna jingga kemerahan pada cecair badan seperti air kencing, kahak dan koyakan serta najis anda. Ini disebabkan oleh rifampicin, dan tidak memerlukan perhatian perubatan. Selain itu, kanta sentuh boleh menjadi kotor akibat RHZ Kid DT.

RHZ Kid DT boleh mengurangkan keberkesanan pil kontraseptif oral. Oleh itu kaedah kontraseptif yang berbeza atau tambahan (cth. kondom, peranti dalam rahim, pesari) harus digunakan semasa rawatan dengan RHZ Kid DT.

Adalah penting bahawa penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda mengetahui tentang semua tanda penyakit anda, walaupun anda fikir ia tidak berkaitan dengan jangkitan tuberkulosis.

Anda perlu mengambil RHZ Kid DT dengan kerap setiap hari. Jangan ganggu atau hentikan rawatan anda tanpa berbincang dengan penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda.

Kehamilan dan penyusuan susu ibu

Jika anda hamil, fikir anda mungkin, atau merancang untuk hamil, berbincang dengan penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda untuk membincangkan potensi manfaat dan risiko terapi tuberkulosis untuk anda dan bayi anda.

Isoniazid dan *rifampicin* meresap dalam jumlah kecil ke dalam susu ibu. Tiada kesan buruk telah dilaporkan pada bayi yang diberi susu ibu yang ibunya menerima ubat ini. Walau bagaimanapun, kandungan ubat tidak mencukupi dalam susu ibu untuk merawat atau melindungi anak anda daripada tuberkulosis.

Bahan lain RHZ Kid DT

RHZ Kid DT mengandungi 3.13 mg aspartam dalam setiap tablet. Aspartam adalah sumber fenilalanin. Ia mungkin berbahaya jika anda menghidapi fenilketonuria (PKU), gangguan genetik yang jarang berlaku di mana fenilalanin terkumpul kerana badan tidak dapat mengeluarkannya dengan betul.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Adalah penting untuk anda memberitahu penyedia khidmat penjagaan kesihatan anak anda jika anak anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa prekripsi.

Bahan aktif dalam RHZ Kid DT boleh menjejaskan tindakan sejumlah besar ubat lain. Ubat-ubatan lain juga boleh menjejaskan tindakan RHZ Kid DT. Kesan sampingan mana-mana ubat mungkin menjadi lebih teruk, atau ubat-ubatan mungkin

RHZ Kid Dispersible Tablet (DT)

Rifampicin 75 mg, Isoniazid 50 mg and Pyrazinamide 150 mg Dispersible Tablets

menjadi kurang berkesan. Penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda mungkin perlu mengesyorkan ubat lain atau mungkin melaraskan dos anda atau menjalankan pemeriksaan tambahan.

Anda **tidak** boleh mengambil RHZ Kid DT dengan:

- **Voriconazole** (ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat).
- **Ubat jangkitan HIV:** *atazanavir, bicitegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide, darunavir, doravirine, elvitegravir/cobicistat, etravirine, fosamprenavir, lopinavir, nevirapine, rilpivirine, ritonavir, tipranavir*
- **Ubat hepatitis C kronik:** *daclatasvir, elbasvir/grazoprevir, glecaprevir/pibrentasvir, ledipasvir/sofosbuvir, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, sofosbuvir*
- **Ubat malaria:** *artemisinin dan derivatifnya (artemether, artemotil, artesunate, dihydroartemisinin)*

Seperti juga ubat-ubatan di atas, agen aktif dalam RHZ Kid DT juga boleh berinteraksi dengan sejumlah besar ubat lain. Akibatnya, penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda mungkin menukar dos ubat anda dan/atau memantau anda dengan lebih teliti untuk kesan sampingan. Ubat-ubatan yang mungkin berinteraksi dengan RHZ Kid DT termasuk:

- banyak ubat untuk **jangkitan HIV** (cth., *zidovudine, efavirenz, raltegravir, maraviroc*)
- ubat untuk merawat **jangkitan kulat** (cth., *ketoconazole, fluconazole, itraconazole*)
- **antibiotik** (cth., *chloramphenicol, clarithromycin, dapsone, doxycycline, ethionamide, para-aminosalicylic acid, trimethoprim*)
- ubat untuk merawat **malaria** (cth., *atovaquone, chloroquine, mefloquine, quinine, lumefantrine*)
- ubat untuk melegakan **kesakitan** (cth., *morphine, paracetamol, etoricoxib*)
- ubat untuk merawat sawan

- **epilepsi** (cth., *phenytoin, carbamazepine, valproate, lamotrigine, phenobarbital*)
- **ubat immunosupresan**, selalunya digunakan untuk mencegah penolakan (cth., *cyclosporin, tacrolimus*)
- ubat untuk merawat **penyakit jantung** (cth., *verapamil, digoxin*)
- ubat yang digunakan untuk menguruskan **tekanan darah**, termasuk ubat yang dipanggil *beta blockers* (cth., *atenolol*) dan *calcium-channel blockers* (cth., *amlodipine*)
- ubat untuk **pencegahan pembekuan darah** (cth., *warfarin*)
- ubat untuk **menurunkan kolesterol darah** (cth., *simvastatin, atorvastatin*)
- ubat untuk **mengawal asid perut atau ulser** (cth., *antacids* yang mengandungi *aluminium hydroxide, ranitidine*. Jika pengambilan *aluminium hydroxide* tidak dapat dielakkan, ambil RHZ Kid DT 1 jam sebelum *antacid* ini.
- ubat yang digunakan untuk **melegakan keimbangan atau membantu anda tidur** (cth., benzodiazepin seperti *diazepam, flurazepam, triazolam, midazolam; zolpidem, zopiclone*)
- ubat untuk **rawatan keadaan psikiatri tertentu** (*neuroleptics*, cth., *chlorpromazine, haloperidol, clozapine*, dan *antidepressants*, cth., *amitriptyline*)
- kortikosteroid (cth., *prednisolone*, ubat untuk rawatan keradangan dan penyakit lain, seperti asma atau rheumatoid arthritis)
- beberapa ubat untuk merawat **diabetes** (cth., *glibenclamide, gliclazide, repaglinide*)
- **pil perancang oral**. Kaedah kontraseptif tambahan adalah disyorkan.
- ubat yang digunakan dalam pembedahan (cth., *alfentanil, enflurane*)
- *codeine* (ubat untuk merawat batuk)
- *methadone* (ubat yang digunakan untuk menguruskan ketagihan dadah)
- *disulfiram* (ubat yang digunakan untuk rawatan alkoholisme kronik)

- *praziquantel* (ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan parasit tertentu)
- *typhoid vaccine* diambil melalui mulut

Mengambil mana-mana ubat ini bersama RHZ Kid DT mungkin tidak sesuai atau memerlukan pelarasan dos, jadi adalah sangat penting untuk anda memberitahu penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda tentang sebarang ubat lain yang mungkin anda ambil.

Alkohol harus dielakkan semasa mengambil RHZ Kid DT kerana ia meningkatkan risiko kerosakan hati. Makan keju atau ikan (makanan yang kaya dengan histamin atau tyramine) semasa dirawat dengan RHZ Kid DT boleh menyebabkan kegatalan dan kemerahan pada kulit, rasa panas, degupan jantung yang cepat atau berdebar-debar, berpeluh, menggigil atau rasa seram, sakit kepala dan pening. Keju dan ikan harus dielakkan jika kesan ini berlaku semasa mengambil RHZ Kid DT

Cara menggunakan RHZ Kid DT

Ikuti semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Mereka mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan.

- **Berapa banyak harus digunakan**
RHZ Kid DT hendaklah sentiasa diambil dengan tepat seperti yang diterangkan oleh penyedia khidmat penjagaan kesihatan. Anda harus menyemak dengan penyedia khidmat penjagaan kesihatan anak anda jika anda tidak pasti.

RHZ Kid DT biasanya diberikan untuk dua bulan pertama rawatan tuberkulosis. Penyedia khidmat penjagaan kesihatan anak anda akan memutuskan tempoh rawatan untuk anak anda. Dos biasa ditunjukkan dalam jadual di bawah:

RHZ Kid Dispersible Tablet (DT)

Rifampicin 75 mg, Isoniazid 50 mg and Pyrazinamide 150 mg Dispersible Tablets

Julat berat	Dos
4 to 7 kg	1 biji setiap hari
8 to 11 kg	2 biji setiap hari
12 to 15 kg	3 biji setiap hari
16 to 24 kg	4 biji setiap hari
25 kg atau keatas	Dos dewasa disyorkan

RHZ Kid DT tidak disyorkan untuk orang dewasa atau kanak-kanak yang mempunyai berat badan melebihi 25 kg.

Jika anak anda menghidap penyakit buah pinggang, doktor anda mungkin menetapkan *rifampicin*, *isoniazid* dan *pyrazinamide* secara berasingan dan bukannya dalam satu tablet.

RHZ Kid DT perlu diambil semasa perut kosong (sekurang-kurangnya satu jam sebelum atau dua jam selepas makan).

Larutkan tablet dalam air minuman sebelum mengambil dos. Setiap tablet hendaklah dilarutkan dalam 10 mL air.

Arahan untuk memberi tablet RHZ Kid DT

Lihat berat badan pesakit dalam jadual di atas.

1. Kemudian cari bilangan tablet yang akan diperlukan.
2. Letakkan isipadu air yang diperlukan dalam cawan atau mangkuk kecil yang bersih dan tambahkan bilangan tablet yang diperlukan.
3. Kacau perlahan-lahan sehingga tablet larut.
4. Berikan kanak-kanak keseluruhan campuran ubat dengan segera menggunakan picagari.
5. Bilas cawan dengan sedikit air tambahan dan beri anak minum untuk memastikan keseluruhan dos diambil.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Anak anda harus terus mengambil ubat itu selama yang diarahkan oleh penyedia khidmat penjagaan

kesihatan, walaupun berasa lebih baik. Jika ubat dihentikan terlalu awal, jangkitan mungkin tidak dapat sembuh sepenuhnya. Rawatan tidak boleh dihentikan melainkan penyedia khidmat penjagaan kesihatan berkata demikian.

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang penggunaan produk ini, tanya penyedia khidmat penjagaan kesihatan.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya masa untuk dos seterusnya kurang dari 6 jam, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa.

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Mengambil terlalu banyak RHZ Kid DT boleh menyebabkan muntah, gangguan gastrousus, demam, sakit kepala, pening, pertuturan yang tidak jelas, halusinasi dan gangguan penglihatan. Kulit mungkin berubah warna menjadi jingga kemerahan dan mungkin terdapat bengkak dan gatal-gatal di muka. Anda hendaklah segera menghubungi penyedia khidmat penjagaan kesihatan atau jabatan kecemasan hospital terdekat untuk mendapatkan nasihat lanjut.

Semasa menggunakan RHZ Kid DT

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil RHZ Kid DT.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan RHZ Kid DT kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian Memandu dan menggunakan jentera

RHZ Kid DT boleh menyebabkan pening, mengantuk atau menjejaskan penglihatan anda. Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan ini semasa mengambil RHZ Kid DT, jangan memandu dan jangan gunakan sebarang alat atau mesin yang berbahaya.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, RHZ Kid DT boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Adalah penting untuk anda memberitahu penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda tentang sebarang perubahan dalam kesihatan anda semasa rawatan. Jika anda mendapat mana-mana simptom tindak balas alahan yang teruk berikut, beritahu penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda dengan **segera** atau pergi ke jabatan kecemasan di hospital terdekat anda:

- Sukar bernafas, bercakap dan menelan secara tiba-tiba
- Bengkak pada bibir, lidah, muka atau leher
- Pening atau rebah yang melampau

Jika anda mendapat mana-mana kesan sampingan **berikut hubungi penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda secepat mungkin:**

- Keradangan pankreas, yang menyebabkan sakit teruk di bahagian perut (perut) dan belakang
- Kerosakan kulit yang teruk dengan melepuh atau mengelupas kulit
- Kulit atau bahagian putih mata menjadi kuning, atau air kencing

RHZ Kid Dispersible Tablet (DT)

Rifampicin 75 mg, Isoniazid 50 mg and Pyrazinamide 150 mg Dispersible Tablets

menjadi gelap dan najis menjadi pucat, letih, lemah, rasa tidak sihat secara amnya, hilang selera makan, sakit di bawah tulang rusuk anda, loya atau muntah yang disebabkan oleh masalah hati (hepatitis)	- demam, menggigil - peningkatan paras asid urik dalam darah (<i>hyperuricaemia</i>) - sakit sendi	- kekeliruan, perubahan rasa realiti - mencetuskan porfiri (keadaan metabolik) - gangguan haid - bilangan sel darah putih yang rendah - kiraan platelet darah rendah (<i>thrombocytopenia</i>), tompok ungu pada kulit seperti lebam (<i>purpura</i>) - keradangan atau bengkak konjunktiva atau mata merah jambu (konjunktivitis)
• Cirit-birit yang serius, berlarutan lama atau mempunyai darah dengan sakit perut atau demam: Ini boleh menjadi tanda jangkitan usus yang serius (<i>pseudomembranous colitis</i>) • Pendarahan yang tidak dapat dijelaskan, bintik ungu kecil atau lepuh darah pada kulit (<i>thrombocytopenic purpura</i>) • Gangguan penglihatan seperti penglihatan kabur, sakit mata, rabun warna merah-hijau atau kehilangan penglihatan • Kekurangan sel darah putih, disertai dengan demam tinggi secara tiba-tiba, sakit tekak yang teruk dan ulser di dalam mulut (<i>agranulocytosis</i>).	Kesan sampingan biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang): - perubahan warna kemerahan pada cecair badan seperti air kencing, kahak, air mata, air liur dan peluh - mengotorkan kanta sentuh - sakit perut, rasa kembung - hilang selera makan - rasa mual (loya) - muntah - tindak balas kulit dengan ruam dan/atau gatal-gatal - keletihan, mengantuk - sakit kepala - pening atau pening - kemerahan mata.	Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 000 orang): - <i>anaphylaxis</i> (tindak balas alahan yang teruk) - sindrom kekurangan vitamin yang dipanggil <i>pellagra</i> (cth. demensia (nyanyuk), cirit birit dan keradangan kulit) - radang paru-paru (<i>pneumonitis</i>)
Ini semua adalah kesan sampingan yang serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.	Kesan sampingan yang tidak biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang): - keradangan hati (hepatitis), jaundis (kulit atau mata menguning) - sawan epilepsi - radang otak - perubahan personaliti dan kesukaran mengingat - kerosakan pada saraf optik mengakibatkan kesan pada penglihatan, sakit mata.	Kesan sampingan yang tidak diketahui berapa kerap ia mungkin berlaku - gout - tindak balas alahan dengan demam, sakit otot, dan batuk - mengurangkan fungsi kelenjar adrenal - pecahan sel darah merah (hemolisis) - pembekuan darah kecil di seluruh badan (pembekuan intravaskular tersebar) - sakit tulang - pengsan, kejutan (kejatuhan curam dalam tekanan darah) - pengumpulan cecair di bawah kulit (edema) - darah tinggi - keradangan saluran darah (vaskulitis) - muka menjadi merah - pengumpulan asid dalam badan (asidosis metabolik), peningkatan paras glukosa dalam darah - mulut kering, kembung perut (gas), sembelit - sakit kencing - jerawat - <i>systemic lupus erythematosus</i>, antibodi terhadap tisu badan sendiri, arthritis, gangguan reumatik - pekak, tinnitus - vertigo
Kesan sampingan berikut boleh menjejaskan orang yang mengambil RHZ Kid DT: Kesan sampingan yang sangat biasa (mungkin menjejaskan lebih daripada 1 dalam 10 orang): - rasa kesemutan, tusukan, atau kebas pada kulit, terutamanya di kaki dan tangan (neuropati perifer). Penyedia penjagaan kesihatan anda mungkin menetapkan suplemen vitamin B6 (<i>pyridoxine</i>), untuk mengatasinya. - peningkatan enzim hati seperti yang diukur dalam sampel darah. Biasanya, peningkatan enzim hati berlaku semasa 1-3 bulan pertama terapi dan kembali normal walaupun rawatan diteruskan. Apabila nilai meningkat melebihi tahap tertentu, penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda mungkin memutuskan untuk menghentikan rawatan dengan RHZ Kid DT - panas kemerahan	Kesan sampingan yang jarang berlaku (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 1000 orang): - keradangan lapisan perut (gastritis) - keradangan pankreas - jangkitan usus (jangkitan usus, <i>pseudomembranous colitis</i>) - cirit birit - kegagalan hati - radang buah pinggang (<i>nephritis</i>) - sensitiviti kulit kepada cahaya (tindak balas fotosensitiviti) - tindak balas kulit yang teruk dengan ruam, demam dan kerosakan kulit atau melepuh (sindrom Steven-Johnson, nekrolisis epidermis toksik, dermatitis pengelupasan, pemfigoid) - kelemahan otot, sakit otot dan kehilangan koordinasi	

RHZ Kid Dispersible Tablet (DT)

Rifampicin 75 mg, Isoniazid 50 mg and Pyrazinamide 150 mg Dispersible Tablets

- mood meningkat
- gangguan tidur
- pembesaran payudara pada lelaki (*gynaecomastia*)
- penurunan jumlah sel darah merah (anemia), mungkin menyebabkan keletihan, kelemahan dan sesak nafas
- pendarahan
- penurunan berat badan

Pelaporan kesan sampingan

Jika anda mendapat kesan sampingan, berbincang dengan penyedia khidmat penjagaan kesihatan anda. Ini termasuk kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini. Anda juga mungkin boleh melaporkan kesan tersebut terus kepada sistem pelaporan nasional anda jika ada. Dengan melaporkan kesan sampingan, anda boleh membantu menambah baik maklumat yang tersedia mengenai ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan RHZ Kid DT

- Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C. Simpan di tempat yang kering.

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Lindungi daripada cahaya matahari.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet biconvex berwarna merah bata berbintik-bintik, bulat, tidak bersalut mempunyai skor dalam pada satu sisi dan permukaan biasa pada sisi lain.

Garis skor tidak bertujuan untuk memecahkan tablet.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Isoniazid
- Pyrazinamide
- Rifampicin

- Bahan tidak aktif

- Microcrystalline cellulose
- Crospovidone
- Povidone
- Bleached Shellac
- Croscarmellose Sodium
- Aspartame
- Strawberry Dry Mix
- Magnesium stearate.

Terdapat terlalu sedikit natrium dalam ubat ini untuk memberi sebarang kesan, walaupun anda sedang menjalani diet rendah natrium.

- Nombor MAL

MAL25056006ACZ

Pengilang:

OXALIS LABS

Village Theda, P.O. Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh, India

Pemegang Pendaftaran Produk:

Macleods Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

A2-27-1 Soho Suites KLCC, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

10/09/2025

Nombor siri:

NPRA (R1) 24/031