

RH Kid DT

(Rifampicin 75 mg and Isoniazid 50 mg dispersible Tablets)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan RH Kid DT
2. Bagaimana RH Kid DT berfungsi
3. Sebelum menggunakan RH Kid DT
4. Cara menggunakan RH KidDT
5. Semasa menggunakan RH KidDT
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan RH Kid DT
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

1. Apakah kegunaan RH Kid DT

RH kid DT ialah ubat yang digunakan untuk merawat tuberkulosis (TB), jangkitan yang disebabkan oleh bakteria yang dipanggil *Mycobacterium tuberculosis*.

RH kid DT juga digunakan untuk mencegah TB jika terdapat kemungkinan besar anda dijangkiti tuberkulosis.

RH kid DT mengandungi dua ubat tuberkulosis, *rifampicin* dan *isoniazid*. Ini adalah antibiotik yang berfungsi dengan cara yang berbeza untuk membunuh bakteria yang menyebabkan TB.

Walaupun ubat ini bertujuan untuk digunakan pada kanak-kanak, maklumat daripada penggunaannya pada orang dewasa juga disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesan ubat tersebut.

2. Bagaimana RH Kid DT berfungsi

RH Kid DT adalah gabungan dua bahan antimikobakteria, iaitu *rifampicin* dan *isoniazid*.

3. Sebelum menggunakan RH Kid DT

• alah (hipersensitif) kepada *isoniazid* atau *rifampicin*, atau mana-mana bahan lain dalam RH kid DT (lihat bahagian 6, Kandungan RH kid DT

• menghidap penyakit hati semasa, termasuk kekuningan pada kulit dan mata (jaundis) atau fungsi hati yang

berkurangan dengan teruk

• pernah mengalami masalah hati selepas mengambil *isoniazid* atau *rifampicin* sebelum ini

• pernah mengalami kesan sampingan yang teruk dengan *isoniazid* atau *rifampicin* sebelum ini yang termasuk demam, menggigil atau keradangan sendi

• sedang mengambil ubat-ubatan tertentu:

• voriconazole (ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat)

-Ubat HIV: *atazanavir*, *darunavir*, *doravirine*, *elvitegravir/cobicistat*, *etravirine*, *fosamprenavir*, *lopinavir*, *nevirapine*, *rilpivirine*, *ritonavir*, *tipranavir*

-chronic hepatitis C drugs: *daclatasvir*, *elbasvir/grazoprevir*, *glecaprevir/pibrentasvir*, *ledipasvir/sofosbuvir*, *ombitasvir/paritaprevir/ritonavir*, *sofosbuvir*

- *lurasidone* (ubat untuk masalah mental)

Semak dengan penjaga kesihatan anda jika anda tidak pasti sama ada ubat anda disertakan.

Bercakap dengan penjaga kesihatan anda jika anda fikir anda tidak boleh mengambil ubat ini.

Amaran dan langkah berjaga-jaga
Bercakap dengan penjaga kesihatan anda sebelum mengambil RH kid DT. Beritahu penjaga kesihatan anda sebelum memulakan ubat jika anda mempunyai:

- masalah hati seperti penyakit hati jangka panjang
- masalah buah pinggang
- diabetes
- epilepsi
- *prophyria*
- masalah mental (psikosis)
- Keradangan saraf periferi yang menyebabkan sensasi kesemutan

pada tangan atau kaki

- Jangkitan HIV
- Malnutrisi (kurang makan)
- diberitahu bahawa anda adalah 'slow acetylator' (badan anda menguraikan ubat-ubatan tertentu dengan lebih perlahan daripada biasa)

Beritahu juga penjaga kesihatan anda anda jika anda alah kepada ubat *ethionamide*, *pyrazinamide*, or *niacin* (*nicotinic acid*) – ini mungkin menjadikan anda lebih berkemungkinan juga alah kepada RH kid DT.

Jika mana-mana daripada ini terpakai, penjaga kesihatan anda akan membincangkan rawatan anda dengan anda, dan menjelaskan sama ada anda memerlukan pemeriksaan tambahan sekiranya anda mendapat kesan sampingan.

Semasa mengambil RH kid DT, penjaga kesihatan anda akan kerap memeriksa sebarang masalah dengan hati anda. Bercakap dengan penjaga kesihatan anda dengan segera jika anda mengalami simptom yang mungkin menunjukkan kerosakan hati, terutamanya jika anda:

- hilang selera makan, atau loya (rasa mual), atau sentiasa letih, atau anda mengalami ruam dan anda mengalami mana-mana yang berikut:
- sakit perut, biasanya di sebelah kanan dan berhampiran dada
- kegatalan yang tidak dapat dijelaskan
- warna kuning pada bahagian putih mata, kuku atau kulit anda
- membuang air kecil gelap
- membuang najis yang sangat pucat.

RH Kid DT

(Rifampicin 75 mg and Isoniazid 50 mg dispersible Tablets)

Anda mungkin berisiko lebih tinggi untuk masalah hati jika:

- anda berumur lebih daripada 35 tahun
- anda minum alkohol setiap hari (lihat “Mengambil RH kid DT dengan makanan dan minuman”)
- anda menghidap penyakit hati jangka panjang
- anda menggunakan dadah rekreasi melalui suntikan (cth. heroin).

Jika mana-mana daripada ini berkaitan dengan anda, penjaga kesihatan anda akan menguji masalah hati dengan lebih kerap. Jika masalah hati yang serius berlaku, penjaga kesihatan anda mungkin akan mengubah rawatan anda dan meminta anda berhenti mengambil RH kid DT.

Jika anda mengalami simptom selesema seperti demam, sakit kepala dan sakit otot, anda harus melaporkannya kepada penjaga kesihatan anda, kerana RH kid DT mungkin menjadi puncanya.

Reaksi kulit yang serius (selalunya dengan simptom lain seperti menggigil dan demam) mungkin berlaku pada sesetengah orang yang mengambil RH kid DT. Berhenti mengambil RH kid DT dan beritahu penjaga kesihatan anda anda dengan segera jika anda mempunyai mana-mana simptom berikut: ruam; kulit merah dan sakit; kulit melepuh, mengelupas atau berdarah; luka atau lepuh di bahagian dalam mulut atau bibir anda atau pada alat kelamin anda; muka, bibir, mulut, lidah atau tekak yang bengkak; simptom seperti selesema. Kesemutan, cucukan atau kebas pada tangan dan kaki (neuropati perifer) adalah kesan sampingan *isoniazid* yang paling biasa, salah satu

bahan aktif dalam RH kid DT (lihat “Kemungkinan kesan sampingan”). Jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati, anda mungkin berisiko lebih tinggi untuk mendapat

kesan sampingan *isoniazid* termasuk neuropati perifer. Anda juga lebih

cenderung untuk mendapat neuropati perifer jika anda kekurangan zat makanan, menghidap diabetes, bergantung kepada alkohol, menghidap jangkitan HIV, atau hamil atau menyusukan bayi. Penjaga kesihatan anda akan memeriksa anda secara berkala jika mana-mana ini terpakai. Bercakap dengan penjaga kesihatan anda dengan segera jika anda mengalami kesemutan pada tangan dan kaki anda.

Penjaga kesihatan anda mungkin mengesyorkan agar anda mengambil vitamin B6 (*pyridoxine*) jika anda lebih cenderung untuk menghidap neuropati perifer.

Beritahu penjaga kesihatan anda jika anda mengalami batuk dan sesak nafas yang baru atau semakin teruk selepas memulakan rawatan dengan RH kid DT atau jika simptom TB lain (cth. keletihan, sakit kepala, hilang selera makan, penurunan berat badan, atau kelemahan) kelihatan semakin teruk.

Jika anda mengambil kortison atau mana-mana ubat seperti kortison, anda harus melaporkan perkara ini kepada penjaga kesihatan anda, kerana dos kortison mungkin perlu ditingkatkan semasa mengambil RH kid DT.

RH kid DT boleh menyebabkan perubahan warna jingga kemerahan pada cecair badan seperti air kencing, kahak dan air mata. Ini disebabkan oleh *rifampicin*, dan tidak memerlukan rawatan perubatan. Selain itu, kanta lekap atau gigi palsu mungkin menjadi berwarna disebabkan oleh RH kid DT.

Beritahu penyedia penjagaan penjaga kesihatan anda tentang sebarang penyakit yang anda alami, walaupun anda fikir ia tidak berkaitan dengan jangkitan tuberkulosis atau ubat anda. Ubat-ubatan lain dan RH kid DT: Beritahu penjaga kesihatan anda jika

anda sedang mengambil atau baru-baru ini mengambil ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi. Ini mungkin menjejaskan tindakan RH kid DT, atau RH kid DT mungkin menjejaskan tindakannya. Kesan sampingan mana-mana ubat mungkin menjadi lebih teruk dan/atau ubat mungkin menjadi kurang berkesan.

Ubat yang anda tidak boleh ambil dengan RH kid DT
Anda tidak boleh mengambil RH kid DT dengan:

- ubat-ubatan tertentu (lihat senarai penuh ubat-ubatan ini di atas di bawah 'Jangan ambil RH kid DT jika anda').

Ini kerana RH kid DT mungkin mengurangkan jumlah ubat-ubatan ini dalam darah anda dengan ketara, menghalangnya daripada berfungsi dengan cukup baik.

Semak dengan penjaga kesihatan anda jika anda tidak pasti anda boleh mengambil ubat anda dengan ubat ini.

Ubat-ubatan lain yang boleh mengganggu RH kid DT

Anda harus mengelakkan penggunaan antasid (untuk pedih ulu hati atau senak) yang mengandungi aluminium hidroksida kerana ia boleh mengganggu keupayaan badan anda untuk mengambil ubat ini.

Bahan aktif dalam RH kid DT juga boleh mengganggu sebilangan besar ubat lain, termasuk contohnya:

-ubat lain untuk merawat jangkitan HIV (cth. *dolutegravir*, *maraviroc*, *raltegravir*.)

-ubat lain untuk merawat jangkitan kulat (cth. *ketoconazole*, *fluconazole*,

RH Kid DT

(Rifampicin 75 mg and Isoniazid 50 mg dispersible Tablets)

itraconazole)

-antibiotics (eg *clarithromycin*, *chloramphenicol*, *doxycycline*, *trimethoprim*)

- *ethionamide* (ubat TB lain)

-ubat untuk merawat malaria (cth. *amodiaquine*, *artemether*, *artesunate*, *dihydroartemisinin*, *lumefantrine*, *quinine*)

-ubat imunosupresan (cth. *cyclosporine*, *tacrolimus*)

-ubat untuk merawat keadaan jantung (cth. *verapamil*, *digoxin*, *clopidogrel*)

-ubat untuk merawat lipid darah (cth. *atorvastatin*, *simvastatin*)

-sesetengah ubat untuk merawat diabetes (cth. *glibenclamide*, *glimepiride*, *repaglinide*)

-pil kontraseptif oral

- *mifepristone* (ubat untuk pengguguran)

-ubat untuk merawat sawan epilepsi (cth. *phenytoin*, *carbamazepine*, *valproate*)

-ubat yang digunakan untuk membantu anda tidur (*benzodiazepines*, eg. *diazepam*, *flurazepam*, *nitrazepam*, *triazolam*, *midazolam*; also *zolpidem* or *zopiclone*)

-ubat untuk merawat keadaan psikiatri tertentu (*neuroleptics*, eg *chlorpromazine*, *haloperidol*; *antidepressants such as amitriptyline* or *nortriptyline*)

-ubat untuk mencegah pembekuan darah (*warfarin*)

-ubat yang digunakan dalam pembedahan (narkotik atau anestetik, contohnya *alfentanil*, *enflurane*)

- *corticosteroids* (contohnya *prednisolone*, ubat untuk merawat keradangan dan penyakit lain, seperti asma atau artritis reumatoid)

- *levothyroxine* untuk masalah tiroid

-ubat untuk merawat kesakitan (contohnya *morphine*, *paracetamol*)

- *codeine* (ubat untuk merawat batuk)

- *methadone* (ubat untuk ketagihan dadah)

- *disulfiram* (ubat yang digunakan untuk merawat alkoholisme kronik)

- *praziquantel* untuk jangkitan cacing.

Mengambil mana-mana ubat ini bersama-sama dengan RH kid DT mungkin tidak sesuai atau pembekal penjagaan kesihatan anda mungkin perlu mengubah dos anda.

RH Kid DT dengan makanan dan minuman

RH Kid DT harus diambil semasa perut kosong (sekurang-kurangnya 1 jam sebelum atau 2 jam selepas makan).

Anda tidak boleh minum alkohol semasa mengambil RH Kid DT. Ini meningkatkan risiko kerosakan hati. Apabila diambil dengan keju atau ikan (makanan kaya histamin atau tiramina) RH Kid DT boleh menyebabkan kemerahan/kegatalan pada kulit, rasa panas, pantas atau berdegup kencang degupan jantung, berpeluh, menggigil atau rasa lembap, sakit kepala, dan/atau pening. Jika anda mengalami kesan sampingan ini, anda harus mengelakkan makan keju dan ikan semasa mengambil ubat ini. Kehamilan, penyusuan susu ibu dan kontrasepsi

Ubat ini boleh digunakan semasa kehamilan. Walau bagaimanapun, anda mungkin perlu dipantau dengan teliti untuk kesan sampingan. Jika anda hamil, fikir anda mungkin hamil, atau sedang merancang kehamilan, beritahu penjaga kesihatan anda dengan segera, supaya anda boleh membincangkan rawatan anda.

Anda boleh menyusukan bayi semasa mengambil ubat ini. *isoniazid* dan *rifampicin* masuk ke dalam susu ibu tetapi hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Tiada kesan negatif yang dilaporkan pada bayi yang disusui badan yang ibunya menerima ubat ini. Walau bagaimanapun, jumlah dalam susu ibu sangat rendah sehingga anda tidak boleh bergantung pada penyusuan susu ibu untuk mencegah atau merawat tuberkulosis pada anak anda.

Sebagai langkah berjaga-jaga, penjaga kesihatan anda mungkin mengesyorkan agar anda mengambil vitamin B6 (*pyridoxine*) semasa anda hamil dan menyusukan bayi; bayi anda juga mungkin diberi vitamin B6. Oleh kerana *rifampicin* boleh mengganggu vitamin K, yang menjejaskan pembekuan darah, penyedia penjagaan kesihatan anda juga mungkin memberi anda atau bayi anda vitamin K tambahan sekitar masa bayi dilahirkan.

RH kid DT boleh mengurangkan kesan pil kontraseptif, implan atau suntikan. Sebagai langkah berjaga-jaga, jika anda memerlukan kontrasepsi, anda harus menggunakan kaedah yang berbeza atau tambahan (kondom, alat intrauterin, pesari) semasa rawatan dengan RH kid DT.

Memandu dan menggunakan mesin RH kid DT tidak mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan mesin. Walau bagaimanapun, pastikan anda berasa cukup sihat untuk melakukan sebarang tugas mahir.

Bahan-bahan lain dalam RH kid DT Ubat ini mengandungi aspartam. Aspartam adalah sumber *phenylalanine*. Ia mungkin berbahaya jika anda menghidap *phenylketonuria* (PKU), gangguan genetik yang jarang berlaku di

RH Kid DT

(Rifampicin 75 mg and Isoniazid 50 mg dispersible Tablets)

mana *phenylalanine* terkumpul kerana badan tidak dapat membuangnya dengan betul.

4. Cara menggunakan RH Kid DT:

penjaga kesihatan anda akan menentukan dos dan kombinasi ubat yang betul untuk TB anda, berdasarkan umur, berat badan dan keadaan anda.

Sentiasa ambil RH kid DT seperti yang diberitahu oleh penjaga kesihatan anda. Semak dengan penjaga kesihatan anda jika anda tidak pasti.

Jangan ubah dos melainkan penjaga kesihatan anda memberitahu anda. Rawatan anda akan berterusan selama beberapa bulan, tetapi adalah penting untuk mengambil rawatan penuh yang disyorkan oleh penjaga kesihatan anda, walaupun anda berasa lebih baik.

Bancuh tablet dengan air minuman sebelum mengambil dos. Lihat "Arahan untuk mengambil tablet RH kid DT", di bawah. Untuk maklumat tentang cara mengambil ubat lain yang anda

perlukan untuk rawatan TB anda, bincangkan dengan penjaga kesihatan anda dan lihat risalah yang disertakan dengan ubat-ubatan tersebut juga.

Rawatan tuberkulosis
Untuk merawat TB, anda perlu mengambil kombinasi ubat untuk 2 bulan pertama rawatan. Selepas itu, anda akan mengambil RH kid DT sendiri selama 2 atau 4 bulan lagi. penjaga kesihatan anda akan menerangkan berapa lama anda perlu mengambil ubat ini, dan ubat-ubatan lain yang anda perlukan.

Dos RH kid DT yang diperlukan untuk merawat TB bergantung pada berat badan, seperti berikut:

Berat Kanak-Kanak	Dos
4-8 kg	1 tablet
8-12 kg	2 tablet
12-16 kg	3 tablet
16-25 kg	4 tablet

Kanak-kanak yang beratnya 25 kg atau lebih akan ditukar kepada ubat lain, untuk memastikan mereka mendapat dos bahan aktif *isoniazid* dan *rifampicin* yang betul.

Pencegahan tuberkulosis
Untuk mencegah TB, RH kid DT diambil sekali sehari secara berasingan, selama 3 bulan. Dosnya sama seperti untuk rawatan di atas.

Arahan untuk mengambil tablet RH kid DT

Ambil tablet semasa perut kosong (sekurang-kurangnya 1 jam sebelum atau 2 jam selepas makan). Cuba ambil RH kid DT pada masa yang sama setiap hari.

Masukkan setiap tablet ke dalam 10 mL air minuman (kira-kira 2 sudu teh); isipadu maksimum air untuk menyediakan dos ialah 50 mL. penjaga kesihatan anda akan menerangkan berapa banyak tablet yang perlu digunakan untuk setiap dos. Bilangan tablet biasa setiap dos untuk kanak-kanak yang mempunyai berat badan berbeza diberikan dalam jadual di atas, tetapi sentiasa gunakan bilangan tablet yang disyorkan oleh pembekal penjagaan kesihatan anda.

1. Letakkan jumlah air minuman yang diperlukan dalam cawan atau mangkuk kecil yang bersih dan tambahkan bilangan tablet yang diperlukan.
2. Kacau perlahan-lahan sehingga tablet hancur sepenuhnya dan sebati sepenuhnya dengan air.
3. Minum semua campuran dengan segera.
4. Bilas cawan dengan sedikit lagi air minuman (kira-kira 10 mL) dan minum untuk memastikan anda telah mengambil dos penuh.

Jika anda mengambil lebih banyak RH kid DT daripada yang sepatutnya

Jika anda secara tidak sengaja mengambil terlalu banyak RH kid DT, hubungi penjaga kesihatan anda atau jabatan kecemasan terdekat untuk mendapatkan nasihat. Bawa ubat anda bersama anda supaya anda boleh menerangkan dengan mudah apa yang telah anda ambil.

Jika anda terlupa mengambil RH kid DT

Adalah penting untuk tidak terlepas dos RH kid DT. Jika anda terlepas atau terlupa mengambil dos, dos yang terlepas hendaklah diambil secepat mungkin, melainkan kurang daripada 6 jam sehingga dos anda yang seterusnya, yang mana langkah dos yang terlepas dan hanya ambil dos biasa yang seterusnya.

Jika anda muntah kurang daripada 1 jam selepas mengambil ubat ini, ambil dos yang lain. Anda tidak perlu mengambil dos lain jika anda sakit lebih daripada 1 jam selepas mengambil RH kid DT

Jika anda berhenti mengambil RH kid DT

Jangan berhenti mengambil RH kid DT tanpa berbincang dengan penjaga kesihatan anda. Bercakap dengan penjaga kesihatan anda sebelum anda berhenti mengambil RH kid DT atas apa jua sebab, terutamanya jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau mempunyai penyakit lain.

Jika anda telah menghentikan rawatan anda dengan RH kid DT atas apa jua sebab, berbincang dengan penjaga kesihatan anda sebelum anda mula mengambil RH kid DT sekali lagi.

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang penggunaan ubat ini, tanya penjaga kesihatan anda.

RH Kid DT

(Rifampicin 75 mg and Isoniazid 50 mg dispersible Tablets)

5. Semasa menggunakan RH Kid DT:

- Perkara yang mesti anda lakukan

- RH kid DT harus diambil seperti yang diarahkan oleh penjaga kesihatan anda.

- Bincangkan tentang ubat-ubatan lain yang anda sedang ambil atau rancang untuk ambil. Sertakan ubat-ubatan yang boleh anda dapatkan tanpa preskripsi.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh anda lakukan

- Jangan ambil RH kid DT jika anda hipersensitif (alah) kepada RH kid DT atau mana-mana ramuannya.
- Jangan berikan RH kid DT kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian: Kehamilan dan penyusuan susu ibu: Ubat ini boleh digunakan semasa kehamilan. Walau bagaimanapun, anda mungkin perlu dipantau dengan teliti untuk kesan sampingan. Jika anda hamil, fikir anda mungkin hamil, atau merancang kehamilan, beritahu penjaga kesihatan anda dengan segera, supaya anda boleh membincangkan rawatan anda.

Anda boleh menyusukan bayi semasa mengambil ubat ini. *isoniazid* dan *rifampicin* masuk ke dalam susu ibu tetapi hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Tiada kesan negatif yang dilaporkan pada bayi yang disusui badan yang ibunya menerima ubat ini. Walau bagaimanapun, jumlah dalam susu ibu adalah sangat rendah sehingga anda tidak boleh bergantung pada penyusuan susu ibu untuk mencegah atau merawat tuberkulosis pada anak anda.

Sebagai langkah berjaga-jaga, penyedia penjagaan kesihatan anda mungkin mengesyorkan agar anda mengambil vitamin B6 (*pyridoxine*) semasa anda hamil dan menyusukan bayi; bayi anda juga mungkin diberi vitamin B6. Oleh kerana *rifampicin* boleh mengganggu vitamin K, yang mempengaruhi

pembekuan darah, penjaga kesihatan anda juga mungkin memberi anda atau bayi anda vitamin K tambahan sekitar masa bayi dilahirkan.

RH kid DT boleh mengurangkan kesan pil kontraseptif, implan atau suntikan. Sebagai langkah berjaga-jaga, jika anda memerlukan kontrasepsi, anda harus menggunakan kaedah yang berbeza atau tambahan (kondom, alat intra-rahim, pesari) semasa rawatan dengan RH kid DT.

Memandu dan menggunakan mesin: RH kid DT tidak mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan mesin.

Walaupun bagaimanapun, pastikan anda berasa cukup sihat untuk melakukan sebarang tugas mahir.

RH kid DT mengandungi natrium Terdapat terlalu sedikit natrium dalam ubat ini untuk memberi sebarang kesan, walaupun anda sedang menjalani diet rendah natrium.

6. Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, RH kid DT boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Semasa merawat tuberkulosis, tidak selalunya mungkin untuk membezakan antara kesan yang tidak diingini yang disebabkan oleh RH kid DT, dan kesan yang disebabkan oleh ubat lain yang mungkin anda ambil pada masa yang sama. Atas sebab ini, adalah penting untuk anda memaklumkan kepada penjaga kesihatan anda tentang sebarang perubahan dalam kesihatan anda.

Kesan buruk *isoniazid* dan *rifampicin* yang paling penting ialah kecederaan saraf (lihat di bawah) dan keradangan hati yang teruk dan kadangkala membawa maut (hepatitis) yang kadangkala boleh menjadi teruk atau membawa maut.

Beritahu penjaga kesihatan anda dengan segera jika anda mendapat tanda-tanda masalah hati (lihat Amaran dan Langkah Berjaga-jaga,

dalam bahagian 2, di atas). Kesan sampingan penting lain yang perlu anda beritahu penjaga kesihatan anda dengan segera ialah reaksi kulit yang teruk dan sesak nafas yang baru atau semakin teruk.

Kesan sampingan berikut telah dilaporkan pada pesakit yang dirawat dengan RH kid DT: Kesan sampingan yang sangat biasa

(mungkin menjejaskan lebih daripada 1 dalam 10 orang):

-demam dan menggigil Kesan sampingan biasa

(mungkin menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang):

-tahap platelet darah yang rendah (diperlukan untuk darah membeku secara normal), kadangkala dengan bintik-bintik kecil berwarna ungu pada kulit

-sakit kepala, pening

-rasa loya (muntah)

-muntah

- Gejala TB menjadi lebih teruk yang sebelum ini semakin baik

-peningkatan enzim hati atau bilirubin seperti yang diukur dalam ujian darah. Biasanya, peningkatan enzim hati berlaku semasa 1-3 bulan pertama terapi dan kembali normal walaupun rawatan berterusan.

Apabila nilai meningkat melebihi tahap tertentu, penjaga kesihatan anda mungkin memutuskan untuk menghentikan rawatan dengan RH kid DT.

Kesan sampingan yang tidak biasa (mungkin menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang)

-tahap sel darah putih yang rendah dalam ujian darah (leukopenia)

-sawan

RH Kid DT

(Rifampicin 75 mg and Isoniazid 50 mg dispersible Tablets)

-masalah otak yang menyebabkan kekeliruan atau kesedaran yang berkurangan (ensefalopati toksik)	-gula darah tinggi (<i>hyperglycemia</i>)	kelamin
-keradangan atau kerosakan pada saraf optik	-sindrom kekurangan vitamin yang dipanggil pellagra (contohnya demensia, najis longgar dan keradangan kulit)	-gatal-gatal atau ruam gatal, ruam jelatang (urtikaria)
-masalah ingatan	-sensasi kesemutan, cucukan, atau kebas pada kulit, terutamanya pada kaki dan tangan (neuropati perifer). Pembekal penjagaan kesihatan anda mungkin mengesyorkan anda mengambil vitamin B6 (<i>pyridoxine</i>) untuk mengurangkan risiko (lihat di atas, "Amaran dan Langkah Berjaga-jaga").	-jerawat
-psikosis (pemikiran yang tidak normal, kadangkala dengan khayalan atau halusinasi)		-keguguran rambut
-pening		-kelemahan atau kesakitan otot
-peningkatan sawan pada penghidap epilepsi		-sakit tulang
-pendarahan di otak (pendarahan serebrum)		-keadaan reumatik dengan ruam, masalah buah pinggang (sindrom seperti lupus)
-cirit-birit		-buah pinggang kerosakan
-keradangan hati (hepatitis), yang boleh menjadi teruk.		-pendarahan berlebihan selepas kelahiran bayi
Kesan sampingan yang tidak diketahui berapa kerap ia boleh berlaku	-masalah dengan berjalan dan keseimbangan (kemungkinan tanda-tanda masalah otak yang dipanggil sindrom serebelum); Ini lebih berkemungkinan jika anda sudah menghidap penyakit buah pinggang	-gangguan haid
-jangkitan usus yang menyebabkan kesakitan dan cirit-birit yang teruk (kolitis pseudomembran)		- <i>porphyria</i> (keadaan di mana badan tidak dapat menguraikan bahan kimia tertentu yang dipanggil <i>porphyrin</i>)
-selesema	-kejutan (kehilangan aliran darah ke organ anda)	-bengkak kaki atau buku lali (<i>edema</i>)
-pembentukan gumpalan kecil dalam saluran darah, yang boleh menjejaskan peredaran dan menyebabkan kerosakan pada buah pinggang (<i>thrombotic microangiopathy, thrombocytopenic purpura, hemolytic-uremic syndrome</i>)	-pembilasan	-tekanan darah rendah.
-perubahan dalam kiraan sel darah putih (eosinofilia, agranulositosis), mungkin mengakibatkan peningkatan risiko jangkitan	-keradangan saluran darah (vaskulitis)	
-anemia (kiraan sel darah merah yang rendah), kadangkala dengan pemecahan sel darah merah (anemia hemolitik) atau masalah dengan sumsum tulang (anemia aplastik)	-pendarahan yang tidak dijangka	Pelaporan kesan sampingan Melaporkan kesan sampingan Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumer → Reporting → Reporting Side Effects to Medicine (ConSERF) or Vaccines (AEFI))
-masalah dengan pembekuan darah	-sesak nafas, mengi	
-kelenjar limfa bengkak (<i>lymphadenopathy</i>)	-perubahan warna kemerahan cecair badan seperti air kencing, kahak, air mata, air liur dan peluh, pewarnaan kanta lekap lembut, gigi palsu atau gigi	7.Cara penyimpanan dan pelupusan RH Kid DT -Penyimpanan
-reaksi alahan (anafilaksis) yang mengancam nyawa dengan kesukaran bernafas dan tekanan darah rendah	-keradangan paru-paru (pneumonitis)	<ul style="list-style-type: none"> • Jauhi ubat daripada kanak-kanak. • Simpan dibawah suhu 30°C
-masalah dengan kelenjar adrenal	-sakit perut atau ketidakselesaan	-Pelupusan
-pembesaran payudara pada lelaki (ginekomastia)	-sembelit	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan buang sebarang ubat melalui air buangan atau sisa isi rumah. • Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul
-selera makan berkurangan	-mulut kering	
	-keradangan pankreas (biasanya dengan sakit teruk di bahagian belakang atau perut)	
	-reaksi kulit yang teruk dengan demam dan simptom seperti selesema, lepuh atau pustula, atau penglibatan membran mukus mulut atau alat	

RH Kid DT

(Rifampicin 75 mg and Isoniazid 50 mg dispersible Tablets)

untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

- Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

8.Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet biconvex berwarna merah bata berbintik-bintik, bulat, tidak bersalut mempunyai skor dalam pada satu sisi dan permukaan biasapada sisi lain.

RH Kid DT boleh didapati dalam pek:

Pek jalur Alu/Alu 28 Tablet

Terdapat dalam saiz pek 3 x 28`s Tablet

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:

Isoniazid & Rifampicin.

-Bahan tidak aktif: Microcrystalline cellulose, Crospovidone, Povidone, Bleached Shellac, Isopropyl Alcohol, Croscarmellose Sodium, Aspartame, Trusil Raspberry ASV flavor dan Magnesium stearate.

-**MAL No:** MALXXXXXXXXXX

9.Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

Pengilang:

OXALIS LABS

Village Theda, P.O Lodhimajra, Baddi,
Distt. Solan, Himachal Pradesh,
174101, India

Office address: 304 - Atlanta

Arcade, Marol Church Road, Andheri
(E), Mumbai - 400 059.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Macleods Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

A2-27-1 Soho Suites KLCC, Jalan
Perak, 50450 Kuala Lumpur,
Malaysia.

10.Tarikh kemaskini

22/05/2026

11.Nombor siri:

NPRA (R1) 26/004