

GAVELOX ANTACID TABLET (DOUBLE STRENGTH)

Dried aluminium hydroxide / magnesium hydroxide / simethicone (400mg / 400mg / 40mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan GaVelox Antacid Tablet
2. Bagaimana GaVelox Antacid Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil GaVelox Antacid Tablet
4. Cara mengambil GaVelox Antacid Tablet
5. Semasa mengambil GaVelox Antacid Tablet
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan GaVelox Antacid Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan GaVelox Antacid Tablet

GaVelox Antacid digunakan untuk melegakan kesakitan dan ketidakselesaan pedih ulu hati, senak dan refluks asid. Ia juga membantu melegakan keadaan usus dan perut yang disebabkan oleh gas berlebihan.

Bagaimana GaVelox Antacid Tablet berfungsi

GaVelox Antacid Tablet bertindak balas dengan pantas untuk mengurangkan keasidan gastrik dengan meneutralkan asid gastrik yang dirembes. Ia juga membolehkan gelembung gas yang dikelilingi lendir dalam saluran usus bergabung dan dikeluarkan.

Sebelum mengambil GaVelox Antacid Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil produk ini jika anda alergi (hipersensitiviti) terhadap aluminium hydroxide, magnesium hydroxide or simethicone. Jangan mengambil jika anda mempunyai masalah buah pinggang.

- Sebelum mula mengambil

Produk ini tidak sesuai untuk orang yang mengalami *phenylketonuria*. Produk ini harus diberi dengan perhatian kepada mereka yang kelemahan buah pinggang.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Produk ini mungkin mengganggu atau mengurangkan penyerapan agen antikolinergik, barbiturat, digosin, quinidin, warfarin dan vitamin.

Cara mengambil GaVelox Antacid Tablet

- Berapa banyak harus diambil

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun:

Kunyah 1 hingga 2 tablet 4 kali sehari. Kunyahkannya sebelum menelan.

- Berapa lama perlu diambil

Ambil sebolehnya ½ jam sebelum makan atau 2 jam selepas makan dan sebelum tidur atau mengikut arahan doktor.

- Berapa lama perlu diambil

Sila mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa ambil GaVelox Antacid Tablet, ambilkannya apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Gejala jika terlebih dos mungkin termasuk kerengsaan gastrousus, cirit-birit dan sembelit. Keracunan yang teruk boleh menyebabkan hipermagnesemia (terlalu banyak magnesium dalam darah).

Anda harus memberitahu doktor anda sekaligus atau hubungi jabatan kemalangan dan kecemasan terdekat jika anda mengambil terlalu banyak GaVelox Antacid Tablet secara tidak sengaja

Semasa mengambil GaVelox Antacid Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Periksa dengan doktor anda jika simptom berlarutan atau bertambah teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Produk ini harus diberi dengan perhatian kepada mereka yang kelemahan buah pinggang.

Kesan-kesan Sampingan

Kadang-kala antasid boleh menyebabkan masalah sembelit, cirit-birit, rasa mual dan muntah.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Consumer Reporting of Side Effects to Medicines or Vaccines].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan GaVelox Antacid Tablet

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya dan kelembapan.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet kunyah berwarna putih, bulat dan rata dengan rasa pudina. Sumber laktosa adalah lembu.

- Bahan-bahan

- Bahan-bahan aktif

Dried aluminium hydroxide 400mg, magnesium hydroxide 400mg, simethicone 40mg.

- Bahan-bahan tidak aktif

Povidone K30, lactose hydrous, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, colloidal silicon dioxide, copovidone, precipitated silicon dioxide, aspartame, peppermint oil, aniseed oil, tutti frutti flavour, magnesium stearate.

- Nombor pendaftaran MAL:

MAL00000000XC

Pengilang

Winwa Medical Sdn. Bhd.

1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3, Taman I.K.S. Bukit Minyak, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia.

GAVELOX ANTACID TABLET (DOUBLE STRENGTH)

Dried aluminium hydroxide / magnesium hydroxide / simethicone (400mg / 400mg / 40mg)

Pemegang Pendaftaran Produk

AETOS PHARMA SDN. BHD.
No.66B, Tingkat 2, Jalan Cerdas,
Taman Connaught, 56000 Kuala
Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

26/06/2024

Nombor Siri:

NPRA (R2) 24/059