

HEMAVEIN FILM-COATED TABLET 500MG

Diosmin/Hesperidin (450 mg/50 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg
2. Bagaimana Hemavein Film-Coated Tablet 500mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg
4. Cara menggunakan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg
5. Semasa menggunakan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg

Digunakan untuk merawat gejala dan tanda-tanda penyakit vena kronik (kaki bengkak, kekejangan pada waktu awal pagi) dan rawatan untuk penyakit hemorroidal kronik.

Bagaimana Hemavein Film-Coated Tablet 500mg berfungsi

Ubat ini menguatkan urat dengan meningkatkan nada vena, dan melindungi saluran darah kecil.

Sebelum menggunakan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

Anda alah (hipersensitif) kepada *Micronized purified flavonoid fraction* atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam tablet.

Jangan gunakan pada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun melainkan jika dinasihatkan oleh doktor anda.

- Sebelum menggunakan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak: Sekiranya anda hamil, merancang untuk mengandung, atau menyusui, minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, baru mengambil atau mungkin mengambil ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg

Sentiasa ambil Hemavein Film-Coated Tablet 500mg sama seperti yang telah diberitahu oleh doktor atau penjaga kesihatan anda.

Anda perlu menyemak dengan doktor, penjaga kesihatan atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Berapa banyak harus digunakan Penyakit vena kronik

2 tablet sehari dalam dua dos dibahagikan, tengah hari dan petang pada waktu makan.

Serangan hemorroidal akut

6 tablet sehari (dibahagikan dalam 3 dos) untuk 4 hari pertama, kemudian 4 tablet sehari (dibahagikan dalam 2 dos) untuk 3 hari seterusnya.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Terus mengambil Hemavein Film-Coated Tablet 500mg seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Jangan mengambil dos berganda untuk mengganti dos yang terlupa ambil.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai penggunaan produk ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda terlebih ambil Hemavein Film-Coated Tablet 500mg daripada yang sepatutnya, hubungi doktor atau ahli farmasi anda segera.

Gejala yang mungkin dialami dengan dos berlebihan Hemavein Film-Coated

Tablet 500mg termasuk cirit-birit, mual, sakit perut, gatal-gatal dan ruam.

Semasa menggunakan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Hemavein Film-Coated Tablet 500mg.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini dipreskripsikan untuk anda. Jangan memberikan kepada orang lain. Ia boleh membahayakan mereka, walaupun gejala mereka sama seperti yang anda alami.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Cirit-birit, dispepsia (pencernaan sukar), loya, muntah, kolitis (radang pada usus besar), pening, sakit kepala, rasa tidak selesa, ruam, pruritus dan urticaria (reaksi alergi pada bentuk bintik merah kecil), sakit perut, edema terencil (bengkak muka, bibir dan kelopak mata), edema Quincke (bengkak muka, bibir, mulut, lidah atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web <http://npra.gov.my> [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hemavein Film-Coated Tablet 500mg

- Penyimpanan

Tarikh luput pek ini dicetak pada kotak.
Jangan gunakan pek ini selepas tarikh ini.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan simpan melebihi 30°C.

66B, Tingkat 2, Jalan Cerdas, Taman
Connaught, 56000 Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

19 June 2025

- Pelupusan

Ubat ini tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau sisa rumah. Tanyalah ahli farmasi bagaimana melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Nombor Siri

NPRA (R2) 25/083

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Hemavein Film-Coated Tablet 500mg berwarna kuning coklat, tablet bersalut filem berbentuk bujur, dwicembung dan plain di kedua-dua sisi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap tablet bersalut filem

mengandungi:

Micronized purified flavonoid

fraction:

Diosmin 450 mg

Flavonoid expressed as hesperidin
50 mg

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, magnesium stearate, gelatin, hypromellose, macrogol 6000, talc, titanium dioxide, sodium lauryl sulfate, yellow iron oxide, red iron oxide, glycerine

- Nombor MAL

MAL25086043X

Pengilang

Stellapharm J.V. Co., Ltd.- Branch 1

(A Joint Venture Company of Auxilto GmbH, Germany)

No. 40 Tu Do Avenue, Vietnam-Singapore Industrial Park, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam.

Pemegang Pendaftaran Produk

Aetos Pharma Sdn Bhd