

DissoNac Effervescent Tablet 200mg

DissoNac Effervescent Tablet 600mg

Acetylcysteine (200mg and 600mg)

Apa yang terdapat dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan DissoNac
2. Bagaimana DissoNac berfungsi
3. Sebelum menggunakan DissoNac
4. Cara menggunakan DissoNac
5. Semasa menggunakan DissoNac
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan DissoNac
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang and Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan DissoNac

Semua penyakit saluran pernafasan yang membawa kepada pembentukan rembesan tebal sukar dikeluarkan, seperti bronkitis akut dan kronik, laringitis, sinusitis, tracheitis, influenza, asma bronkial dan (sebagai rawatan pelengkap) mukoviscidosis.

Bagaimana DissoNac berfungsi

Acetylcysteine tergolong dalam kumpulan ubat yang disebut mucolytics yang berfungsi melarutkan kahak sehingga ia boleh dibatuk keluar dengan lebih senang.

Sebelum menggunakan DissoNac

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan tablet DissoNac effervescent:

- Jika anda alah kepada acetylcysteine atau mana-mana bahan lain ubat ini.
- Sekiranya anda mewarisi gangguanyang menyebabkan pembentukan asid amino yang dipanggil phenylalanine di dalam badan anda atau anda alah kepada aspartam (pemanis tiruan).
- Pada kanak-kanak di bawah umur 2tahun.

- Sebelum menggunakannya

Jika mana-mana keadaan yang disebut di bawah berlaku kepada anda, anda

harus memberitahu doktor sebelum mengambil ubat ini:

- Sekiranya anda mengalami asma bronkial.
- Sekiranya anda mempunyai atau mempunyai ulser peptik.
- Sekiranya anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.
- Sekiranya anda hamil atau menyusui bayi.

Berhati-hati jika anda perlu mengawal pengambilan garam terkawal (rendah sodium / rendah garam) diet.

Bau belerang ringan (bau telur busuk) semasa membuka bungkus tidak menunjukkan kemerosotan produk tetapi disebabkan bahan aktif.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Sekiranya anda menggunakan ubat-ubatan lain, jangan melarutkan bersama dengan tablet DissoNac effervescent.
- Jika anda perlu menggunakan ubat-ubatan untuk mengawal atau mencegah jangkitan (antibiotik), anda dinasihatkan untuk mengambil dua jam sebelum atau selepas tablet DissoNac effervescent.
- Ubat batuk tidak boleh digunakan pada masa yang sama seperti tablet DissoNac tablet, kerana anda mesti dapat batuk kahak yang longgar.
- DissoNac tablet effervescent boleh meningkatkan kesan penurunan tekanan darah *nitroglycerin* (ubat yang digunakan untuk sakit yang sengit di dada (*angina pectoris*)).
- Sekiranya anda menggunakan *activated charcoal* (ubat terhadap cirit-birit), ia boleh mengurangkan kesan tablet DissoNac effervescent. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil atau baru mengambil sebarang ubat lain selain dari tablet DissoNac, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

Cara menggunakan DissoNac

-Berapa banyak harus digunakan

200mg:

Kanak-kanak berumur 2 tahun keatas: 100-200mg, 2 kali sehari
Dewasa: 200mg, 3 kali sehari

600mg:

Dewasa: 600mg, sekali sehari
Larutkan tablet effervescent dalam setengah segelas air, elakkan penambahan ubat lain dalam larutan. Minum dengan segera.

-Bila perlu digunakan

Pesakit yang mengalami kesukaran batuk (pesakit tua dan lemah), dinasihat supaya mengambil tablet effervescent pada waktu pagi.

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ahli farmasi.

-Berapa lama perlu diambil

Sentiasa gunakan ubat ini dengan tepat seperti yang ditetapkan. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Jangan gunakan ubat ini lebih daripada 14 hari tanpa berunding dengan doktor.

-Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa mengambil dos dan hampir masanya untuk dos seterusnya, jangan ambil dos 'dilupakan', tetapi teruskan jadual yang diberikan di bawah "Cara menggunakan tablet DissoNac". Jangan mengambil dos berganda untuk mengganti dos yang terlupa ambil.

-Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Gejala yang mungkin berlaku ialah: loya, muntah dan cirit-birit.

DissoNac Effervescent Tablet 200mg

DissoNac Effervescent Tablet 600mg

Acetylcysteine (200mg and 600mg)

Hubungi doktor andasegera atau pergi ke jabatan kecemasan terdekat jika anda atau orang lain mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini walaupun anda tidak mengalami tanda-tanda ketidakelesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera. Bawa pek dengan sebarang baki tablet dengan anda.

Semasa menggunakan DissoNac

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil terlalu banyak tablet.
- Jangan hentikan rawatan lebih awal daripada yang dirancang. Hubungi doktor atau ahli farmasi anda sebelum berhenti.
- Jangan mengambil apa-apa ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.
- Jangan berikan DissoNac effervescent tablet kepada orang lain walaupun dia mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti anda.

-Perkara yang perlu diambil perhatian

- Sekiranya anda mengalami asma bronkial maka anda tidak boleh mengambil ubat ini.
- Sekiranya anda mempunyai atau mempunyai ulser peptik, seperti tablet DissoNac yang boleh merengsakan dinding perut anda.

Khususnya, jika anda menggunakan ubat-ubatan lain yang dikenali untuk merengsa dinding gastrik.

- Sangat jarang laporan reaksi hipersensitiviti yang serius dengan demam (tinggi), kemerahan kulit, sakit sendi dan / atau jangkitan mata (sindrom Stevens-Johnson), dan

tindak balas hipersensitiviti akut disertai oleh demam dan lepuh pada kulit atau mengelupas kulit (*Lyell syndrome*) yang dikaitkan dengan penggunaan tablet DissoNac effervescent. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kes, sekurang-kurangnya satu ubat lain telah digunakan, yang kemungkinan besar menyebabkan reaksi ini.

- Sekiranya perubahan baru pada kulit atau membran mukus berlaku, anda mesti berjumpa doktor dengan segera dan berhenti menggunakan acetylcysteine. Oleh kerana kahak tebal menjadi lebih cair, jumlahnya akan bertambah, terutamanya pada permulaan rawatan. Sekiranya anda tidak dapat cekap batuk cair ini, anda mesti berunding dengan doktor supaya langkah-langkah yang mencukupi dapat diambil untuk mengeluarkan kahak.
- Ubat-ubatan, seperti DissoNac yang membubarkan kahak (mucolytics) boleh menyekat saluran pernafasan kanak-kanak di bawah umur 2 tahun, disebabkan oleh ciri-ciri saluran pernafasan dalam kumpulan umur ini. Ini mungkin menghadkan keupayaan mereka untuk batuk kahak. Oleh itu, DissoNac tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.
- DissoNac tablet effervescent tidak sesuai untuk digunakan pada kanak-kanak dan remaja lebih mudadari 18 tahun.
- Apabila membuka bungkusan, anda mungkin bau belerang ringan (bau telur busuk). Ini adalah harta bahan aktif dan biasa. Ia tidak menunjukkan bahawa ubat telah berubah.
- DissoNac tablet berisi natrium. Perhatian pada pesakit pada diet natrium yang terhad. Rujuk doktor anda jika mana-mana amaran di atas digunakan untuk anda, atau telah memohon kepada anda pada masa lalu.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku

Sekiranya ada kesan sampingan berikut berlaku, berhenti menggunakan tablet DissoNac effervescent dan hubungi doktor anda atau pergi ke bilik kecemasan hospital berdekatan dengan segera.

- Reaksi alergi yang teruk dan mengancam nyawa. Tanda-tandanya boleh merangkumi: ruam, masalah menelan atau bernafas, bengkak di bibir, muka, tekak atau lidah.
- Pendarahan teruk
- Melepuh, mengelupas, berdarah, atau tampalan berisi cecair di mana-mana bahagian kulit anda. Ini termasuk bibir, mata, mulut, hidung, kemaluan, tangan atau kaki. Anda mungkin mempunyai masalah kulit yang serius.
- Kejutan (penurunan tekanan darah yang teruk, keletihan, kegelisahan, nadi yang lemah, kulit lembap, kesedaran menurun) kerana pelepasan darah secara mendadak akibat hipersensitif yang teruk kepada bahan-bahan tertentu (*anaphylactic shock*).
- Pengumpulan bendalir secara tiba-tiba dalam kulit dan membran mukus (misalnya tekak atau lidah), kesukaran bernafas dan / atau gatal-gatal dan ruam kulit, selalunya akibat tindak balas alergi (*angioedema*).

Kesan sampingan yang jarang berlaku

Beritahu doktor jika anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut:

- Sesak nafas akibat kekejangan otot saluran pernafasan (bronkospasma). Kesukaran bernafas atau sesak nafas (*dyspnoea*).

DissoNac Effervescent Tablet 200mg

DissoNac Effervescent Tablet 600mg

Acetylcysteine (200mg and 600mg)

- Gangguan pencernaan dengan gejala kepenuhan di bahagian atas abdomen, sakit perut, belerang, mual dan pedih ulu hati (dyspepsia).

Kesan sampingan yang tidak biasa

- Hypersensitiviti
- Sakit kepala
- Telinga berdengung (tinnitus)
- Keradangan lapisan mukus lisan (stomatitis)
- Cirit-birit
- Demam (pyrexia)
- Tekanan darah rendah
- Sakit perut
- Loya
- Muntah

Sekiranya anda mengalami ulser gastrik atau duodenal atau mempunyai ini pada masa lalu, acetylcysteine mungkin mempunyai kesan yang tidak baik ke atas membran mukus gastrousus anda.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau anda melihat apa-apa kesan sampingan yang tidak disebutkan dalam risalah ini, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Rujuklah dengan doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mendapati bahawa kesan tablet DissoNac adalah terlalu kuat atau tidak cukup kuat.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan DissoNac

-Penyimpanan

Tarikh luput pek ini dicetak padakotak. Jangan gunakan pek ini selepas tarikh ini.

Simpan dalam bekas yang tertutup dengan baik, di tempat yang kering.

Lindungi dari cahaya dan kelembapan. Jangan simpan melebihi 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat ini tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau sisa rumah. Tanyalah ahli farmasi bagaimana melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

DissoNac 200mg Effervescent Tablet

Berwarna putih hingga kuning muda, berbentuk bulat tablet, rata di kedua-dua sisi. Bila larut dalam air, tablet menghasilkan larutan berwarna kuning muda.

DissoNac 600mg Effervescent Tablet

Kuning muda, tablet berbentuk bulat, rata di kedua-dua sisi. Bila larut dalam air, tablet menghasilkan larutan berwarna kuning muda.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

DissoNac 200mg Effervescent Tablet

Setiap tablet mengandungi acetylcysteine 200 mg

DissoNac 600mg Effervescent Tablet

Setiap tablet mengandungi acetylcysteine 600 mg

Bahan tidak aktif:

Sodium bicarbonate, Citric acid anhydrous, Sorbitol, Sodium carbonate anhydrous, Sodium benzoate, Polyethylene glycol 6000, Copovidone, Aspartame, Saccharin sodium, Orang flavour 10888-71, Orange flavour 12026-31, β -Carotene 1% cws/m, Ascorbic acid

- *Nombor MAL*

MAL*****

Pengilang

STELLAPHARM J.V. CO., LTD. - BRANCH 1

(A Joint Venture Company of Auxilto GmbH, Germany)

No. 40 Tu Do Avenue, Vietnam-Singapore Industrial Park, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam.

Pemegang Pendaftaran Produk

Aetos Pharma Sdn Bhd

No. 66B, Tingkat 2, Jalan Cerdas, Taman Connaught, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

30 Januari 2026

Nombor Siri

NPRA (R2) 26/002