

VENOFLON FILM-COATED TABLET 500MG

Diosmin/Hesperidin (450mg/50mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Venoflon
2. Bagaimana Venoflon berfungsi
3. Sebelum menggunakan Venoflon
4. Cara menggunakan Venoflon
5. Semasa menggunakan Venoflon
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Venoflon.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Venoflon

Ia disyorkan untuk rawatan *venous circulation disorders* (kaki berasa berat, sakit dan penat) dan untuk merawat simptom-simptom berkaitan dengan serangan buasir akut.

Bagaimana Venoflon berfungsi

Ubat ini menguatkan urat dengan meningkatkan nada vena, dan melindungi saluran darah kecil.

Sebelum menggunakan Venoflon

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Venoflon:

Jika anda alah (hipersensitif) kepada diosmin, hesperidin, *micronised purified flavonoid fraction* atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini (sila lihat Seksyen Bahan-bahan kandungan). Jangan gunakan ubat ini dalam kanak-kanak di bawah umur 18 tahun melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

-Sebelum menggunakan Venoflon

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda sedang mengandung, fikir anda mungkin mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak, sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini.

-Jika mengguna ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, telah baru-baru ini mengambil, atau akan mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang boleh diperolehi tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Venoflon

Sentiasa gunakan Venoflon seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

-Berapa banyak harus digunakan &

Bila perlu digunakan

Penyakit vena kronik

Dos biasa adalah 2 tablet setiap hari; iaitu satu pada tengah hari dan satu pada waktu petang, pada waktu makan.

Serangan buasir akut

Dos biasa adalah 6 tablet setiap hari (dalam 3 dos berasingan) untuk 4 hari pertama, dan kemudiannya 4 tablet sehari (dalam 2 dos berasingan) untuk 3 hari berikutnya, pada waktu makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Bergantung pada keadaan perubatan yang anda perlukan Venoflon, doktor anda mungkin memberitahu anda untuk mengambilnya untuk tempoh tertentu.

-Jika terlupa menggunakan

Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih Venoflon daripada yang diarahkan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda dengan segera.

Symptom-symptom yang mungkin dialami sekiranya dos berlebihan termasuk cirit-birit, rasa loya, sakit perut, kulit gatal (*pruritus*) dan ruam.

Semasa menggunakan Venoflon

-Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa gunakan ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Venoflon.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini telah dipreskripsikan untuk anda. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain. Ia boleh membahayakan mereka, walaupun simptom-simptom mereka adalah sama seperti anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Venoflon boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan termasuk:

Cirit-birit, *dyspepsia* (pencernaan yang sukar), loya, muntah-muntah, *colitis* (keradangan usus besar), rasa pening, sakit kepala, kelesuan, ruam, *pruritus* (kegatalan), *urticaria* (*reaksi alahan dalam bentuk bintik merah kecil*), sakit perut, *isolated oedema* (kebengkakan muka, bibir, kelopak mata), *Quincke's oedema* (kebengkakan muka, bibir, mulut, lidah atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas).

Melaporkan kesan sampingan

Jika anda mendapat sebarang kesan sampingan, berbincanglah dengan doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuklah sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini. Dengan melaporkan kesan sampingan, anda boleh membantu memberi maklumat mengenai keselamatan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Venoflon

-Penyimpanan

Jauhi ubat ini dari penglihatan dan capaian kanak-kanak.

Jangan guna ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kotak.

Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Simpan dalam pembungkusan yang asal. Simpan di bawah suhu 30°C.

-Pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Sila tanya ahli farmasi bagaimana untuk membuang ubat-ubatan anda yang tidak lagi digunakan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

VENOFLON FILM-COATED TABLET 500MG

Diosmin/Hesperidin (450mg/50mg)

Kuning-coklat, tablet bersalut filem
berbentuk bujur, dwicembung dan plain
di kedua-dua sisi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap tablet bersalut filem
mengandungi:

Micronized purified flavonoid fraction:

Diosmin..... 450 mg

Flavonoid expressed as hesperidin
.....50 mg

- Bahan tidak aktif

*Microcrystalline cellulose, sodium
starch glycolate, magnesium stearate,
gelatin, hypromellose, macrogol 6000,
talc, titanium dioxide, sodium lauryl
sulfate, yellow iron oxide, red iron oxide,
glycerine.*

- Nombor MAL: MAL25036142XC

Manufacturer

**STELLAPHARM J.V. CO., LTD. -
BRANCH 1**

(A Joint Venture Company of Auxilto
GmbH, Germany)

No. 40 Tu Do Avenue, Vietnam-
Singapore Industrial Park, An Phu Ward,
Thuan An Town, Binh Duong Province,
Vietnam.

Pemegang Pendaftaran Produk

AUXI THERAPEUTICS SDN. BHD.

E-9-02, Oasis Square Ara Damansara

No. 2, Jalan PJU 1A/7A

47301 Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP: 10/09/25

Nombor Siri: NPRA (R2) 25/007