

UNISON GLUCOSAMINE 500MG TABLET

Glucosamine Sulfate-potassium Chloride 699.00mg bersamaan Glucosamine Sulfate 500.00mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Glucosamine 500 Tablet*
2. Bagaimana *Glucosamine 500* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Glucosamine 500 Tablet*
4. Cara menggunakan *Glucosamine 500*
5. Semasa menggunakan *Glucosamine 500*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Glucosamine 500*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Glucosamine 500*

Glucosamine 500 Tablet digunakan sebagai terapi tambahan untuk osteoarthritis

Bagaimana *Glucosamine 500* berfungsi

Glucosamine 500 memberi kelegaan kepada pesakit arthritis dengan mengurangkan inflamasi sendi dan melegakan kesakitan

Sebelum menggunakan *Glucosamine 500*

- *Bila tidak boleh menggunakan*
Mereka yang menghidap *Diabetes Type II* dan mereka yang mempunyai masalah toleransi glukosa, jika ingin mengambil glucosamine dan ubat anti radang (dalam kes kesakitan yang teruk), sila pastikan kandungan gula dalam darah diberi pengawasan pada hari pertama pengambilan.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*
Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Pesakit diabetes perlu mengambil *Glucosamine* di bawah pengawasan perubatan

- *Mengandung dan menyusukan anak*

Untuk wanita mengandung dan menyusukan anak, sama seperti ubat yang lain, tablet ini perlu diberikan dibawah pengawasan perubatan.

Cara menggunakan *Glucosamine 500*

- *Berapa banyak harus digunakan*

Ringan ke sederhana: 1 tablet 2 kali sehari, 15minit sebelum makan untuk sekurang-kurangnya 6 minggu (Atau seperti preskripsi perubatan)
Simptom osteoarthritis teruk:-
Terapi awal: 1tablet 3 kali sehari, 15 minit sebelum makan untuk sekurang-kurangnya 8 minggu
Terapi susulan: Terapi pengekaln perlu diteruskan untuk 3-4 bulan (atau bergantung kepada preskripsi perubatan) dengan mengambil 1 tablet 2 kali sehari, 15 minit sebelum makan. Rawatan perlu diulang setiap 6 bulan atau kurang bergantung kepada preskripsi perubatan.

Perlu diambil secara oral.

- *Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- *Jika terlupa menggunakan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

- *Jika mengguna berlebihan (terlebi dos)*

Tiada kes berlebihan dos samaada secara tidak sengaja atau sengaja yang dilaporkan. Kajian toksikologi ke atas haiwan menunjukkan kesan toksik dan simptom keracunan tidak akan berlaku

walaupun dengan dos yang tinggi. Namun begitu, jika berlaku pengambilan ubat dengan kadar yang terlalu tinggi, pesakit perlu diberi perhatian secara terperinci and rawatan ke atas simptom tertentu perlu dimulakan

Semasa menggunakan *Glucosamine 500*

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil *Glucosamine 500*

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri *Glucosamine 500* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Pesakit diabetes perlu mengambil *Glucosamine* di bawah pengawasn perubatan

Ubat ini diperbuat daripada hasil laut.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Glucosamine 500* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Di bawah merupakan kesan sampingan yang mungkin di alami sesetengah orang:

1. Kardiovaskular
Edema periferi(pengumpulan cecair yang tidak normal dalam badan), kadar denyutan jantung yang cepat ada dilaporkan dalam sesetengah pesakit berikutan kajian klinikal untuk pengambilan secara oral dalam osteoarthritis.
2. Sistem saraf pusat
Mengantuk, sakit kepala, sukar tidur jarang didapati semasa terapi (kurang dari 1%)
3. Gastrosus
Mual, muntah, cirit-birit, dispepsia atau sakit epigastrik, sembelit, pedih ulu hati dan anoreksia telah dijelaskan jarang dialami semasa terapi oral dengan Glucosamine.
4. Kulit
Reaksi kulit seperti eritema dan pruritus ada dilaporkan dengan pengambilan terapeutik glukosamin.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Glucosamine 500

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30 °C, ditempat yang kering jauh dari sinar matahari.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi

rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet ini berwarna putih hingga putih kekuningan, bersalut filem dan berbentuk bujur, 16.6mm panjang

- Bahan-bahan kandungan

Setiap tablet mengandungi:
Glucosamine Sulfate-potassium Chloride 699.00mg bersamaan Glucosamine Sulfate 500.0mg

Bahan-bahan tidak aktif adalah microcrystalline cellulose, dibasic calcium phosphate dehydrate, magnesium stearate, colloidal silicone dioxide, Opadry II White dan air.

- Nombor MAL

MALxxxxxxxxx

Pengilang

Unison Nutraceuticals Sdn Bhd
No 13, Jalan TTU 52, Taman Tasik Utama, 75450 Ayer Keroh Melaka

Pemegang Pendaftaran Produk

Unison Nutraceuticals Sdn Bhd
No 13, Jalan TTU 52, Taman Tasik Utama, 75450 Ayer Keroh Melaka

Tarikh kemaskini RiMUP

14/05/2019

Nombor Siri

NPRA(R2)19/19