

**Apakah yang ada pada risalah ini**

1. Apakah kegunaan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet
2. Bagaimana AXI-NOVELL 35mg MR Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet
4. Cara menggunakan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet
5. Semasa menggunakan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

**Apakah kegunaan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet**

ATC code: C01EB15

Ubat ini digunakan oleh pesakit dewasa sebagai kombinasi dengan ubat lain untuk rawatan angina pectoris (sakit dada yang disebabkan oleh penyakit koronari).

**Bagaimana AXI-NOVELL 35mg MR Tablet berfungsi**

Trimetazidine bertindak dengan menghalang pemecahan asid lemak demi meningkatkan pengoksidaan glukosa. Tenaga yang diperoleh semasa pengoksidaan glukosa menggunakan oksigen yang lebih kurang, dengan ini dapat mengoptimumkan fungsi penghasilan tenaga jantung dan seterusnya melindungi tisu otot jantung yang rentan daripada kerosakan selanjutnya yang diakibatkan kekurangan oksigen.

**Sebelum menggunakan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet**

- *Bila tidak boleh menggunakan*

**Jangan mengambil AXI-NOVELL 35mg MR Tablet:**

- Jika anda alah kepada trimetazidine atau sebarang bahan lain dalam ubat ini,
- Jika anda mempunyai penyakit Parkinson: penyakit pada bahagian otak yang mempengaruhi pergerakan (menggeletar, postur tegar, pergerakan perlahan, tidak stabil),

- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang yang teruk

**- Sebelum mula menggunakan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet**

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil AXI-NOVELL 35mg MR Tablet. Ubat ini bukanlah rawatan sepenuhnya untuk serangan angina (sakit dada), ataupun rawatan awal bagi angina pectoris tidak stabil. Ia bukan untuk rawatan bagi serangan jantung (infarksi miokardium). Sekiranya berlakunya sakit dada (serangan angina), beritahu doktor anda. Anda mungkin perlu menjalani ujian dan rawatan anda mungkin diubah suai.

Ubat ini boleh menyebabkan atau memburukkan lagi simptom seperti menggeletar, postur tegar, pergerakan yang perlahan dan mengheret kaki, jalan yang tidak seimbang, terutama di kalangan pesakit tua, dimana ia perlu disiasat dan dilaporkan kepada doktor supaya rawatan anda dinilai semula.

**Kanak-kanak dan remaja**

AXI-NOVELL 35mg MR Tablet adalah tidak disarankan untuk kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun.

**- Jika mengambil ubat-ubat lain**

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil, atau baru-baru ini mengambil ubat-ubatan lain.

**Cara menggunakan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet**

Sentiasa ambil AXI-NOVELL 35mg MR Tablet seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti. AXI-NOVELL 35mg MR Tablet diambil secara oral.

**- Berapa banyak harus digunakan**

Dos AXI-NOVELL 35mg MR Tablet yang disyorkan adalah satu tablet diambil dua kali sehari semasa waktu makan pada sebelah pagi dan petang.

Jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau jika anda berusia lebih daripada 75 tahun, doktor anda mungkin mengubah dos yang disyorkan ini.

**- Bila perlu digunakan**

Tablet ditelan dengan segelas air pada waktu makan.

**- Berapa lama perlu digunakan**

Teruskan pengambilan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet selagi doktor anda mengesyorkan.

**- Jika terlupa menggunakan**

Jika anda terlupa untuk mengambil dos AXI-NOVELL 35mg MR Tablet, ambil satu tablet dengan makanan seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa itu.

**- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)**

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi dengan segera.

**Semasa menggunakan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet****- Perkara yang perlu dilakukan**

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet.

Adalah lebih baik untuk tidak mengambil ubat ini semasa anda mengandung atau menyusu. Jika anda mendapati bahawa anda hamil semasa mengambil ubat ini, rujuk kepada doktor anda kerana beliau boleh menilai keperluan untuk meneruskan rawatan anda.

**- Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri AXI-NOVELL 35mg MR Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

## Trimetazidine Dihydrochloride

- Perkara yang perlu diberi perhatian

### Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh membuat anda berasa pening dan mengantuk yang boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

### Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Di bawah adalah senarai kesan sampingan seperti berikut:

#### Kesan sampingan yang biasa berlaku:

Pening, sakit kepala, sakit perut, cirit-birit, masalah pencernaan, rasa tidak sihat, muntah, ruam, gatal-gatal, merah dan kegatalan yang amat (*hives*) dan rasa lemah.

#### Kesan sampingan yang jarang berlaku:

Degupan jantung yang cepat atau tidak teratur (juga dipanggil palpitasi), degupan jantung bertambah, degupan jantung yang lebih cepat, penurunan tekanan darah semasa berdiri yang boleh menyebabkan rasa pening atau pingsan, *malaise* (biasanya rasa kurang sihat), pening, jatuh, kulit kemerahan yang sementara (*flushing*).

#### Kesan sampingan lain:

Simptom *extrapyramidal* (pergerakan yang luar biasa, ini termasuk tangan dan jari menggeletar, pergerakan badan berpusing, cara jalan yang mengheret dan kekakuan tangan dan kaki), yang biasanya akan kembali seperti biasa selepas rawatan dihentikan.

Gangguan tidur (kesukaran untuk tidur, mengantuk), kepening, sembelit, ruam kulit merah yang umum dan serius dengan lepuh, bengkak pada bahagian muka, bibir, mulut, lidah atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas.

Kekurangan dalam bilangan sel-sel darah putih yang teruk dimana

jangkitan lebih mungkin terjadi, pengurangan dalam platelet darah, yang boleh meningkatkan risiko pendarahan atau lebam.

Penyakit hati (loya, muntah, hilang selera makan, rasa tidak sihat, demam, gatal, kulit dan mata menjadi kuning, warna najis yang cerah, warna air kencing yang gelap). Jika anda mendapat sebarang kesan-kesan sampingan, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi. Ini termasuk sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [nptra.gov.my](http://nptra.gov.my) [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

### Cara penyimpanan dan pelupusan AXI-NOVELL 35mg MR Tablet

#### - Penyimpanan

Jauhi ubat ini dari dicapai atau dilihat oleh kanak-kanak.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada kotak dan blister ubat. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan itu.

Simpan di bawah suhu 30°C.

#### - Pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

### Maklumat lanjut

#### - Rupa dan warna produk

AXI-NOVELL 35mg MR Tablet adalah tablet, berbentuk cembung, bulat dan berwarna merah

#### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: *Trimetazidine dihydrochloride*.

Satu tablet modified-release mengandungi 35mg Trimetazidine dihydrochloride.

- Bahan tidak aktif: *Hydroxyl Propyl Methyl Cellulose 4000cps, Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate, Colloidal Silica Anhydrous, Magnesium Stearate, Ethylene Glycol, Kallicoat Protect, Titanium Dioxide (E171), Talc, dan Iron Oxide Red (E172)*

- Nombor MAL:

MAL23036149AZ

### Pengilang

#### PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

Jl. Wanaherang No. 35, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor 16962 – Indonesia

### Pemegang Pendaftaran Produk Celestema Pharma Sdn. Bhd.

3 Jalan 19/1, 46300 Petaling Jaya Selangor, Malaysia

### Tarikh kemas kini RiMUP

24/03/2025

### Nombor Siri

NPRA (R2) 21/134