

PROSDROP 0.05mg/ml EYE DROPS, SOLUTION

Latanoprost 0.05mg/ml

Apakah yang ada pada risalah ini

- Apakah kegunaan PROSDROP
- Bagaimana PROSDROP berfungsi
- Sebelum mengguna PROSDROP
- Cara menggunakan PROSDROP
- Semasa menggunakan PROSDROP
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan PROSDROP
- Maklumat produk
- Pengilang

Apakah kegunaan PROSDROP

PROSDROP digunakan untuk merawat glaukoma sudut terbuka dan hipertensi okular. Kedua-dua keadaan ini dikaitkan dengan peningkatan tekanan di dalam mata, yang boleh menjejaskan penglihatan.

PROSDROP juga digunakan untuk merawat tekanan mata dan glaukoma di kalangan kanak-kanak.

Bagaimana PROSDROP berfungsi

Latanoprost tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai analog prostaglandin. Latanoprost berfungsi meningkatkan pengaliran keluar bendalir dalam mata ke dalam peredaran darah.

Sebelum mengguna PROSDROP

Bila tidak boleh mengguna

Jangan menguna PROSDROP:

- sekiranya anda alergi (hipersensitif) terhadap latanoprost atau bahan kandungan lain di dalam PROSDROP

- sekiranya anda hamil (atau cuba untuk hamil)
- sekiranya anda menyusukan anak

Jika anda mengalami salah satu keadaan tersebut, jangan guna ubat ini dan beritahu doktor anda.

Sebelum mula mengguna

Sebelum menggunakan PROSDROP, beritahu doctor anda sekiranya anda ada:

- Pernah atau akan menjalani pembedahan mata
- Menghidapi masalah mata (mata sakit, kerengsaan atau keradangan mata atau penglihatan kabur)
- Mengalami mata kering
- Memakai kanta sentuh.

Jika anda mengalami salah satu keadaan tersebut, **maklumkan doktor anda**. Doktor akan mengambil kira hal ini semasa merawat anda dengan PROSDROP.

Jika menggunakan ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil atau baru-baru ini telah mengambil ubat lain, termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi.

Penggunaan dua atau lebih analog prostaglandin tidak digalakkan.

Penggunaan serentak latanoprost dan pilocarpine boleh mengurangkan keberkesanan latanoprost.

Penggunaan serentak thiomerosal dengan latanoprost boleh menyebabkan presipitasi di dalam mata.

Cara menggunakan PROSDROP

Berapa banyak harus digunakan

Dos orang dewasa ialah satu titis, satu kali setiap hari pada belah mata yang terjejas.

Ia boleh digunakan pada pesakit kanak-kanak, sama seperti orang dewasa. Walau bagaimanapun tiada data untuk bayi pramatang (kurang daripada 36 minggu kehamilan). Data untuk umur <1 tahun adalah terhad.

Bila perlu digunakan

Titiskan ubat mata pada waktu petang setiap hari. Cuba titiskan ubat mata anda pada waktu yang sama setiap hari.

Sekiranya anda menggunakan PROSDROP dengan ubat titis mata lain, tunggu sekurang-kurangnya 5 minit di antara penggunaan PROSDROP dan penggunaan ubat titis mata lain.

Berapa lama perlu diguna

Anda harus mengguna PROSDROP setiap hari selagi ia dipreskripsikan oleh doktor. Jika anda ada soalan mengenai tempoh rawatan, sila tanya doktor.

Jika terlupa mengguna

Adalah penting untuk anda menggunakan PROSDROP seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Jika anda terlupa dos PROSDROP, teruskan dengan dos yang seterusnya pada masa yang sama. Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang anda terlupa.

Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda menitiskan terlalu banyak titisan ke dalam mata anda, anda mungkin

mengalami sedikit kerengsaan pada mata anda dan mata anda mungkin menjadi merah dan berair. Ini harus berlalu tetapi sekiranya anda risau sila hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat.

Semasa menggunakan PROSDROP

Perkara yang perlu dilakukan

PROSDROP mengandungi benzalkonium klorid (pengawet). Ia boleh diserap oleh kanta sentuh dan menyahwarnakan kanta sentuh lembut.

Anda harus menangguhkan kanta mata sebelum menggunakan PROSDROP. Tunggu sekurang-kurangnya 15 minit sebelum memakai semula kanta sentuh.

Ubat ini tidak sesuai untuk wanita mengandung dan ibu yang menyusukan anak. Beritahu doktor dengan segera jika anda mengandung semasa dirawat dengan ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan PROSDROP lebih kerap daripada sekali sehari, kerana keberkesanan rawatan boleh berkurangan jika anda menggunakannya dengan kerap.

Jangan berhenti rawatan tanpa berunding dengan doktor.

Jangan gunakan PROSDROP untuk merawat sebarang keadaan lain melainkan jika doktor memberitahu anda untuk berbuat demikian.

Jangan memberi atau mengesyorkan PROSDROP kepada orang lain, walaupun mereka mengalami masalah yang sama dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin: Sewaktu anda

menggunakan PROSDROP, penglihatan anda mungkin menjadi kabur untuk tempoh yang singkat. Sekiranya ini berlaku kepada anda, jangan memandu atau menggunakan sebarang alat atau mesin sehingga penglihatan anda menjadi jelas semula.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat lain, PROSDROP boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan yang pernah dilaporkan:

- Perubahan beransur-ansur pada warna mata anda dengan penambahan pigmen coklat pada bahagian warna mata yang dikenali sebagai iris. Perubahan warna mungkin berkekalan dan ianya lebih ketara jika anda gunakan PROSDROP pada satu belah mata sahaja. Perubahan warna mata tidak memudaratkan mata. Perubahan warna mata juga tidak berterusan sekiranya penggunaan PROSDROP dihentikan.
- Mata yang sakit dan iritasi (pedih, gatal-gatal, sensasi terbakar atau seperti benda asing dalam mata)
- Pertumbuhan bulu-bulu halus di sekeliling mata yang dirawat serta perubahan pada bulu-bulu mata
- Iritasi pada permukaan mata, keradangan kelopak mata, sakit mata dan sensitiviti terhadap cahaya (fotofobia).

Jika mana-mana kesan sampingan ini menjadi serius, sila maklumkan doktor anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.moh.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan PROSDROP

Penyimpanan

Simpan di dalam peti sejuk (2°C hingga 8°C). Jauhi dari cahaya. Setelah dibuka, perlu digunakan dalam masa 4 minggu dan boleh disimpan dalam suhu bilik tidak melebihi 25°C.

Jauhi daripada kanak-kanak.

Pelupusan

Jangan gunakan PROSDROP selepas tarikh luput yang dinyatakan pada label dan karton.

Jika doktor memberitahu anda untuk berhenti menggunakan PROSDROP ataupun sudah 4 minggu selepas membuka, sila tanya ahli farmasi atau doktor bagaimana menguruskan baki ubat tersebut.

Jangan buang baki ubat atau ubat yang luput tarikh ke dalam tong sampah.

Maklumat produk

Rupa dan warna ubat

PROSDROP adalah cecair yang jernih tanpa warna.

Setiap kotak mengandungi satu botol 2.5ml ubat titis mata PROSDROP.

Bahan-bahan kandungan

Kandungan aktif adalah latanoprost.

Bahan kandungan lain adalah hydrochloric acid 1N, benzalkonium chloride, sodium chloride, disodium phosphate anhydrous, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide / hydrochloride acid, water for injection.

No. Pendaftaran:
MAL17015025ACZ

Pengilang

RAFARM S.A.,
Thesi Pousi Xatzi,
Agiou Louka, Paiania Attiki,
19002,
Greece.

Pemegang Pendaftaran

Produk

Lotus Healthcare Malaysia
Sdn. Bhd.
UOA Business Park, Tower 3,
9th Floor, K03-09-11,
1 Jalan Pengaturcara U1/51A,
Section U1,
40150 Shah Alam,
Malaysia

Tarikh Kemaskini

12/12/2023

No Siri

NPRA(R2/1)230627/1089