

VI PROLABS CLOTRIMAZOLE CREAM 1% W/W

Clotrimazole 1%w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w
2. Bagaimana Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w berfungsi
3. Sebelum menggunakan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w
4. Cara menggunakan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w
5. Semasa menggunakan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w

Ia digunakan untuk merawat:

- Semua dermatomikosis yang disebabkan oleh dermatofit (spesis Trichophyton) seperti kaki atlet (Tinea pedis), gatal pangkal paha (Tinea cruris) dan kurap pada badan (Tinea corporis)
- Semua dermatomikosis disebabkan oleh yis seperti candida vulvitis, candida balanitis, pityriasis versicolor
- Dermatomikosis yang disebabkan oleh kulapuk dan kulat yang lain
- Penyakit kulit yang mempunyai jangkitan sekunder oleh fungus

Bagaimana Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w berfungsi

Ia mengandungi Clotrimazole yang merupakan ejen anti-kulat yang melawan punca jangkitan kulat.

Sebelum menggunakan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna jika anda alah terhadap clotrimazole atau bahan- bahan lain yang terkandung dalam Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w.

- Sebelum menggunakan

Jangan pakai pembalut luka selepas sapu ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor. Keselamatan untuk digunakan semasa kehamilan dan penyusuan belum dikenalpasti. Maklumkan kepada doktor anda jika anda sedang mengandung atau menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w adalah untuk aplikasi topikal dan biasanya akan mempunyai kesan minimum ke atas ubat-ubatan lain. Namun, sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika mengambil ubat- ubat lain.

Cara menggunakan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w

- Berapa banyak harus digunakan

Umum: Basuh dan keringkan bahagian yang dijangkiti. Sapukan lapisan nipis krim dengan sekata di bahagian yang dijangkiti dua kali sehari. Rawatan perlu diteruskan 2- 4 minggu selepas kehilangan semua tanda- tanda jangkitan untuk memastikan penyembuhan yang sempurna dan mengelakkan jangkitan berulang.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Sila ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakan terlalu banyak Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w, hubungi doktor anda, jabatan kecemasan atau pusat keracunan segera.

Semasa menggunakan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat yang anda sedang ambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat walaupun anda berasa lebih baik selepas beberapa hari, sehingga kursus rawatan yang ditetapkan habis.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Basuh tangan anda selepas menggunakan ubat.

Tanya pengamal perubatan kesihatan anda apa- apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w.

Kesan- kesan Sampingan

Tindak balas setempat termasuk iritasi, sensasi panas, dermatitis kontak, lepuh, edema, eritema, pengelupasan kulit, gatal- gatal, urtikaria dan sengatan kulit.

Seperti semua ubat, Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w boleh menyebabkan kesan- kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan menghidapinya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

VI PROLABS CLOTRIMAZOLE CREAM 1% W/W

Clotrimazole 1%w/w

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Vi Prolabs Clotrimazole Cream 1 % w/w

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.
Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Vi Prolabs Solution Sdn Bhd
23, Laluan Industri 6,
Kawasan Perindustrian Ringan Siputeh,
31560 Siputeh, Perak

Tarikh kemaskini RiMUP

13.12.2024

Nombor Siri

NPRA (R2) 24/111

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih, mudah disapu, melekit dan bau fenolik.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Clotrimazole

- Bahan tidak aktif
Cetomacrogol, cetostearyl alcohol, liquid paraffin, chlorocresol, purified water

- Nombor MAL

MALxxxxxxx