

COLFEN ALLERGY TABLET 10 MG

Cetirizine Dihydrochloride (10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Colfen Allergy Tablet 10 mg.
2. Bagaimana Colfen Allergy Tablet 10 mg berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Colfen Allergy Tablet 10 mg.
4. Cara menggunakan Colfen Allergy Tablet 10 mg.
5. Semasa menggunakan Colfen Allergy Tablet 10 mg.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Colfen Allergy Tablet 10 mg.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Colfen Allergy Tablet 10 mg

Colfen Allergy Tablet 10 mg digunakan untuk rawatan simptomatik. Ia boleh digunakan untuk merawat:

- Rinitis (keradangan membran mukus hidung) bermusim.
- Alergi rinitis perennial (berlaku sepanjang tahun).
- Urtikaria (ruam gatal yang timbul pada kulit) asal alergi.

Bagaimana Colfen Allergy Tablet 10 mg berfungsi

Cetirizine dihydrochloride, bahan aktif Colfen Allergy Tablet 10 mg, merupakan sejenis antihistamina. Ia menghalang kesan-kesan sejenis bahan yang dikenali sebagai histamina yang wujud secara semula jadi dalam badan. Histamina terlibat dalam reaksi alahan. Antihistamina seperti Colfen Allergy Tablet 10 mg melegakan gejala yang tidak menyenangkan dan ketidakselesaan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan in, seperti bersin, rengsa, hidung berair dan tersumbat, gatal, mata merah dan berair dan ruam kulit.

Sebelum menggunakan Colfen Allergy Tablet 10 mg

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Colfen Allergy Tablet 10 mg jika:

- Anda alergi pada kandungan dalam produk ini.
- Anda mengandung pada 3 bulan pertama atau jika anda sedang menyusukan anak.
- Produk ini bukan dipreskripsikan oleh doktor/ahli farmasi yang bertaualiah kepada anda.

-Sebelum mula menggunakan Colfen Allergy Tablet 10 mg

Maklumkan kepada doktor anda jika:

- Anda alergi pada ubat-ubatan, makanan dan pewarna
- Anda mengambil ubat-ubat lain (termasuk yang tidak dipreskripsikan oleh doktor anda).
- Anda hamil atau menyusukan bayi.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain, terutamanya :

- Ubat penenang.
- Alkohol atau ubat depresi sistem saraf pusat yang lain.

Cara menggunakan Colfen Allergy Tablet 10 mg

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa

Ambil sebiji pil sekali sehari. Dos permulaan sebanyak setengah tablet boleh dicadangkan jika ini mencapai kawalan simptom-simptom yang memuaskan.

Kanak-kanak

Kanak-kanak berumur diantara 6 hingga 12 tahun

Ambil setengah tablet pada waktu pagi dan pada waktu petang.

Kanak-kanak berusia 12 tahun keatas

Ambil sebiji pil sekali sehari.

Ambil tablet dengan segelas air.

Jangan ambil lebih daripada sebiji pil setiap hari.

-Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan sekiranya anda perlu mengambil Colfen Allergy Tablet 10 mg.

-Berapa lama perlu digunakan

Terus gunakan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

- Gelisah, rasa cepat marah dan mengantuk mungkin berlaku.
- Rawatan harus simptomatik atau menyokong.

Anda dinasihatkan supaya menghubungi doktor anda dengan segera jika anda mengambil Colfen Allergy Tablet 10 mg berlebihan.

Semasa menggunakan Colfen Allergy Tablet 10 mg

-Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli

COLFEN ALLERGY TABLET 10 MG

Cetirizine Dihydrochloride (10mg)

farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Colfen Allergy Tablet 10 mg.

- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Colfen Allergy Tablet 10 mg dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Berhati-hati ketika mengambil ubat ini semasa hamil dan menyusukan bayi.
- Berhati-hati ketika melakukan aktiviti yang memerlukan kepekaan mental seperti memandu kereta atau mengendalikan mesin yang berpotensi berbahaya.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Colfen Allergy Tablet 10 mg boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan biasa berikut telah dilaporkan:

- Sakit kepala.
- Kepeningan.
- Mengantuk.
- Keresahan.
- Kekeringan mulut.
- Ketidakselesaan gastrousus.
- Simptom hipersensitiviti.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [(Consumer → Reporting of Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI))].

Cara penyimpanan dan pelupusan Colfen Allergy Tablet 10 mg

-Penyimpanan

Jauhkan Colfen Allergy Tablet 10 mg dari jangkauan kanak-kanak. Simpan pada suhu bawah 30°C. Pastikan bekas tertutup rapat dan lindungi dari cahaya.

-Pelupusan

Jangan guna Colfen Allergy Tablet 10 mg yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Colfen Allergy Tablet 10 mg adalah tablet berwarna kuning, berbentuk bujur dengan garisan di kedua-dua permukaan.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan Aktif:

Cetirizine dihydrochloride

-Bahan Tidak Aktif:

Lactose monohydrate, corn starch, povidone K30, sodium starch glycolate, magnesium stearate, isopropyl alcohol dan yellow iron oxide.

-Nombor MAL

MAL

Pemegang Pendaftaran

Appeton Healthcare Sdn. Bhd.
No.1, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Pengilang

Kotra Pharma (M) Sdn Bhd
No.1, 2 & 3 Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

05/12/2023

Nombor siri

NPRA (R2) 22/083