

Lyoxine Lozenges

Lysozyme Hydrochloride 80 mg, Pyridoxine Hydrochloride 40 mg

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Lyoxine Lozenges
2. Bagaimana Lyoxine Lozenges berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lyoxine Lozenges
4. Cara menggunakan Lyoxine Lozenges
5. Semasa menggunakan Lyoxine Lozenges
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan Lyoxine Lozenges

Lyoxine Lozenges mengandungi bahan-bahan aktif lysozyme hydrochloride dan pyridoxine hydrochloride. Produk ini digunakan sebagai rawatan adjuvant untuk melegakan sakit tekak.

2. Bagaimana Lyoxine Lozenges berfungsi

Lysozyme hydrochloride diekstrak daripada telur putih dan digunakan untuk memulihkan tisu yang rosak, sebagai ejen anti-keradangan dan menguatkan sistem pertahanan badan semula jadi.

Pyridoxine hydrochloride menambah baik tindak balas imun terhadap peningkatan dalam pengeluaran antibodi-antibodi.

3. Sebelum menggunakan Lyoxine Lozenges

-Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda mempunyai alahan terhadap bahan-bahan aktif atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam produk ini.

Jika anda mempunyai sejarah hipersensitiviti terhadap telur putih atau Vitamin B6.

-Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap ubat-ubatan lain, makanan, dalam bentuk dermatitis atopik atau asma bronkial.

-Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Hamil dan penyusuan anak

Jangan mengambil ubat ini jika mengandung atau sedang memberi penyusuan anak

4. Cara menggunakan Lyoxine

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Satu biji untuk dihisap dalam mulut satu atau dua kali sehari atau mengikut preskripsi doktor.

-Bila perlu digunakan

- Cuba mengambil ubat pada waktu yang sama setiap hari.
- Ambil ubat mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.
- Bincang dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

-Berapa lama perlu digunakan

Tempoh rawatan ditentukan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan Lysotis

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

5. Semasa menggunakan Lyoxine Lozenges

-Perkara yang perlu dilakukan

Simpan RiMUP. Anda mungkin perlu membaca semula. Jika anda ada

sebarang pertanyaan, sila tanya doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini adalah preskripsi untuk anda sahaja. Jangan bagi orang lain. Ia mungkin tidak sesuai untuk orang lain walaupun mereka mempunyai tanda-tanda yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan mengambil melebihi dos yang disyorkan.

6. Kesan-kesan sampingan

Boleh menyebabkan cirit-birit, anoreksia, ketidakselesaan perut, mual dan muntah-muntah.

Boleh menyebabkan reaksi hipersensitiviti seperti ruam kulit.

Dalam kes yang jarang berlaku, kejutan mungkin berlaku dengan pentadbiran ubat ini.

Hentikan ubat dan minta bantuan perubatan jika sebarang di atas berlaku kepada anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines(AEFI)]

7. Cara penyimpanan and pelupusan

-Penyimpanan

Simpan bawah 30° C.

Jangan guna produk ini melampaui tarikh luput yang dicetak pada komponen pembungkusan.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Jauhi daripada kanak-kanak

Lyoxine Lozenges

Lysozyme Hydrochloride 80 mg, Pyridoxine Hydrochloride 40 mg

8. Maklumat lanjut

-Rupa and warna produk

Ia adalah lozenge bulat yang berwarna putih dengan perasa mentol, satu permukaan mempunyai logo Y6 dan satu lagi permukaan licin.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:

Lysozyme hydrochloride

Pyridoxine hydrochloride

Bahan-bahan tak aktif:

-Mannitol, Menthol, sodium saccharin, sucralose, magnesium stearate, talc dan hydroxypropylmethylcellulose.

-Nombor Pendaftaran

Lyoxine Lozenges

MAL24016036XC

9. Pengilang & pemegang pendaftaran produk

-Pengilang

AV Manufacturing Sdn. Bhd.(667760-V),

Lot 10621, Jalan Permata 2,

Arab Malaysian Industrial Park

71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

-Pemegang pendaftaran produk

AV Pharma Enterprise (NS0269092-D)

No. 28A, Jalan BP 6/6, Bandar Bukit

Puchong, 47120 Puchong, Selangor.

10. Tarikh kemaskini RiMUP

16 Aug 2024

Nombor siri

NPRA(R2) 23/179