

DAKTARIN® CREAM/TINCTURE

Miconazole (20mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan DAKTARIN®
2. Bagaimana DAKTARIN® berfungsi
3. Sebelum menggunakan DAKTARIN®
4. Cara menggunakan DAKTARIN®
5. Semasa menggunakan DAKTARIN®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan DAKTARIN®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan DAKTARIN®

DAKTARIN® digunakan untuk merawat jangkitan kulat pada kulit, termasuk jangkitan yis.

DAKTARIN® Cream digunakan untuk:

- Jangkitan pada kulit kepala, janggut, badan, kaki dan tangan serta bahagian pangkal paha;
- Ruam lampin pada bayi.

DAKTARIN® Tincture hanya boleh digunakan untuk:

- jangkitan kuku.

Bagaimana DAKTARIN® berfungsi

- Miconazole nitrate – bahan antikulat yang bertindak dengan memusnahkan kulat yang menyebabkan jangkitan dan juga sesetengah bakteria yang mungkin ada di kawasan tersebut.

Sebelum menggunakan DAKTARIN®

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan gunakan DAKTARIN® jika anda tahu anda hipersensitif kepadanya atau kepada ubat antikulat yang lain..

Mengandung dan menyusukan anak

Mengandung
DAKTARIN® diserap secara minimum ke dalam kulit/kuku.

Jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung, bertanya dengan doktor anda jika anda perlu menggunakan DAKTARIN®.

Menyusukan anak

Bahan aktif ini tidak diketahui sama ada boleh dirembeskan ke dalam susu

manusia. Jika anda sedang menyusukan anak, bertanya dengan doktor anda jika anda patut menggunakan DAKTARIN®.

- Sebelum menggunakan DAKTARIN®

Antikoagulan oral (ubat pencair darah): Sebelum menggunakan ubat ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat pencair darah oral, seperti warfarin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Lain-lain ubat: Kesan dan kesan sampingan sesetengah ubat preskripsi, apabila diambil bersama miconazole, boleh meningkat. Bertanya dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda menggunakannya jika anda sedang mengambil mana-mana ubat lain.

Cara menggunakan DAKTARIN®

DAKTARIN® Cream:

Untuk rawatan yang berkesan, sapukan DAKTARIN® Cream setiap hari.

- Sapukan DAKTARIN® Cream pada kulit dua kali sehari.
- Untuk membuka tiub, putar penutupnya. Cucuk penutup tiub dengan menggunakan pin pada bahagian atas penutup.

Bersihkan kulit yang dijangkiti dan lapkan sehingga kering. Sapu DAKTARIN® Cream pada bahagian kulit dan gosokkannya dengan perlahan menggunakan hujung jari anda. Jangan hanya sapu pada bahagian yang dijangkiti. Anda juga perlu menyapu krim tersebut pada kawasan sekitarnya.

Bersihkan tangan anda dengan sempurna selepas menyapu krim. Langkah ini adalah amat penting untuk mengelakkan anda daripada menyebarkan kuman pada bahagian yang dijangkiti ke bahagian tubuh lain atau kepada orang lain.

DAKTARIN® Tincture:

Untuk rawatan yang berkesan, sapukan DAKTARIN® Tincture setiap hari.

DAKTARIN® Tincture disapu dengan menggunakan berus yang dilekatkan pada penutup botol.

Potong kuku yang dijangkiti sependek yang mungkin. Sapu tinktur pada kuku, pada kawasan di sekitarnya dan jika boleh, di bawah kuku, sekali hingga dua kali sehari. Biarkan sehingga kering. Selepas tinktur telah kering, satu lapisan nipis akan ditinggalkan pada kuku anda.

Sebelum menyapu tinktur lagi, anda hendaklah membersihkan kuku dengan kapas yang mengandungi aseton (kadang kala digunakan untuk menanggalkan pengilat kuku). Jika ini tidak dilakukan, lapisan tinktur akan menjadi tebal dan ubat yang terkandung di dalam Tinktur DAKTARIN® tidak dapat lagi menembusi kuku.

- Berapa banyak harus digunakan

Jika anda menggunakan **DAKTARIN® Cream**: gunakan dua kali sehari.

Jika anda menggunakan

DAKTARIN® Tincture: gunakan satu atau dua kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Sentiasa gunakan ubat ini dengan teliti mengikut arahan doktor anda. Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

- Berapa lama perlu digunakan

- **DAKTARIN® Cream**: Jangan hentikan penggunaan ubat sehingga sekurang-kurangnya seminggu selepas semua simptom hilang. Bergantung kepada jenis dan keterukan jangkitan, rawatan mungkin berterusan selama 2 hingga 6 minggu.
- **DAKTARIN® Tincture**: Anda patut teruskan rawatan sehingga kuku baru mula untuk tumbuh. Berhenti menggunakan Tinktur DAKTARIN hanya selepas anda nampak bahawa kuku tersebut telah normal sepenuhnya.

Patuhi nasihat doktor anda mengenai tempoh rawatan. berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

- Jika terlupa menggunakan

- Abaikan dos yang tertinggal.

- Sapu dos yang berikutnya seperti biasa dan teruskan penggunaan ubat mengikut arahan doktor anda.
- Jangan gunakan dos berganda ubat untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Apabila DAKTARIN[®] disapu dengan lebih kerap daripada diarahkan, ia boleh menyebabkan kemerahan, kebengkakan atau rasa pedih pada kulit. Jika ini berlaku, anda hanya perlu melangkaui satu atau dua aplikasi dan mulakan semula mengikut aturan biasa.

Menelan DAKTARIN[®] Cream secara tidak sengaja dalam kuantiti yang kecil lazimnya tidak memudaratkan. Menelan Tinktur DAKTARIN[®] secara tidak sengaja boleh mengakibatkan kerengsaan perut.

Jika ini terjadi, dapatkan rawatan perubatan dengan segera. Hubungi doktor anda untuk memastikan tiada masalah yang timbul.

Semasa menggunakan DAKTARIN[®]

- Perkara yang perlu dilakukan DAKTARIN[®] Cream:

Bersihkan tangan anda dengan sempurna selepas menggunakan DAKTARIN[®] melainkan jika bahagian yang dirawat ialah tangan anda.

DAKTARIN[®] Cream and Tincture:

Sediakan tuala dan kain pengelap untuk kegunaan sendiri. Dengan cara ini, anda dapat menghindari daripada menjangkiti orang lain. Tukar pakaian yang terkena kulit yang dijangkiti dengan kerap bagi mengelakkan jangkitan berulang.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan DAKTARIN[®] Cream:

Jangan sapukan DAKTARIN[®] Cream pada mata.

DAKTARIN[®] Tincture:

Jangan kenakan Tinktur DAKTARIN[®] kepada luka yang terbuka, mata, atau membran mukus.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
DAKTARIN[®] boleh menyebabkan tidak balas alahan yang teruk. Anda hendaklah sedar akan tanda-tanda tindak balas alahan semasa anda sedang menggunakan DAKTARIN[®]. Lihat “Kesan sampingan”.

Memandu dan menggunakan jentera
DAKTARIN[®] tidak berkemungkinan mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan apa-apa alatan atau mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, DAKTARIN[®] boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. DAKTARIN[®] lazimnya dapat diterima dengan baik.

- Sensasi membakar pada kulit
- Keradangan kulit
- Tompok kulit yang ringan
- Masalah di mana DAKTARIN[®] telah digunakan pada kulit
- Perasaan membakar di bahagian DAKTARIN[®] disapu pada kulit
- Gatal-gatal di mana DAKTARIN[®] berada di kulit
- Perasaan hangat di bahagian DAKTARIN[®] disapu pada kulit
- Kemerahan kulit
- Gatal-gatal
- Ruam kulit alergi disebabkan oleh sentuhan dengan sesuatu di kulit
- Ruam
- Hives

Jangan teragak-agak untuk melaporkan kesan sampingan yang lain kepada doktor atau ahli farmasi..

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting side effects to medicines (ConSERF) or vaccines (AEFI).

Cara penyimpanan dan pelupusan DAKTARIN[®]

- Penyimpanan

Sentiasa pastikan ubat ditutup dengan ketat.

Jauhkan daripada jangkauan atau pandangan kanak-kanak.

Ubat ini hanya boleh disimpan untuk tempoh yang terhad. Jangan gunakan DAKTARIN[®] selepas tarikh (bulan dan tahun) yang dicetak selepas “EXP”, walaupun ia telah disimpan dengan baik.

DAKTARIN[®] Cream:

Jangan simpan lebih daripada suhu 25°C.

DAKTARIN[®] Tincture:

Jangan simpan lebih daripada suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

DAKTARIN[®] Cream: Krim putih, homogen, tidak berbau yang di isi dalam tiub aluminium 15g.

DAKTARIN[®] Tincture: Larutan jernih tidak berwarna di dalam botol 30 mililiter dengan berus yang dilekatkan pada penutup botol.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

DAKTARIN[®] Cream: Setiap gram mengandungi 20mg miconazole.

DAKTARIN[®] Tincture: Setiap mililiter mengandungi 20mg miconazole.

- Bahan tidak aktif

DAKTARIN[®] Cream: asik benzoik, hidroksianisole dibutilkan, cecair parafin, oleoyl makrogolgliserida, PEG-6 (dan) PEG-32 (dan) glikol stearat, dan air.

DAKTARIN® Tincture:

akrilik/kopolimer akrilat 750mPa.s
& 5mPa.s, alkohol, dan propilena
glikol.

- Nombor MAL

DAKTARIN® Cream:

MAL19900260AZ

DAKTARIN® Tincture:

MAL19990597ACZ

Pengilang

DAKTARIN® Cream:

Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse,
Belgium

DAKTARIN® Tincture:

Lusomedicamenta Sociedade Technica
Farmaceutica S.A,
Estrada Consiglieri Pedroso,
69B, Queluz De Baixo,
2730-055 Barcarena,
Portugal.

Pemegang pendaftaran produk

JNTL (Malaysia) Sdn. Bhd.
Lot 3 & 5, Jalan Tandang
46050 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/10/2023(MY PI CPPI
vAug2015)

Nombor siri

NPRA (R1/1) 26122023/217