

CITRAL SODA EFFERVESCENT GRANULES

Sodium Bicarbonate/ Sodium Citrate Anhydrous/ Anhydrous Citric Acid/ Tartaric Acid
(1.76g/630mg/720mg/890mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Citral Soda
2. Bagaimana Citral Soda berfungsi
3. Sebelum mengambil Citral Soda
4. Cara menggunakan Citral Soda
5. Semasa menggunakan Citral Soda
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Citral Soda
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Citral Soda

- Pengalkali air kencing untuk rawatan jangkitan saluran kencing ringan.
- Melegakan gejala kesukaran membuang air kecil.
- Meningkatkan fungsi antibiotik tertentu.
- Untuk gout.

Bagaimana Citral Soda berfungsi

Citral Soda bertindak sebagai pengalkali kencing. Tindakan ini menghasilkan peningkatan nilai pH kandungan perut, sehingga melegakan gejala hiperasiditas

Sebelum mengambil Citral Soda

- Bila tidak boleh mengambil

Sekiranya anda menderita penyakit buah pinggang, penyakit Addison yang tidak dirawat, penyakit jantung

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau telah mempunyai mana-mana masalah perubatan yang berikut: ulser peptik, masalah buah pinggang
Ulser peptik, masalah buah pinggang, keadaan diet terhad natrium.

Beritahu doktor anda jika anda alah kepada mana-mana ubat-ubatan lain, makanan, pewarna atau bahan pengawet.

Beritahu doktor anda jika anda mengandung atau merancang untuk hamil.

Beritahu doktor anda jika anda sedang menyusukan atau ingin menyusukan bayi.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Citral Soda harus dielakkan semasa mengambil antacid, ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin dan salicylates.

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Citral Soda

-Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu menyepak dengan profesional penjagaan kesihatan anda jika anda tidak pasti bagaimana untuk mengambil Citral Soda.

Dos yang biasa digunakan adalah 4-8g (1 hingga 2 sachet) dilarutkan dalam air sejuk 4 kali sehari.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dan sentiasa mengambil pada masa yang sama setiap hari.

- Berapa lama perlu digunakan

Terus mengambil Citral Soda selama yang profesional penjagaan kesihatan anda memberitahu anda. Rawatan panjang dengan Citral Soda akan bergantung kepada berapa cepat gejala anda bertambah baik.

-Jika terlupa menggunakan

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Jika anda mempunyai soalan lanjut mengenai penggunaan produk ini, sila tanya profesional penjagaan kesihatan anda.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Pengambilan garam natrium yang berlebihan boleh menyebabkan gangguan elektrolit yang serius. Pengambilan natrium sitrat yang berlebihan akan

CITRAL SODA EFFERVESCENT GRANULES

Sodium Bicarbonate/ Sodium Citrate Anhydrous/ Anhydrous Citric Acid/ Tartaric Acid
(1.76g/630mg/720mg/890mg)

mengganggu mukosa gastrousus & boleh menyebabkan cirit-birit, loya, muntah-muntah, bengkak dan sawan. Jika anda mengambil terlalu banyak Citral Soda secara tidak sengaja, anda harus berunding dengan profesional penjagaan kesihatan atau pergi ke hospital secepat mungkin.

Semasa menggunakan Citral Soda

- Perkara yang perlu dilakukan

Minum air yang banyak. Kencing dengan kerap. Jangan berlengah ke tandas.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Tidak mengambil Citral Soda untuk merawat sebarang aduan lain melainkan profesional penjagaan kesihatan anda memberitahu anda untuk berbuat demikian. Jangan berikan Citral Soda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda. Jangan berhenti mengambil Citral Soda, atau guna dos yang lebih rendah, sila semak dengan profesional penjagaan kesihatan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika gejala berterusan, sila berunding dengan profesional penjagaan kesihatan anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Citral Soda boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mendapat mereka. Jika anda notis ini atau dapat apa-apa kesan lain, sila berhenti mengambil produk ini dan memberitahu penjagaan kesihatan anda profesional atau ahli farmasi. Pengambilan Citral Soda yang berlebihan boleh menyebabkan cirit-birit, loya, muntah dan membawa kesan laksatif. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Citral Soda

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Melindungi dari kelembapan. Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak. Jangan gunakan Citral Soda selepas tarikh luput yang dinyatakan pada karung tersebut. Tarikh luput merujuk kepada hari yang terakhir bulan tersebut.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Serbuk bebas berbutir putih, diisi dalam aluminium berlamina tri kertas poli glisin, setelah larut dalam 200 ml air memberikan larutan tanpa warna yang jelas.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate Anhydrous, Anhydrous Citric Acid, Tartaric Acid
- Bahan tidak aktif: Flavor Lemon Dry

- Nombor

MAL20126025XC

Pengilang

Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
19-20-2 1, Sector-6A, I.I.E., SIDCUL, Ranipur, Haridwar-249403, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Avetech Healthcare Sdn. Bhd.
C-9-27, Centum@Oasis Corporate Park,
No. 2, Jalan PJU 1A/2, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

22/11/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/2)241120/1376