

# OSPAMOX FILM-COATED TABLET

Amoxicillin Trihydrate (500 mg)

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

## Apakah Yang Ada Pada Risalah Ini:

1. Apakah kegunaan Ospamox
2. Bagaimana Ospamox berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ospamox
4. Cara menggunakan Ospamox
5. Semasa menggunakan Ospamox
6. Kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ospamox
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

## Apakah Kegunaan Ospamox

Ospamox digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria di bahagian-bahagian tubuh yang berlainan seperti:

- Jangkitan telinga, tekak, hidung dan sinus
- Jangkitan dada seperti bronkitis dan pneumonia
- Jangkitan saluran kencing
- Mencegah jangkitan jantung semasa pembedahan mulut atau tekak
- Jangkitan perut
- Jangkitan kulit dan tisu lembut

Doktor anda mungkin memberikan Ospamox untuk sebab lain.

## Bagaimana Ospamox Berfungsi

Ospamox adalah antibiotik. Ia tergolong dalam kumpulan antibiotik *amoxicillin* yang dinamakan penisilin. Ia digunakan untuk merawat jangkitan disebabkan oleh bakteria yang sensitif kepada *amoxicillin*.

## Sebelum Anda Menggunakan Ospamox

- Bila tidak boleh menggunakan Ospamox
- Jika anda alah (hipersensitif) kepada *amoxicillin*, penisilin, *cephalosporin* atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.

## Mengandung

Jika anda mengandung atau menyusukan anak, atau anda fikir anda mengandung atau anda merancang untuk mengandung, minta nasihat daripada doktor atau

ahli farmasi anda sebelum anda menggunakan ubat ini. Sebagai langkah berjagajaga, *amoxicillin* hanya boleh digunakan semasa mengandung jika doktor berpendapat bahawa kebajikannya mengatasi kemudaratan.

## Menyusukan anak

Sejumlah kecil ubat ini meresap masuk ke dalam susu ibu. Oleh itu, dalam sesetengah kes, penyusuan perlu dihentikan.

## - Sebelum menggunakan Ospamox

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda mengambil Ospamox jika anda mengalami:

- sebarang keadaan alergi
- sawan
- penyakit ginjal
- cirit-birit yang teruk dan berterusan

## - Mengambil ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil atau telah mengambil ubat lain baru-baru ini atau berhasrat untuk mengambil sebarang ubat lain. Sesetengah ubat boleh menimbulkan masalah jika diambil dengan Ospamox.

Beri perhatian kepada ubat berikut:

- *Probenecid*: mengurangkan penyingkiran Ospamox melalui buah pinggang mengakibatkan tahap Ospamox lebih tinggi dalam darah.
- *Allopurinol* (digunakan untuk merawat gout): risiko anda mengalami tindak balas kulit adalah lebih tinggi.
- Antibiotik bakteriostatik seperti tetracyclines dan chloramphenicol: kombinasi menyebabkan Ospamox hilang keberkesanannya.
- Ubat untuk mencairkan darah
- Methotrexate

## Cara Menggunakan Ospamox

### - Berapa banyak harus diambil

Anda hendaklah mengambil Ospamox betul-betul mengikut arahan doktor anda. Dapatkan kepastian daripada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Dos yang disyorkan untuk dewasa adalah 1,500 mg hingga 2,000 mg sehari dibahagikan kepada dua hingga tiga dos.

## Pesakit buah pinggang

Doktor anda mungkin perlu menurunkan dos anda.

## - Cara menggunakan Ospamox

Untuk penggunaan lisan.

Anda boleh mengambil Ospamox sebelum atau selepas makan.

Telan seluruh pil dengan air. Jangan hancurkan atau kunyah pil.

## - Bila perlu digunakan

Ambil ubat ini betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Sila tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

## - Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini hingga habis kitaran penggunaan, walaupun anda rasa semakin sembuh. Jika anda berhenti mengambil ubat ini terlalu awal, jangkitan boleh kembali. Bacteria juga boleh menjadi resisten kepada ubat. Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang penggunaan produk ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

## - Jika terlupa menggunakan

Anda hendaklah mengambil ubat anda setiap hari. Bagaimanapun, jika anda terlupa untuk mengambil satu atau beberapa dos, ambil ubat anda sebaik sahaja anda teringat dan kemudian teruskan rawatan mengikut preskripsi.

## - Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlalu banyak ubat ini (terlebih dos), hubungi doktor anda atau pergi ke hospital dengan segera, dan tunjukkan bungkusan ubat. Tanda terlebih dos adalah: loya, muntah, cirit-birit, sakit abdomen.

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

# OSPAMOX FILM-COATED TABLET

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Amoxicillin Trihydrate (500 mg)

## Semasa Menggunakan Ospamox

- Perkara yang perlu dilakukan
  - Ambil ubat anda betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.
  - Maklumkan semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ospamox.
  - Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Perkara yang tidak boleh dilakukan
  - Jangan hentikan pengambilan ubat anda melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.
  - Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
  - Jangan beri Ospamox kepada sesiapa, walaupun mereka mengalami gejala atau keadaan yang sama seperti anda.
- Perkara yang perlu diberi perhatian

**Memandu dan menggunakan mesin**  
Kesan ubat ini ke atas keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin adalah tidak diketahui. Dalam sesetengah situasi, reaksi alahan, pening dan sawan pernah berlaku. Jangan memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana ubat ini memberi kesan kepada anda.

## Kesan Sampingan

Seperti semua ubat, Ospamox boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan serius berikut, hubungi doktor anda atau pergi ke hospital dengan segera.

Mual dan cirit-birit adalah kesan sampingan sementara yang mungkin berlaku.

Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku seperti tindak balas alergi seperti ruam, demam, gatal kulit yang teruk, bengkak di lapisan bawah kulit dan masalah gangguan darah [contoh, tahap platelet yang

rendah (trombositopenia), tahap sel darah putih yang sangat rendah (agranulocytosis), penurunan sel darah putih (leukopenia), peningkatan sel darah putih tertentu (eosinophilia)] telah berlaku.

Seperti antibiotik lain, *amoxicillin* boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, keradangan lidah, keradangan mulut dan bibir, demam, pembengkakan lapisan kulit bawah dan keradangan ruang antara tubulus buah pinggang.

Pesakit dengan keradangan membran otak (meningitis) mungkin menghadapi risiko lebih tinggi untuk mengalami sawan. Peningkatan dalam enzim hati juga mungkin dialami.

Berhenti mengambil Ospamox dan hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana daripada yang berikut:

- Reaksi alahan serius seperti *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)*. *DRESS* pada mulanya muncul seperti simptom selsema dengan ruam pada muka dan kemudian, ruam yang berpanjangan, suhu tinggi dan pembesaran nodus limfa.

Ospamox boleh menyebabkan alergi yang teruk dan tindakbalas kulit yang serius.

Berhenti menggunakan Ospamox dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami gejala-gejala berikut:

- Kulit merah, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npa.gov.my](http://npa.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Cara Penyimpanan dan Pelupusan

## Ospamox

- Penyimpanan  
Simpan di tempat yang tidak boleh dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak. Jangan gunakan ubat selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kotak atau pek gelembung. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

## Ospamox 500 mg film coated tablet

Simpan pada suhu bawah 25°C, lindungi daripada cahaya dan lembapan.

## - Pelupusan

Ubat tidak sepatutnya dilupuskan menerusi air buangan atau sampah sarap rumah. Tanya ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk  
Pil bersalut berwarna putih, berbentuk bujur, dwicembung, dengan kedua-dua permukaan bergores.

## Bahan Kandungan

### Bahan aktif

Bahan aktif adalah *amoxicillin* (sebagai *trihydrate*).

### Bahan tidak aktif

Teras Pil: *magnesium stearate, povidone, sodium starch glycolate, cellulose microcrystalline*  
Salutan Pil: *titanium dioxide, talc, hypromellose*.

## Nombor MAL

MAL19890612AZ

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

### Pengilang

Sandoz GmbH  
Biochemiestrasse 10  
6250 Kundl  
Austria

### Pemegang Pendaftaran Produk

Sandoz Products Malaysia Sdn. Bhd.  
3A-2 & 3A-3, Level 3A, Menara KEN TTDI,  
No. 37, Jalan Burhanuddin Helmi,

# OSPAMOX FILM-COATED TABLET

Amoxicillin Trihydrate (1000mg)

---

*Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)*

Taman Tun Dr Ismail,  
60000 Kuala Lumpur, Malaysia

**Tarikh Kemas Kini RiMUP**  
AUG 2026

**Nombor Siri**  
NPRA(R2/2)260902/00131