

**Apakah Yang Ada Pada Risalah Ini:**

1. Apakah kegunaan Curam
2. Bagaimana Curam berfungsi
3. Sebelum menggunakan Curam
4. Cara menggunakan Curam
5. Semasa menggunakan Curam
6. Kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Curam
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

**Apakah Kegunaan Curam**

Curam digunakan untuk merawat jangkitan telinga, tekak, hidung, sinus, saluran kencing dan jangkitan kulit dan tisu lembut termasuk jangkitan semasa pembedahan mulut, tulang dan sendi.

**Bagaimana Curam Berfungsi**

Curam adalah antibiotik dan berfungsi membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan. Ia mengandungi dua jenis ubat berlainan iaitu *amoxicillin* dan *clavulanic acid*. *Amoxicillin* tergolong dalam kumpulan antibiotik yang dinamakan penisilin yang kadang-kadang boleh dihentikan daripada bekerja (dibuat tidak aktif oleh bakteria tertentu). Komponen aktif yang lain (*clavulanic acid*) melarang ini daripada berlaku.

**Sebelum Anda Menggunakan Curam**

*Bila tidak boleh menggunakan Curam*

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada *amoxicillin*, *clavulanic acid*, penisilin atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- Jika anda mengalami reaksi alergi yang teruk (hipersensitif) terhadap sebarang antibiotik lain. Ini termasuk ruam kulit atau bengkak muka atau leher
- Jika anda mengalami masalah hati atau penyakit kuning (penguningan kulit) semasa mengambil antibiotik

*Mengandung dan menyusukan anak*  
Jangan menggunakan ubat ini jika anda menyusukan anak.

Jika anda mengandung atau fikir anda mengandung atau merancang untuk mengandung, minta nasihat daripada doktor anda sebelum menggunakan ubat ini. Sebagai langkah berjawap, penggunaan hendaklah dielakkan kecuali kebaikannya mengatasi kemudaratan.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum anda mengambil Curam jika tidak pasti.

*Sebelum menggunakan Curam*

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Curam jika anda mengalami:

- sebarang keadaan alergi
- sawan
- penyakit ginjal
- cirit-birit yang teruk dan berterusan
- penyakit hati atau ginjal

**Ujian darah dan air kencing**

Sekiranya anda menjalani ujian darah (seperti ujian status sel darah merah atau ujian fungsi hati) atau ujian air kencing (untuk glukosa), biarkan doktor atau jururawat tahu bahawa anda sedang mengambil Curam. Ini kerana Curam boleh menjejaskan keputusan ujian ini.

*Mengambil ubat lain*

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil atau telah mengambil ubat lain baru-baru ini atau berhasrat untuk mengambil sebarang ubat lain. Ini termasuk ubat-ubatan yang boleh dibeli tanpa preskripsi.

Beritahu doktor jika anda mengambil:

- Ubat untuk mencairkan darah seperti *warfarin*
- *Methotrexate* (ubat untuk merawat barah atau penyakit reumatik)
- *Probenecid* (digunakan untuk merawat gout)
- *Allopurinol* (digunakan untuk merawat gout): risiko mengalami tindak balas kulit adalah lebih tinggi.
- *Mycophenolate*

**Cara Menggunakan Curam**

- *Berapa banyak harus diambil*  
Anda hendaklah mengambil Curam betul-betul mengikut arahan doktor anda. Dapatkan kepastian daripada doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

**Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas**

Dos yang biasa disyorkan adalah 1 tablet dua kali sehari untuk jangkitan ringan atau sederhana. Untuk jangkitan serius, dos boleh ditingkatkan kepada 1 tablet tiga kali sehari.

**Pesakit buah pinggang dan hati**

Sekiranya anda mengalami masalah buah pinggang, dos mungkin dikurangkan bergantung kepada keseriusan masalah buah pinggang anda. Sekiranya anda mempunyai masalah hati, anda mungkin memerlukan ujian darah yang lebih kerap untuk mengetahui bagaimana hati anda berfungsi.

*Cara menggunakan Curam*

Telan tablet dengan segelas air sebelum makan. Jangan mengambil Curam melebihi 2 minggu. Sekiranya anda masih tidak sihat, anda perlu jumpa doktor anda.

*Bila perlu digunakan*

Ambil ubat ini betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Sila tanya doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

*Berapa lama perlu digunakan*

Ambil ubat ini hingga habis kitaran penggunaan, walaupun anda rasa semakin sembuh. Jika anda berhenti mengambil ubat ini terlalu awal, jangkitan boleh kembali. Bakteria juga boleh menjadi resisten kepada ubat. Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang penggunaan produk ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

*Jika terlupa menggunakan*

Anda hendaklah mengambil ubat anda setiap hari. Bagaimanapun, jika anda terlupa untuk mengambil satu atau beberapa dos, ambil ubat anda sebaik sahaja anda teringat dan

kemudian teruskan rawatan mengikut preskripsi.

**Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)**

Jika anda mengambil terlalu banyak ubat ini (terlebih dos), hubungi doktor anda dengan segera, dan tunjukkan bungkusan ubat. Tanda terlebih dos adalah sakit abdomen (rasa tidak sihat, cirit-birit atau sawan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

**Semasa Menggunakan Curam Perkara yang perlu dilakukan**

- Ambil ubat betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.
- Maklumkan semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Curam.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

**Perkara yang tidak boleh dilakukan**

- Jangan hentikan pengambilan ubat anda melainkan dinasihati oleh doktor anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan beri Curam kepada sesiapa, walaupun mereka mengalami gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

**Perkara yang perlu diberi perhatian Memandu dan menggunakan mesin**

Kesan ubat ini ke atas keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin adalah tidak diketahui.

**Kesan Sampingan**

Seperti semua ubat, Curam boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Curam boleh menyebabkan alahan teruk dan tindak balas kulit yang serius.

Berhenti menggunakan Curam dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang gejala berikut:

- Kulit merah, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Berhenti mengambil Curam dan hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala yang berikut:

- Reaksi alergi yang serius seperti Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS). DRESS muncul pada mulanya seperti gejala selesema dengan ruam di muka dan kemudiannya ruam yang berlanjutan, suhu tinggi dan pembesaran nodus limfa.

**Kesan sampingan yang sangat biasa**

- Cirit-birit

**Kesan sampingan biasa**

- Thrush (*candida* - jangkitan yis pada faraj, mulut atau lipatan kulit)
- Rasa sakit (loya), terutamanya apabila mengambil dos yang tinggi. Ambil Curam sebelum makanan.
- Muntah

**Kesan sampingan yang tidak biasa**

- Pening
- Sakit kepala
- Masalah pencernaan
- Peningkatan beberapa bahan (enzim) yang dihasilkan oleh hati
- Ruam kulit, gatal-gatal
- Hives

**Kesan sampingan yang jarang berlaku**

- Bilangan sel yang rendah yang terlibat dalam pembekuan darah
- Jumlah sel darah putih yang rendah
- Ruam kulit, yang mungkin melepuh

**Kesan sampingan yang lain**

Kesan sampingan yang lain telah berlaku dalam sebilangan kecil orang tetapi frekuensi tepat tidak diketahui.

- Reaksi alergi (seperti di atas)

- Reaksi alergi (seperti di atas)
- Keradangan usus besar
- Reaksi kulit yang serius: ruam meluas dengan lepuh dan kulit mengelupas
- Keradangan tiub buah pinggang
- Kristal dalam air kencing

Sekiranya anda mendapat kesan sampingan, beritahu doktor atau ahli farmasi jika mana-mana kesan sampingan menjadi teruk atau menyusahkan, atau jika anda melihat apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam senarai ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

**Cara Penyimpanan dan Pelupusan Curam**

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang tidak boleh dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak. Jangan gunakan ubat selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kotak atau pek gelembung. Simpan pada suhu bawah 25°C, lindungi daripada cahaya dan kelembapan. Simpan dalam bekas asal.

- Pelupusan

Ubat tidak sepatutnya dilupuskan menerusi air buangan atau sampah sarap rumah. Tanya ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat Lanjut**

Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem berbentuk bujur, dwicembung, warna putih hingga sedikit kekuningan, timbul pada satu sisi (GG N6).

**Bahan Kandungan**

Bahan aktif

Bahan aktif adalah *amoxicillin* dan *clavulanic acid*.

Satu tablet bersalut filem mengandungi 500 mg *amoxicillin*

dan 125 mg *clavulanic acid*.

**Bahan tidak aktif**

*Silica, colloidal anhydrous*

*Magnesium Stearate*

*Sodium Starch Glycolate*

*Cellulose, Microcrystalline*

*Triethyl Citrate*

*Hypromellose*

*Talc*

*Ethylcellulose, Aqueous Dispersion*

*Titanium Dioxide*

**Titanium dioxide Nombor MAL**

MAL05090013ASRZ

**Pengilang dan Pemegang**

**Pendaftaran Produk**

**Pengilang**

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl, Austria

**Pemegang Pendaftaran Produk**

Sandoz Products Malaysia Sdn. Bhd.

Unit 1202, Level 12, Uptown 1,

No. 1, Jalan SS21/ 58,

Damansara Uptown,

47400 Petaling Jaya Selangor,

Malaysia

**Tarikh Kemas Kini RiMUP**

Apr 2025

**Nombor Siri**

NPRA(R2/1)190508/130