

DES Loratadine SANDOZ FILM COATED TABLET

Desloratadine (5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan *Desloratadine Sandoz*
2. Bagaimana *Desloratadine Sandoz* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Desloratadine Sandoz*
4. Cara mengambil *Desloratadine Sandoz*
5. Semasa menggunakan *Desloratadine Sandoz*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Desloratadine Sandoz*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Desloratadine Sandoz*

Desloratadine Sandoz melegakan simptom rinitis alergi (radang laluan udara dalam hidung yang disebabkan oleh alergi [alahan], misalnya, alahanterhadap tungau habuk). Antara simptom ialah bersin, hidung berhingus atau terasa gatal, lelangit mulut terasa gatal, dan mata yang gatal, merah-merah atau berair.

Desloratadine Sandoz juga digunakan untuk melegakan simptom urtikaria (masalah kulit yang disebabkan oleh alergi). Antara simptomnya ialah gatal-gatal dan gegata.

Simptom-simptom ini dapat dilegakan sepanjang hari untuk membantu anda tidur dan meneruskan kegiatan seharian anda seperti biasa.

Bagaimana *Desloratadine Sandoz* berfungsi

Desloratadine Sandoz ialah sejenis ubat antialergi yang tidak membuatkan anda mengantuk. Ubat ini dapat mengawal tindak balas alergi dan simptomnya.

Sebelum menggunakan *Desloratadine Sandoz*

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil *Desloratadine Sandoz*:

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada desloratadine, terhadap mana-mana bahan lain di dalam *Desloratadine Sandoz* atau terhadap loratadine.

- Sebelum mula mengambil

Penggunaan *Desloratadine Sandoz* dari segi efikasi dan keselamatan di kalangan kanak-kanak yang berumur tidak lebih daripada 12 tahun belum dibuktikan.

Kehamilan dan menyusukan bayi

Hamil

Wanita yang hamil atau yang bercadang untuk menjadi hamil haruslah meminta nasihat doktor sebelum memakan *Desloratadine Sandoz*.

Menyusukan bayi

Ia diketahui desloratadine dikeluarkan melalui susu badan. Jika anda sedang menyusukan anak dengan susu badan, *Desloratadine Sandoz* tidak disyorkan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Tidak ada saling tindak balas yang diketahui berlaku antara *Desloratadine Sandoz* dengan ubat-ubat lain.

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menganbil atau baru-baru ini telah mengambil, sebarang ubat-ubatan lain.

Cara mengambil *Desloratadine Sandoz*

- Berapa banyak harus digunakan

Orang dewasa dan remaja (12 tahun ke atas): makan satu tablet sekali sehari.

- Bila perlu digunakan

Telan seluruh tablet dengan air, sebelum ataupun selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Doktor akan menentukan jenis rinitis alergi yang anda hidapi dan kemudiannya menentukan tempoh anda harus menggunakan *Desloratadine Sandoz*.

Jika rinitis alergi anda itu jenis bermusim (mengalami simptom kurang daripada 4 hari seminggu ataupun kurang daripada 4 minggu keseluruhannya), doktor akan megesyorkan jadual rawatan yang bergantung pada penilaian sejarah penyakit anda.

Jika rinitis alergi anda itu jenis berlarutan (mengalami simptom melebihi 4 hari seminggu dan melebihi 4 minggu keseluruhannya), doktor mungkin mengesyorkan tempoh rawatan yang lebih panjang.

Bagi urtikaria, tempoh rawatan mungkin berbeza bagi setiap pesakit dan oleh itu, anda harus mengikut arahan doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa memakan ubat ini

pada waktu yang sepatutnya, ambil secepat mungkin, kemudian teruskan dengan jadual waktu dos anda yang biasa. Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa digunakan itu.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Segera hubungi doktor anda atau jabatan kecemasan hospital yang terdekat. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda, Tanda-tanda terlebih dos tidak diketahui.

Bawa risalah ini atau beberapa tablet bersama anda supaya mereka tahu apa yang anda telah ambil.

Jika anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan *Desloratadine Sandoz*

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Beritahu doktor anda degan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Jika anda mempunyai persoalam lanjut atas penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda atau ahli farmasi anda,
- Jangan berkongsi *Desloratadine Sandoz* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.
- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Pada dos yang disyorkan, *Desloratadine Sandoz* tidak dijangka akan membuatkan anda mengantuk atau kurang berwaspada. Walau bagaimanapun, sesetengah orang berasa mengantuk dan ini boleh menjejaskan kemampuan mereka memandu atau mengendalikan jentera. Namun begitu, ini jarang-jarang sekali berlaku.

Kesan-kesan sampingan

DESLORATADINE SANDOZ FILM COATED TABLET

Desloratadine (5mg)

Seperti semua ubat, *Desloratadine Sandoz* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Umum:

- Sakit kepala
- Mulut kering
- Keletihan

Sangat jarang:

- Berkhayal
- Rasa pening
- Mengantuk
- Insomnia
- Tindak balas psikomotor hiperaktif
- Sawan
- Tachycardia
- Palpitasi (debaran jantung pantas)
- Sakit pada bahagian abdomen
- Loya
- Muntah
- Dispepsia
- Cirit-birit
- Peningkatan enzim hati
- Peningkatan bilirubin
- Hepatitis
- Sakit otot
- Tindakbalas alergi (seperti anafilaksis, angioedema, kesukaran untuk bernafas, gatal-gatal, ruam and urtikaria)

Kekerapan tidak diketahui:

- Kefotopediaan
- Pemanjangan QT, aritmia, bradikardia
- Tingkahlaku tidak normal
- Agresif
- Peningkatan selera makan
- Peningkatan berat badan

Hentikan pengambilan *Desloratadine Sandoz* dan segera dapatkan bantuan perubatan jika anda mengalami sebarang tanda tindak balas alahan.

Jika mana-mana kesan sampingan ini menjadi serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan***Desloratadine Sandoz*****- Penyimpanan**

Simpan di bawah suhu 30°C.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai dan dilihat oleh kanak-kanak.

Jangan gunakan *Desloratadine Sandoz* selepas tarikh luput “EXP” yang dinyatakan pada pembungkusan.

- Pelupusan

Ubat tidak sepatutnya dilupuskan ke dalam air buangan atau bersama sampah-sarap di rumah anda. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut**Rupa dan warna**

Desloratadine Sandoz adalah tablet bikonveks bersalut berwarna biru muda, berbentuk bulat dan dicetak dengan “5” pada sebelah permukaan.

- Bahan-bahan kandungan**Bahan aktif**

Satu pil *Desloratadine Sandoz* mengandungi 5 mg desloratadine.

Bahan-bahan tidak aktif

Maize starch, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, purified water, colloidal anhydrous silica, hydrogenated vegetable oil, opadry blue.

Nombor MAL

MAL17085016AZ

Pengilang dan Pemegang**Pendaftaran Produk****Pengilang**

Sandoz Private Limited
Plot No.8-A/2 & 8-B,
TTC Industrial Estate,
Kalwe Block, Village-Dighe,
Navi Mumbai - 400 708, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sandoz Products Malaysia Sdn. Bhd.
3A-2 & 3A-3, Level 3A, Menara KEN
TTDI,
No. 37, Jalan Burhanuddin Helmi,
Taman Tun Dr Ismail,
60000 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

Aug 2026

Nombor Siri

NPRA(R2/2)260818/00112