

AVENEX PAIN RELIEF CREAM

Menthol 6%w/w, Methyl Salicylate 13%w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Avenex Pain Relief Cream
2. Bagaimana Avenex Pain Relief Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Avenex Pain Relief Cream
4. Cara menggunakan Avenex Pain Relief Cream
5. Semasa menggunakan Avenex Pain Relief Cream
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Avenex Pain Relief Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Avenex Pain Relief Cream

Untuk melegakan sakit otot dan kekakuan termasuk sakit belakang, *lumbago* dan *fibrositis*.

Bagaimana Avenex Pain Relief Cream berfungsi

Ia mengandungi *menthol* dan *methyl salicylate*. *Menthol* mengembangkan saluran darah dan menyebabkan sensasi kesejukan, diikuti dengan kesan analgesik. *Menthol* juga bertindak sebagai peningkat penembusan, meningkatkan penembusan ubat-ubatan apabila sapu pada kulit, untuk memberi permulaan tindakan yang lebih cepat. *Methyl salicylate* digunakan secara topikal sebagai perengsa lawan. Selepas sapu, ia diserap melalui kulit dan digunakan untuk melegakan kesakitan reumatik dan kesakitan otot atau sendi.

Sebelum menggunakan Avenex Pain Relief Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan pada pesakit yang idiosinkrasi dengan aspirin atau salisilat.

Jangan guna sekiranya anda alah kepada bahan kandungan lain dalam Avenex Pain Relief Cream ini.

- Sebelum menggunakan

Pada mulanya sapu kuantiti yang kecil pada kawasan kulit yang terhad dan memperhatikan sama ada ketidakselesaian atau kegatalan berlaku sebelum sapu pada kawasan kulit yang

luas. Jika iritasi kulit berlaku, sila berhenti menggunakannya.

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

Penyapuan yang berlebihan oleh pesakit yang mengambil warfarin mungkin meningkatkan risiko pendarahan.

Cara menggunakan Avenex Pain Relief Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Sapu krim yang mencukupi pada bahagian yang berkenaan dengan lembut, tidak melebihi 3 hingga 4 kali sehari.

Untuk kegunaan luar sahaja. Tidak boleh dimakan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Terlebih dos tidak mungkin apabila digunakan seperti yang disyorkan. Sekiranya digunakan pada kawasan kulit yang luas atau melalui oral, produk mungkin akan menyebabkan kesan sistemik bergantung pada jumlah yang diserap.

Jika berlaku penggunaan dos yang berlebihan, rawatan sokongan dan simptomatik perlu diberikan.

Semasa menggunakan Avenex Pain Relief Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Jangan sapu pada kawasan luka terbuka atau kulit yang rosak. Elakkan penggunaan yang berlebihan semasa kehamilan dan penyusuan. Jangan gunakan secara meluas pada bahagian badan atau membalut. Jika simptom berterusan atau pada kanak-kanak di bawah 12 tahun, sila rujuk kepada doktor anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Tanya pengamal perubatan kesihatan anda apa-apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Avenex Pain Relief Cream.

Kesan-kesan sampingan

Kerengsaan kulit, dermatitis sentuh, ruam, kegatalan, kemerahan atau pembengkakan, pembakaran atau rasa menyengat mungkin berlaku.

Boleh menyebabkan tindak balas hipersensitif / alah pada sesetengah individu yang mempunyai masalah kulit sensitif.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Avenex Pain Relief Cream

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada pancaran terus cahaya. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

AVENEX PAIN RELIEF CREAM

Menthol 6%w/w, Methyl Salicylate 13%w/w

Product Description

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih, mudah disapu, melekit dan mempunyai bau cirian.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Menthol, methyl salicylate

- Bahan tidak aktif

Cetostearyl alcohol, cetomacrogol, hard paraffin, eucalyptus oil, liquid paraffin, chlorocresol, purified water

- Nombor MAL:

MAL24076025XC

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Optimist Victory Sdn Bhd
No. 2-3, Jalan Radium Anum,
Bandar Baru Sri Petaling,
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

06.08.2024

Nombor Siri

NPRA(R2)24/036