

JARDIN BETASOINT 0.1% BETAMETHASONE VALERATE 0.1% W/W OINTMENT

Betamethasone Valerate (0.1 % w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Jardin Betasoint 0.1%
2. Bagaimana Jardin Betasoint 0.1% berfungsi
3. Sebelum menggunakan Jardin Betasoint 0.1%
4. Cara menggunakan Jardin Betasoint 0.1%
5. Semasa menggunakan Jardin Betasoint 0.1%
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Jardin Betasoint 0.1%
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Jardin Betasoint 0.1%

Jardin Betasoint 0.1% digunakan untuk kegatalan, kemerahan dan bengkak disebabkan masalah kulit seperti eczema, psoriasis dan dermatitis.

Bagaimana Jardin Betasoint 0.1% berfungsi

Jardin Betasoint 0.1% mengandungi ubat yang dipanggil Betamethasone Valerate. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai steroid. Ia membantu untuk mengurangkan bengkak dan kerengsaan.

Sebelum menggunakan Jardin Betasoint 0.1%**- Bila tidak boleh menggunakan**

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap Betamethasone Valerate atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- Pada kanak-kanak berumur kurang dari 1 tahun.
- Untuk merawat masalah kulit yang berikut:
 - Jerawat
 - Kemerahan teruk pada kulit dan sekitar hidung (rosacea).

- Tompokan ruam merah sekitar mulut (perioral dermatitis)
- Gatal di sekitar dubur dan kemaluan
- Jangkitan kulit disebabkan oleh kulat dan bakteria.
- Jangkitan kulit disebabkan oleh virus seperti herpes simplex dan chickenpox.

- Sebelum menggunakannya

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Jardin Betasoint 0.1% jika anda:

- Jika anda pernah mempunyai reaksi alahan dengan steroid lain.
- Jika anda sapukan ubat berhampiran mata atau di atas kelopak mata, katarak atau glaukoma boleh terjadi sekiranya krim berulang kali memasuki mata.
- Jika anda sapukan ubat pada kulit nipis seperti muka atau pada kulit kanak-kanak memandangkan kulit mereka adalah lebih nipis berbanding orang dewasa dan membolehkan penyerapan dalam jumlah yang lebih besar.
- Jika anda mempunyai psoriasis.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil:

- Ubat-ubat tanpa preskripsi
- Ubat herba

Cara menggunakan Jardin Betasoint 0.1%

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus digunakan

Kekerapan boleh dikurangkan apabila kulit semakin pulih.

Kanak-kanak di atas 1 tahun: Penggunaan hendaklah dihadkan kepada 5 hari dan hendaklah tidak menggunakan pembalut.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Terapi hendaklah dihentikan secara beransur-ansur apabila kawalan telah dicapai.

Bagi kanak-kanak di atas 1 tahun: Penggunaan hendaklah dihadkan kepada 5 hari.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

JARDIN BETASOINT 0.1% BETAMETHASONE VALERATE 0.1% W/W OINTMENT

Betamethasone Valerate (0.1 % w/w)

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan agak jarang berlaku namun dalam kes kronik berlebihan atau penyalahgunaan, sindrom Cushing boleh berlaku.

Semasa menggunakan Jardin Betasoint 0.1%**- Perkara yang perlu dilakukan**

Guna ubat anda mengikut arahan doctor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Jardin Betasoint 0.1%.

Gunakan Jardin Betasoint 0.1% hanya dengan preskripsi doktor.

Sentiasa bersihkan tangan anda sebelum dan selepas menggunakan krim.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Jardin Betasoint 0.1% kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

Anda hendaklah menyapu krim di muka apabila doktor mengarahkan berbuat demikian. Ia tidak boleh digunakan melebihi 5 hari kerana kulit di muka mudah menipis.

- Jangan biarkan krim masuk ke dalam mata.
- Jangan gunakan melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh doktor anda.
- Jangan gunakan pada permukaan kulit yang luas untuk jangka masa lama, kecuali diarahkan oleh doktor.

- Tidak menggunakan pembalut pada kanak-kanak atau di muka di mana ubat disapu.

- Penggunaan pada kanak-kanak atau di muka hendaklah dihadkan kepada 5 hari.

**- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan menggunakan jentera**

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan **Jardin Betasoint 0.1%** terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Jardin Betasoint 0.1% boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah:

- Anda mendapati bahawa keadaan kulit anda menjadi lebih teruk atau menjadi bengkak semasa rawatan.
- Anda mungkin alah kepada Jardin Betasoint 0.1% mempunyai jangkitan atau memerlukan rawatan lain.
- Anda mempunyai psoriasis mungkin mendapat benjolan kecil dengan nanah di bawah kulit. Ini boleh berlaku jarang sekali semasa atau selepas rawatan dan dikenali sebagai psoriasis pustular.

Kesan sampingan lain yang boleh didapati apabila menggunakan Jardin Betasoint termasuklah:

Biasa

Rasa membakar kerengsaan, atau gatal

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Jardin Betasoint 0.1%**- Penyimpanan**

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan pada suhu di bawah 30 °C.

Tutup tiub dengan kemas.

Jangan sapu ubat ini selepas tarikh luput atau jika penutup muncung tiub telah rosak atau tiub telah bocor.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Salap jernih dan lutsinar

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
 - Betamethasone Valerate
- Bahan tidak aktif
 - White Soft Paraffin
 - Liquid Paraffin

- Nombor MAL

MAL*****

JARDIN BETASOINT 0.1% BETAMETHASONE VALERATE 0.1% W/W OINTMENT

Betamethasone Valerate (0.1 % w/w)

Pengilang

Jardin Manufacturing Sdn Bhd,
Lot 1, 2, 3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun,
Terengganu, MALAYSIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

Jardin Manufacturing Sdn. Bhd,
No. 12-1, Jalan Delta U6/19,
Sunway Subang Business Park,
Jalan TUDM, 40150,
Shah Alam, Selangor.

Tarikh kemas kini RiMUP

15/01/2026

Nombor Siri

NPRA (R2) 25/242