

MILOXY Granules for Oral Suspension 125mg/5ml

Amoxicillin (125mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Miloxy
2. Bagaimana Miloxy berfungsi
3. Sebelum menggunakan Miloxy
4. Cara menggunakan Miloxy
5. Semasa menggunakan Miloxy
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Miloxy
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Miloxy

Miloxi digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria tertentu dan lain-lain mikroorganisma termasuk:

- Jangkitan telinga, tekak dan hidung
- Jangkitan saluran pernafasan (bronkitis, radang paru-paru, dan batuk kokol)
- Jangkitan buah pinggang, radang prostat, pundi kencing, uretra, gonorrhea.
- Jangkitan ginekologi (pengguguran, adneksitis, endometritis)
- Jangkitan gastro-usus (demam kepialu, paratifoid, jangkitan disebabkan shigellosis, jangkitan saluran hempedu (kolangitis, kolesistitis)
- Jangkitan kulit dan tisu lembut
- Pencegahan jangkitan semasa pembedahan mulut atau tekak.

Bagaimana Miloxy berfungsi

Miloxi tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil “penisilin”. Penisilin adalah sejenis antibiotik dan ia berkerja dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Miloxy

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah terhadap antibiotik jenis penisilin dan mana-manaramuan yang terdapat dalam ubat ini.
- Jika anda pernah mengalami alahan apabila mengambil apa-apa jenis antibiotik (e.g: cephalosporins)

Mengandung dan menyusukan anak Miloxy mungkin sesuai untuk digunakan sekiranya anda mengandung. Namun, sila berbincang dengan doktor

anda terlebih dahulu sebelum memulakan terapi antibiotik ini.

- Sebelum menggunakan Miloxy

Anda perlu memberitahu doktor:

- Jika anda alah pada antibiotik jenis *penicillin* dan *beta-lactam*. E.g.: *cephalosporin*
- Jika anda mempunyai penyakit buah pinggang
- Jika anda adalah bayi pramatang ataupun masih bayi.
- Jika anda telah menggunakan ubat ini pada tempoh masa yang panjang.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda ada menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Amoxicillin boleh mempengaruhi cara beberapa ubat-ubatan lain berfungsi. Sesetengah ubat akan mengurangkan kesan *amoxicillin* atau akan meningkatkan peluang untuk anda mengalami kesan sampingan

Beritahu doktor/ ahli farmasi anda jika anda mengambil mana-mana yang berikut:

- Ubat yang digunakan untuk merawat gout cth: *Allopurinol*, *probenecid*
- Ubat yang digunakan untuk merawat masalah jantung cth: *Digoxin*
- Antikoagulan (digunakan untuk mencairkan darah) cth: *Warfarin*.
- Ubat kemoterapi cth: *methotrexate*
- Pil perancang kehamilan

Cara menggunakan Miloxy

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak berat badan melebihi 20 kg:

250mg – 500 mg setiap 8 jam

Bayi berat badan sehingga 6 kg:

25 – 50 mg setiap 8 jam

Bayi berat badan 6 – 8 kg:

50 – 100 mg setiap 8 jam

Bayi dan kanak-kanak berat badan 8-20 kg:

6.7 – 13.3 mg / kg setiap 8 jam

Gonorrhea: 3 g sebagai dos tunggal dengan 1 g *probenecid*.

Rawatan perlu diteruskan sekurang-kurangnya 48 – 72 jam selepas pesakit menjadi asimptomatik atau bukti pembasmian bakteria telah diperolehi.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Guncangkan botol sehingga tiada serbuk melekat pada botol ubat. Tambahkan sedikit air dan guncang seketika, kemudian tambahkan kuantiti air sehingga tanda cincin. Guncang botol dengan kuat. Ini akan menghasilkan larutan sebanyak 100ml. Miloxy boleh diambil sebelum atau selepas makanan. Penyediaan diberikan secara oral dengan cawan pengukur. Bancuhan yang telah siap sedia untuk diambil dengan segelas air.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil Miloxy seperti yang diarahkan oleh doktor anda

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda telah mengambil terlalu banyak *Amoxicillin*, anda mungkin akan sakit perut (rasa loya, muntah-muntah atau cirit-birit) atau kristal dalam air kencing, yang boleh dilihat sebagai air kencing keruh, atau masalah membuang air kecil.

Kes-kes loya, muntah-muntah dan cirit – birit yang teruk boleh dirawat dengan terapi rehidrasi seperti minuman yang mengandungi garam, air dan gula untuk mengelakkan dehidrasi.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Miloxy

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Miloxy.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Semak darah dan fungsi buah pinggang, hati dan hemopoietic secara kerap jika anda mengambil dos yang tinggi dan berpanjangan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Miloxy dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Kepekatan *amoxicillin* yang tinggi dalam air kencing (*amoxicillin crystalluria*) boleh menyebabkan pemendakan dalam tiub kencing. Oleh itu, periksa tiub kencing dengan kerap dan tingkatkan pengambilan air untuk mengurangkan risiko ini.

Penggunaan *amoxicillin* yang berpanjangan boleh menyebabkan terlalu banyak penambahan bakteria yang tidak sensitif (*non-susceptible bacteria*), jadi anda harus mengawasi superinfeksi.

Memandu dan menggunakan mesin
Ubat ini tidak mempunyai pengaruh yang diketahui mengenai keupayaan memandu dan menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Miloxy boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Miloxy boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindak balas kulit yang serius.

Berhenti menggunakan Miloxy dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang gejala berikut:

- Kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata
- Pengurangan sel darah putih (leukopenia)
- Platelet yang rendah (thrombositopenia)
- Anemia akibat hemolisis, iaitu pecahan sel darah merah yang tidak normal
- Meningkatkan masa untuk pembekuan darah semasa pendarahan.
- Reaksi alahan seperti ruam, demam, sakit sendi, kulit gatal, kulit luka, kulit kemerahan dan mengelupas dan pembengkakan di bawah lapisan kulit.
- Reaksi Jarisch-Herxheimer, iaitu keradangan yang berlaku apabila pesakit dengan sifilis, leptospirosis atau demam kepialu dirawat dengan penisilin.
- Kekejangan otot dan pening
- Sawan, terutamanya bagi pesakit yang mempunyai keradangan membran otak (meningitis) atau kerosakan fungsi buah pinggang.
- Mual dan cirit-birit
- Keradangan hati
- Jaundis
- Peningkatan enzim hati yang sementara
- Ruam kulit, gatal-gatal kulit, kegatalan kulit yang teruk,
- Keradangan pada ruang di antara tiub-tiub buah pinggang
- Urin keruh

Hentikan penggunaan Miloxy dan hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami reaksi alergi yang serius seperti *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)*. *DRESS* bermula dengan simptom seperti selesema dengan ruam

di muka dan kemudian dengan ruam yang berlanjutan, suhu yang tinggi dan pembesaran kelenjar limfa.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers & Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Miloxy

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Granul perlu disimpan di bawah suhu 30 °C sehingga produk tamat tempoh. Larutan bancuhan boleh disimpan di bawah suhu 25 °C sehingga 7 hari. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa-sisa rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Ia mengandungi serbuk berwarna merah jambu cair dengan perasa yang enak. Selepas dibancuh, ia menghasilkan cairan berwarna merah jambu dan mempunyai perasa yang enak.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Amoxicillin Trihydrate

- Bahan tidak aktif

Sucrose, sodium benzoate, purified talc, carmellose sodium, anhydrous citric acid, colloidal anhydrous silica, erythrosine CI 45430 dan essence BTM DM 7020A.

- Nombor MAL
MAL19036009AZ

Pengilang

Milan Laboratories (India) Pvt. Ltd
Plot No. 63/67/87/35/36/64/65
J.C.I.E. LTD., Kamothe, Panvel,
Navi Mumbai, 410209 India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Vigor Healthcare Sdn. Bhd. (1551962-H)
C-5-7, Bangsar Trade Centre, Jalan Pantai Baharu,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

10/07/2026

Nombor Siri

NPRA(R2)19/6