

MAXITROL OINTMENT

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Dexamethasone / Neomycin Sulfate / Polymyxin B Sulfate (1mg / 3,500 IU / 6,000 IU)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Maxitrol Ointment
2. Bagaimana Maxitrol Ointment berfungsi
3. Sebelum menggunakan Maxitrol Ointment
4. Cara menggunakan Maxitrol Ointment
5. Semasa menggunakan Maxitrol Ointment
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Maxitrol Ointment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Maxitrol Ointment

Maxitrol digunakan untuk keradangan mata dan jangkitan bakteria di bahagian luar mata.

Bagaimana Maxitrol Ointment berfungsi

Maxitrol menggabungkan dua antibiotik, neomycin sulfat dan polymyxin B sulfat, yang mempunyai aktiviti antibakteria spektrum luas dengan aktiviti anti-radang kortikosteroid, dexamethasone, untuk memerangi jangkitan mikrob tertentu.

Sebelum menggunakan Maxitrol Ointment

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Maxitrol Ointment

- Jika anda alah kepada dexamethasone, neomycin, polymyxin B atau bahan-bahan kandungan Maxitrol Ointment yang lain.
- Jika anda rasa anda mempunyai sebarang jangkitan virus, kulat dan bakteria pada mata.

Keselamatan dan keberkesanan MAXITROL pada kanak-kanak belum dibuktikan.

Mengandung dan menyusukan anak

Sekiranya anda sedang mengandung atau menyusukan, anda rasa anda mungkin mengandung atau merancang untuk mendapatkan bayi, tanya doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini. Maxitrol Ointment tidak digalakkan semasa mengandung atau menyusukan.

- Sebelum mula menggunakan Maxitrol Ointment

- Jika anda mengalami tindak balas alahan dengan Maxitrol Ointment, hentikan penggunaan dan bincang dengan doktor anda. Reaksi alahan mungkin berbeza dari gatal-gatal atau kemerahan kulit hingga kepada tindak balas alahan yang teruk (tindak balas anafilaktik) atau reaksi kulit yang serius. Reaksi alergi ini boleh berlaku dengan antibiotik dari keluarga yang sama (aminoglycosides).
- Sekiranya anda menggunakan Maxitrol Ointment untuk tempoh yang lama, anda mungkin:
 - Mengalami peningkatan tekanan pada mata anda. Anda perlu kerap memeriksa tekanan mata anda semasa menggunakan Maxitrol Ointment terutamanya sekiranya anda menghidap penyakit kencing manis).
 - Mendapat katarak
 - Menjadi lebih mudah terdedah kepada jangkitan mata
 - Mengalami sindrom Cushing kerana ubat itu masuk ke dalam darah anda. Bincang dengan doktor anda sekiranya anda mengalami bengkak dan peningkatan berat badan di sekitar tubuh badan dan pada muka kerana ini biasanya merupakan manifestasi pertama sindrom.

- Sekiranya simptom anda menjadi lebih teruk atau kembali secara tiba-tiba, bincang dengan doktor anda. Anda mungkin menjadi lebih terdedah kepada jangkitan pada mata selepas menggunakan ubat ini.
- Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami penyakit kencing manis atau penyakit yang menyebabkan penipisan tisu mata sebelum menggunakan ubat ini.
- Jika anda memakai kanta sentuh:
 - pemakaian kanta sentuh (keras atau lembut) tidak digalakkan semasa rawatan keradangan atau jangkitan mata.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil atau baru-baru mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Beritahu doktor anda terutamanya jika anda menggunakan:

- NSAID atau steroid topikal (digunakan untuk merawat keradangan kulit)
- Ritonavir atau cobicistat (digunakan untuk merawat penyakit HIV).

Cara menggunakan Maxitrol Ointment

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan Warga Emas

Sapu sedikit ke dalam mata.

- Bila perlu digunakan

Gunakan sehingga 3 atau 4 kali setiap hari atau, boleh digunakan bersama dengan ubat titisan sebelum tidur, atau gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa menggunakan Maxitrol Ointment, teruskan dengan dos seterusnya seperti yang dirancang. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakan Maxitrol Ointment yang terlebih daripada yang anda perlu, bilas semuanya dengan air suam. Jangan tambahkan ubat lagi sehingga masa untuk dos biasa seterusnya.

Semasa menggunakan Maxitrol Ointment

Perkara yang perlu dilakukan

- Sentiasa gunakan ubat ini sama seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda.
- Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda jika anda tidak pasti.
- Hanya gunakan Maxitrol Ointment pada mata anda sahaja.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan biarkan hujung tiub menyentuh mata anda.

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Maxitrol Ointment kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Produk ini mengandungi methylparahydroxybenzoate dan propylparahydroxybenzoate yang boleh menyebabkan reaksi alergi.
- Produk ini mengandungi *wool fat* yang boleh menyebabkan keradangan kulit.
- Jika anda menggunakan ubat salap mata atau ubat titis mata yang lain, tunggu sekurang-kurangnya 5 minit antara setiap ubat. Ubat salap mata perlu diberikan terakhir.
- Bincang dengan doktor jika anda mempunyai ulser kornea yang berterusan.

Memandu dan menggunakan jentera

Ointment khususnya boleh menyebabkan penglihatan kabur dan tidak boleh digunakan sebelum anda memandu atau menggunakan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Maxitrol Ointment boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kesan-kesan sampingan berikut pernah dilaporkan dengan Maxitrol Ointment:

- Kesan sampingan yang tidak lazim (mungkin berlaku dalam 1 hingga 10 pengguna dalam 1,000):
 - o Kesan pada mata: keradangan pada permukaan mata, peningkatan tekanan mata, mata gatal, ketidakselesaan mata, kerengsaan mata

Kesan sampingan tambahan dari pengalaman selepas pemasaran yang dilaporkan yang kekerapannya tidak diketahui:

- Kesan pada mata: ulser kornea, penglihatan kabur, kepekaan cahaya, peningkatan saiz anak mata, melabuh kelopak mata, sakit mata, bengkak mata, sensasi yang tidak normal di mata, kemerahan mata, peningkatan pengeluaran air mata

- Kesan sampingan umum: alergi, sakit kepala, tindak balas kulit yang serius (Sindrom *Stevens-Johnson*).

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Reaksi yang serius termasuk ketoksikan pada saraf, telinga dan buah pinggang telah berlaku pada orang yang mengambil neomycin atau apabila digunakan secara topikal pada luka terbuka atau kulit yang rosak. Ketoksikan pada saraf dan buah pinggang juga berlaku dengan penggunaan polymyxin B. Walaupun kesan ini tidak dilaporkan berikutan ubat mata ini, adalah dinasihatkan supaya berhati-hati apabila digunakan bersamaan dengan antibiotik yang serupa.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Maxitrol Ointment

- Penyimpanan

Jangan simpan pada suhu melebihi 25 °C.

Buang satu bulan selepas dibuka.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Salap mata steril.

Salap berminyak lutcahaya hingga legap, dan warna putih hingga kuning pucat, sekata, bebas dari ketulan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

1 mg dexamethasone, 3,500 (International Units) IU neomycin sulfate dan 6,000 IU polymyxin B sulfate.

- Bahan tidak aktif

Methyl p-hydroxybenzoate (E218), Propyl p-hydroxybenzoate (E216), wool fat dan petrolatum putih.

- Nombor MAL

MAL19910106ARZ

Pengilang

Novartis Manufacturing N.V.
Rijksweg 14,
2870 Puurs-Sint-Amunds,
Belgium.

Pemegang Pendaftaran Produk

Novartis Corporation (Malaysia) Sdn.
Bhd.
Level 18, Imazium,
No. 8, Jalan SS21/37,
Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya, Selangor

Versi PI terkini

TDOC-0051679 Versi: 2.0

Tarikh kemaskini RiMUP

10/4/2025

Nombor Siri

NPRA (R1/2) 26032025/058