

TOBREX OPHTHALMIC SOLUTION

Tobramycin (3mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan TOBREX
2. Bagaimana TOBREX berfungsi
3. Sebelum menggunakan TOBREX
4. Cara menggunakan TOBREX
5. Semasa menggunakan TOBREX
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan TOBREX
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan TOBREX

Tobrex adalah antibiotik topikal yang digunakan dalam rawatan jangkitan bakteria pada mata.

Bagaimana TOBREX berfungsi

Tobramycin menghentikan pertumbuhan bakteria.

Sebelum menggunakan TOBREX

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Tobrex jika anda alah kepada tobramycin atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini.

Mengandung dan menyusu

Tobrex harus digunakan semasa mengandung hanya jika diperlukan sahaja. Sekiranya anda hamil, anda fikir anda mungkin hamil atau merancang untuk mempunyai bayi, minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini. Tobrex tidak disyorkan semasa menyusu.

- Sebelum mula menggunakan Tobrex

Bahan pengawet dalam Tobrex (benzalkonium chloride) boleh

menyebabkan kerengsaan mata dan juga boleh mengubah warna kanta sentuh anda.

Pemakaian kanta sentuh tidak disyorkan semasa rawatan jangkitan mata. Jika anda diberikan kebenaran untuk memakai kanta sentuh, anda harus mengeluarkannya sebelum menggunakan Tobrex dan tunggu sekurang-kurangnya 15 minit sebelum memakai kanta sentuh anda kembali.

- Jika mengambil ubat-ubut lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang menggunakan, baru-baru ini menggunakan atau mungkin menggunakan sebarang ubat lain.

Jika anda sedang menjalani rawatan antibiotik yang lain dengan Tobrex, minta nasihat doktor anda.

Ubat salap Tobrex boleh digunakan bersamaan ubat larutan Tobrex.

Cara menggunakan TOBREX

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk jangkitan ringan dan sederhana, 1 hingga 2 titisan dalam kantung konjungtiva setiap 4 jam selama 7 hari.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakannya

Jika anda terlupa menggunakan Tobrex, teruskan dengan dos seterusnya seperti yang dirancang. Walau bagaimanapun, jika hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan mengikut jadual dos biasa anda. Jangan gunakan dos berganda untuk menggantikan balik dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakan Tobrex lebih daripada yang anda perlukan, bilas dengan air suam. Walau bagaimanapun, tiada kesan toksik dijangkakan dengan penggunaan dos berlebihan pada mata. Jangan gunakan Tobrex sehingga tiba masanya untuk dos biasa anda yang seterusnya.

Semasa menggunakan TOBREX

- Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa gunakan ubat ini sama seperti doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda memberitahu anda. Tanya doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda jika anda tidak pasti.

Pastikan botol ditutup dengan ketat semasa tidak digunakan.

Selepas penutup botol dibuka, jika kolar snap longgar, keluarkan sebelum menggunakan ubat ini.

Hanya gunakan Tobrex untuk mata.

Cuba lagi sekiranya titisan tidak memasuki mata.

Pastikan kelopak mata ditutup, sementara menerapkan tekanan lembut di penjuru mata (saluran air mata) dengan jari untuk mengehadkan kuantiti ubat yang akan masuk ke dalam darah selepas menggunakan ubat titis mata.

Sekiranya anda menggunakan ubat mata yang lain, tunggu sekurang-kurangnya 5 minit antara setiap ubat. Salap mata perlu digunakan akhir sekali.

Jika anda mengalami reaksi alahan dengan Tobrex, hentikan penggunaan dan berbincang dengan doktor anda. Reaksi alahan termasuk gatal-gatal setempat atau kemerahan kulit, reaksi alahan yang teruk (reaksi anaphylactic) atau reaksi kulit yang serius. Reaksi alahan ini boleh berlaku dengan antibiotik topikal atau antibiotik sistemik dari keluarga yang sama (aminoglycosides).

Sekiranya simptom anda menjadi lebih teruk atau kembali tiba-tiba, sila berjumpa dengan doktor anda. Anda mungkin menjadi lebih terdedah kepada jangkitan mata dengan penggunaan ubat ini.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Penglihatan anda akan kabur untuk seketika selepas menggunakan Tobrex. Jangan memandu atau

mengendalikan jentera sehingga penglihatan anda pulih.

Untuk mengelakkan kontaminasi tip penitis dan ubat air mata, berhati-hati supaya tip penitis tidak menyentuh kelopak mata, kawasan sekitar mata atau permukaan lain.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan berikut telah dilihat dengan Tobrex:

Kesan sampingan biasa (mungkin berlaku dalam 1 hingga 10 pengguna dalam 100)

Kesan pada mata: ketidakselesaan mata, kemerahan mata

Kesan sampingan yang tidak biasa (mungkin berlaku dalam 1 hingga 10 pengguna dalam 1,000)

Kesan pada mata: keradangan permukaan mata, kerosakan kornea, kecacatan penglihatan, penglihatan kabur, kemerahan kelopak mata, mata dan kelopak mata bengkak, sakit mata, kekeringan mata, discak pada mata, gatal mata, peningkatan penghasilan air mata

Kesan sampingan umum: alergi (hipersensitiviti), sakit kepala, gatal-gatal kulit, keradangan kulit, penurunan pertumbuhan atau bilangan bulu mata, kehilangan pigmentasi kulit, gatal-gatal, dan kulit kering

Jika anda mendapat apa-apa kesan sampingan, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuk kesan-kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan TOBEX

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jauhkan ubat ini daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Buangkan ubat 4 minggu selepas pembukaan pertama.

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tobrex adalah larutan jernih yang tidak berwarna hingga berwarna kuning pucat atau coklat pucat.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Tobramycin 3mg/ml

- Bahan tidak aktif

Benzalkonium chloride 0.1mg/ml, boric acid, tyloxapol, sodium chloride, sodium sulphate anhydrous, sulphuric acid dan/atau sodium hydroxide (untuk melaraskan pH), air tulen

- Nombor MAL:

MAL19920043ARZ

Pengilang

Novartis Manufacturing N.V.
Rijksweg 14,
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

Pemegang Pendaftaran Produk

Novartis Corporation (M) Sdn. Bhd.
Level 18, Imazium,
No. 8, Jalan SS21/37,
Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia.

Versi PI terkini

TDOC-0050771 Ver.2

Tarikh kemaskini RiMUP

09/07/2025

Nombor Siri

NPRA (R1/2) 11042025/072